



**COMPRENSORIO ALPINO TO 1
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA**

Stagione venatoria 2015/2016

RISULTATI CENSIMENTI FAUNISTICI UNGULATI



**A cura di
GIOVO MARCO
Responsabile Tecnico CATO1**

Bricherasio, 2 novembre 2015

METODICHE DI CENSIMENTO UTILIZZATE

I censimenti sono stati realizzati utilizzando le metodiche previste dalle Linee Guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e si sono svolte avvalendosi di tecnici faunistici qualificati.

Nello specifico sono di seguito descritte le metodiche utilizzate.

Censimenti per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

E' la metodica più utilizzata e consiste in un conteggio esaustivo su ampi territori volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto di indagine.

Questo tipo di censimento è utilizzato per specie ad elevata contattabilità quali Camoscio, Stambecco e Muflone, ma viene applicato, sebbene con sottostime maggiori, anche a specie con abitudini più forestali quali Cervo e Capriolo.

La metodica prevede:

1. l'individuazione dell'areale stabilmente occupato dalla specie;
2. la suddivisione dell'areale individuato in settori. Ogni settore rappresenta un'unità territoriale distinta censibile in un giornata. Per limitare la possibilità di doppi conteggi i confini dei settori corrispondono ad ostacoli naturali e i diversi settori sono censiti di norma in giorni consecutivi;
3. la suddivisione di ogni settore in zone di osservazione, unità territoriali censibili da una squadra di rilevatori in una giornata di censimento. I confini delle diverse zone sono anch'essi rappresentati da ostacoli naturali o artificiali e l'estensione delle stesse varia a seconda della morfologia del territorio e della densità di copertura. Ogni zona di osservazione può essere censita da una squadra mobile di operatori che muovendosi nell'area contano tutti gli animali che osservano o da una squadra fissa che, posta da una posizione dominante, copre visivamente l'intera zona.

Questo tipo di censimento viene realizzato nel periodo dell'anno in cui è massima la contattabilità degli animali direttamente a vista, compatibilmente con le scadenze imposte dalla normativa vigente per la presentazione dei Piani di prelievo numerici agli Ungulati (15 giugno per Muflone, Cervo e Capriolo; 5 luglio per il Camoscio).

Per il Muflone, il Cervo ed il Capriolo censimenti per osservazione diretta sono eseguiti in aprile, (dopo i parti per il Muflone, prima delle nascite per i Cervidi) quando il precoce ricaccio vegetativo dei prati di fondovalle e dei pascoli prospicienti gli alpeggi, inducono gli animali a concentrarsi in queste aree, più favorevoli dal punto di vista alimentare. Questo è infatti il periodo dell'anno in cui l'areale di distribuzione di queste specie è più ridotto e quindi è minore la superficie oggetto di censimento ed il conseguente fabbisogno di operatori. La visibilità all'interno del bosco di latifoglie e larice è inoltre favorita dall'assenza di foglia.

Per il Camoscio conteggi diretti sono eseguiti all'inizio di giugno subito dopo i parti; in questo periodo la montagna è quasi interamente accessibile e si possono già contare i nuovi nati; alle quote più basse è però già presente la foglia e molti animali stazionano in bosco.

Per lo Stambecco, specie non cacciabile, il CA esegue dal 1998 censimenti in luglio dopo i parti sull'areale estivo occupato dalla specie.

Il momento della giornata più favorevole per la realizzazione di questi censimenti è il mattino, nelle prime ore dopo l'alba; conteggi per osservazione diretta dei Cervidi possono essere anche eseguiti la sera, dal tramonto sino a buio.

Censimenti al bramito per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

Le Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ruminanti approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011, precedenti a quelle attualmente in vigore approvate nel 2012, prevedevano l'obbligo di organizzare, con cadenza triennale, operazioni di censimento durante il periodo di bramito, da svolgersi in tutti gli istituti interessati dalla presenza della specie. Lo scopo di questo monitoraggio è quello di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata. Tale disposto non è più contenuto nelle Linee guida in vigore, approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, che prescrivono di valutare la distribuzione in periodo venatorio sulla base dell'analisi critica di presenza e consistenza delle popolazioni nei mesi autunnali (desumibili anche da censimenti al bramito) e dell'analisi della distribuzione spaziale delle serie storiche degli abbattimenti.

Conteggi notturni con faro

Questa metodica di censimento viene utilizzata per il conteggio di Cervidi in primavera (aprile) al primo verde alle quote più basse dove il grado di antropizzazione condiziona fortemente il pascolo fuori dal bosco durante le ore di luce.

In questo periodo i Cervidi sono fortemente attratti dal precoce ricaccio dei prati di fondovalle, ma la vicinanza alle strade ed alle abitazioni ne limita l'attività alle sole ore centrali della notte, e raramente questi animali sono osservabili la sera o il mattino con un tradizionale censimento a vista. La metodica prevede la realizzazione in autovettura a bassa velocità di un itinerario nelle ore centrali della notte (da 2-3 ore dopo il sopraggiungere della totale oscurità, per circa 3 ore) e l'illuminazione delle aree a prato e pascolo ai bordi del percorso con l'ausilio di lampade alogene di adeguata potenza (almeno 500 W) collegate all'automezzo.

Gli animali sono individuabili per il riflesso dell'occhio alla luce del faro e possono essere meglio identificati mediante binocolo.

Questo metodo di censimento non è sicuramente esaustivo (non tutte le zone frequentate dagli animali possono essere raggiunte in automezzo e la superficie di territorio esplorabile in una notte non supera i 500-1.000 ha) ma consente spesso di osservare animali che sfuggono al censimento diretto ed è quindi un'ottima fonte di dati integrativi, se eseguito a distanza di pochi giorni dal censimento generale.

Analisi critica di osservazioni occasionali

Per una stima ancora più puntale della specie Cervo, vengono raccolte nel periodo primaverile prossimo alla data del censimento diretto, tutte le osservazioni relative alla composizione ed alla presenza dei branchi sul territorio.

In questo modo è possibile talvolta identificare gruppi di animali sicuramente sfuggiti sia al censimento diretto che al conteggio notturno con il faro e ridurre così la sottostima di questi metodi di censimento.

Nella primavera del 2006 tale metodica è stata utilizzata anche per il Muflone in Val Pellice.

1. MUFLONE (*Ovis orientalis*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987 in Val Pellice e dal 1990 in Val Chisone.

1.1 DISTRETTO VAL PELLICE

METODICA APPLICATA

Viene effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile (censimento ufficiale al Muflone) alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza dal 1998 con il Capriolo;
2. dal 1998, un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio, allo scopo di monitorare i mufloni gravitanti al di fuori dell'Oasi di protezione "Barant".

Nel 2006, oltre ai due censimenti sopra esposti, è stato realizzato anche un monitoraggio intensivo fra la metà di aprile e la metà di maggio.

1.1.1 CONTEGGIO INIZIO-PRIMAVERILE

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita è quella occupata dalla specie nel periodo inizio primaverile nel territorio della Val Pellice (Comune di Bobbio Pellice).

Superficie censita prevista ha	3.062
Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha	1.702
Numero zone previste	28
Superficie censita coperta ha	1.517
Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha	874
Numero zone coperte	19
S.U.S. Distretto Muflone ha (dati PPGU)	7.126
% di S.U.S. censita	21,3

DATA

Calendario programmato:

Val Pellice
11/4

Calendario effettivamente realizzato:

Date	Zone coperte
11/4	17

PARTECIPANTI

Data	11/4
N. zone	17
Totale operatori	31
Tecnici faunistici CA	
Coordinatore regionale	
Soci CA	31

Agenti venatori prov.	
Guardie volontarie	
Agenti CFS	
Guardiaparco	
Laici	

ORARI DEL CENSIMENTO

Data	11/4
Località ritrovo	Bivio Rif. Barbara
Ora ritrovo	5,45
Inizio operazioni	Alba
Fine operazioni	9,00

METEO

Data	11/4
Cielo	Sereno
Precipitazioni	Assente
Vento	Assente
Visibilità	Buona
Quota neve vers. S m.s.l.m.	1.800
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.400
Meteo giorno precedente	Variabile

RISULTATI

N.	Zona	Totale	Agnelli 2015	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
1	Saret-Forest	0					
2	Romana - Colletto - Faugiau	0					
3	Carbonieri - Pautas	0					
4	Fagnun	NE					
5	Crosette - Comba Lausa	2		1		1	
6	Vallone della Bruna	3				3	
7	Cumbal d'la Roussa - Fautet	7			4	2	1
8	Pralapia – Bosso	0					
9	Giaven – Cialancie	0					
10	Selle – Ponset	0					
11	Barbara – Content	NE					
12	Barant	NE					
13	Inverso di Bobbio	0					
14	Malbec – Lauset	0					
15	Rostagni – Eiretta	NE					
16	Saret – Eiretta – Forest	NE					
17	Cairus – Bariund	3	1		1	1	
18	Biava – Imeut	8		2	6		
19	Vallone di Eyssart	2				2	
20	Villanova- Randulire	0					
21	Chiot – Cernira – Maisons	NE					
22	Mirabucas	0					
23	Chiot-Pera Tajà	10		1	1	8	
24	Crosenna	NE					
25	Mirabucas - Gias d'l'Urs	NE					
26	Pra Curnaliot	NE					
27	Pra Agriturismo	NE					
28	Pra Partia d'amunt	NE					
	TOTALE	35	1	4	12	17	1

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Agnelli 2015	Yearling Maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	35	1	4	12	17	1
TOTALE	35	1	4	12	17	1

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Agnelli 2015	Yearling maschi	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	Barant	719	20	0	3	10	6	1
	TOTALE	719	20	0	3	10	6	1

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Superficie censita ha	1.360
N. mufloni censiti	35
Densità (capi/100 ha)	2,6
Densità pre-parti (capi/100 ha)	2,5
Sex-ratio (FF/MM) *	1,1
Agnelli/100 femmine adulte**	7,7
Incremento 2015 (% agnelli)	2,9
% mufloni in Oasi	57,1

* comprendendo nel numero dei maschi anche gli yearling maschi

** in questo caso inteso come femmine di 2 o più anni (dal totale delle femmine adulte censite è stato sottratto il numero delle presunte femmine yearling, inteso pari al numero di maschi yearling – alla nascita la sex-ratio è considerata paritaria)

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.	Densità pre-parto
1996	6/5	14	1.273	142	52	68	9	13	0	10,1
1997	27/4	16	1.919	144	41	63	7	32	1	5,8
1998	11/4	24	2.120	180	31	82	14	45	8	6,4
1999	10/4	24	2.204	280	66	135	19	48	12	10,5
2000	8/4-2/5	27	2.895	245	76	109	13	42	5	7,0
2001	14/4	28	3.014	244	52	125	18	49	--	6,5
2002	6-7/4	26	2.791	206	88	80	15	31	7	6,2
2003	5/4	27	2.944	122	43	54	6	4	15	4,1
2004	24/4	22	1.872	144	38	82	2	10	12	7,2
2005	9/4	22	1.885	81	32	37	2	10	--	3,8
2006	8/4	20	1.985	109	41	48	6	14	--	4,8
2007	14-15/4	20	1.779	110	37	46	4	20	--	5,1
2008	13/4	22	1.964	135	41	49	7	27	11	5,5
2009	25/4	20	1.671	108	25	45	8	19	11	6,4
2010	10/4	17	1.444	76	20	44	4	7	1	4,8
2011	9/4	17	1.381	74	27	31	7	3	6	5,3
2012	21/4	19	1.535	93	29	38	16	8	1	5,6
2013	13/4	20	1.520	85	20	44	6	10	5	4,9
2014	5/4	19	1.517	42	13	20	4	1	4	2,7
2015	11/4	17	1.360	35	12	17	4	1	1	2,5

Note: dati di consistenza 2006 ricavati dal monitoraggio intensivo; la densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (agnelli).

Di cui osservati nell'Oasi del Barant:

Anno	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.
1999	1.430	266	81	127	--	46	12
2000	1.653	219	73	91	11	40	4
2001	1.677	210	44	107	16	43	--
2002	1.622	182	72	58	14	31	7
2003	1.622	75	27	41	1	4	2
2004	1.097	125	32	73	1	7	12
2005	1.214	61	19	30	2	10	--
2006	1.097	93	35	40	6	12	--
2007	977	100	36	39	4	18	3
2008	1.009	113	31	43	7	26	6
2009	874	82	19	38	8	15	2
2010	842	48	14	27	2	4	1
2011	778	51	21	18	5	1	6
2012	778	78	23	31	15	8	1
2013	866	61	10	33	5	8	5
2014	874	24	9	10	1	..	4
2015	719	20	10	6	3	--	1

Note: dati di consistenza 2006 ricavati dal monitoraggio intensivo

1.1.2 CONTEGGIO TARDO-PRIMAVERILE

Durante il censimento del Camoscio nel distretto Val Pellice (20-21 giugno 2015), sono state registrate le seguenti osservazioni di mufloni:

N.	Zona	Totale	Agnelli 2015	Yearling Maschi	Maschi	Femmine	Indet.
10	Fragnun – Garin	NE					
11	Bruna – Cumbal d'le Nivie	NE					
12	Roussa – Fautet	5			3	2	
13	Col Barant	36	10	6	4	12	4
14	Biava - inverso Barant	0					
15	Barbara - Punta Pleng	0					
16	Cianai di Coi	0					
17	Arbancie – Manzol – Armoine	0					
18	Pian Sineive – Vittona - Colle vecchio	0					
19	Agugliassa – Comba Meutira	2			2		
20	Rif. Granero – Lago Nero	NE					
21	Cumbalas - Genebrera	0					
22	Punta Pleng	0					
23	Col Porsel – Pra Agriturismo	0					
24	Colle della Croce	0					
25	Barant vers. Pra	8	2		3	3	
26	Bars di Arè	0					
30	Crosenna – Content - Resiassa	0					
31	Villanova – Prà	0					
32	Vallone della Pissa *	0					
33	Colletta delle Faure	0					
34	Burfarant - Bariund	NE					
34b	Eyssartet-Bariund	NE					
	Totale	51	12	6	12	17	4

Note: la numerazione delle zone è quella del censimento del Camoscio distretto Val Pellice

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Agnelli 2015	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	51	12	6	12	17	4
TOTALE	51	12	6	12	17	4

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Totale	Agnelli 2015	Yearling maschi	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	Barant	51	12	6	12	17	4
	TOTALE	51	12	6	12	17	4

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	103	21	13	6	63
1999	93	28	40	25	--
2000	120	44	41	25	10
2001	99	35	35	22	7
2002	157	57	66	29	5
2003	94	46	30	16	2
2004	127	40	37	12	38
2005	73	43	19	4	7
2006	83	34	36	13	--
2007	110	40	47	21	2
2008	77	33	30	11	3
2009	78	29	35	14	--
2010	62	21	25	12	4
2011	109	17	61	22	--
2012	95	47	40	8	--
2013	92	25	42	23	2
2014	48	23	12	4	9
2015	51	18	17	12	4

di cui in oasi di protezione (Barant):

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	69	17	7	2	43
1999	82	25	35	22	--
2000	109	38	39	22	10
2001	87	32	30	18	7
2002	142	55	57	25	5
2003	79	39	23	15	2
2004	122	39	35	10	38
2005	66	42	16	1	7
2006	70	30	31	9	--
2007	86	35	34	15	2
2008	61	31	19	8	3
2009	52	20	22	10	-
2010	51	16	20	11	4

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
2011	65	12	37	10	--
2012	88	41	39	8	--
2013	70	22	31	15	2
2014	20	10	5	0	5
2015	51	18	17	12	4

1.2 RESTO DEL CA

Per il resto del CA ove è presente la specie (Val Chisone) dal 1997 al 1999 è stato effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con Capriolo e Cervo (ed in contemporanea o a pochi giorni di distanza dal censimento del Muflone dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian");
2. un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio;

L'area censita è quella occupata dalla specie nei periodi in esame (metà aprile, fine maggio-inizio giugno) nel territorio della Val Chisone non compreso entro i confini della sopracitata dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian" e del Parco Naturale Orsiera-Rocciavre (Comuni di Pragelato e Roure).

Dal 2000 viene individuato per la specie solamente più un distretto di caccia in Val Pellice e viene quindi sospesa, vista l'esiguità di animali presenti, la caccia all'ovino in Val Chisone (decisione già peraltro adottata nella stagione 1999/2000).

Nel 2015, durante i conteggi al Camoscio, al Cervo e Capriolo, non si sono raccolte osservazioni inizio-primaverili (aprile) di Muflone in Val Chisone. A Pragelato durante il censimento al canto della Pernice bianca del 30 maggio non sono stati osservati animali, nè durante il censimento del Camoscio del 20. In Val Germanasca durante il conteggio del Camoscio del giorno successivo sono stati avvistate 6 femmine, 1 agnello e 1 maschio in zona Lago verde//Gran Guglia. In quest'area, durante i censimenti estivi con i cani dei galliformi sono stati osservati una decina di animali.

Riassunto osservazioni inizio-primaverili:

Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
--	--	--	--	--

Riassunto osservazioni tardo-primaverili:

Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
8	1	6	1	--

Confronto con gli anni precedenti - censimento inizio-primaverile:

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1996	N.E.	--	--	--	--	--
1997	19-20/4	22	22	--	--	--
1998	18-19/4	4	4	--	--	--
1999	Aprile	10	8	1	1	--
2000	Feb-Apr	6	6	--	--	--
2001	Mar-Apr	9	3	--	--	6
2002	Mar-Apr	--	--	--	--	--
2003	Mar-Apr	--	--	--	--	--

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
2004	Mar-Apr	--	--	--	--	--
2005	Aprile	--	--	--	--	--
2006	Aprile	--	--	--	--	--
2007	Aprile	--	--	--	--	--
2008	Aprile	--	--	--	--	--
2009	Aprile	--	--	--	--	--
2010	Aprile	--	--	--	--	--
2011	Aprile	--	--	--	--	--
2012	Aprile	--	--	--	--	--
2013	Aprile	--	--	--	--	--
2014	Aprile	--	--	--	--	--
2015	Aprile	--	--	--	--	--

Confronto con gli anni precedenti - censimento tardo-primaverile:

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1996	16/6	65	20	--	--	45
1997	7/6	45	23	11	9	2
1998	6/6	8	3	3	2	--
1999	5-15/6	13	7	3	--	3
2000	17-24/6	53	2	5	2	44
2001	17-22/6	--	--	--	--	--
2002	22-23/6	14	--	--	--	14
2003	21/6	14	7	--	--	7
2004	19/6	17	9	--	--	8
2005	Giugno	--	--	--	--	--
2006	Giugno	--	--	--	--	--
2007	Giugno	--	--	--	--	--
2008	Giugno	18	2	--	--	16
2009	Giugno	--	--	--	--	--
2010	Giugno	--	--	--	--	--
2011	Giugno	--	--	--	--	--
2012	Giugno	18	7	9	1	--
2013	Giugno	--	--	--	--	--
2014	Giugno	10	2	6	2	--
2015	Giugno	8	1	6	1	--

COMMENTO

Il risultato del censimento inizio-primaverile del 2015 ha rivelato il minimo storico di animali osservati per la colonia di Muflone della Val Pellice.

Le osservazioni raccolte durante il censimento del Camoscio sono leggermente più incoraggianti benchè, per la prima volta da quanto di registrano questi dati, nessun animale sia stato osservato fuori dall'Oasi del Barant. Questo fatto è in contraddizione con quanto emerso l'anno passato dove mai come prima in proporzione, soprattutto al momento del conteggio estivo, erano stati contattati più animali fuori che all'interno dell'area protetta.


Viene confermato invece quanto già emerso negli ultimi anni, ovvero che si osservano più mufloni durante il censimento del Camoscio che durante il censimento specifico ad aprile, in controtendenza con quanto mostrato negli anni precedenti.

Questo indica una forte sottostima del censimento di aprile, quando gli animali sono concentrati a quote basse in aree fortemente boscate, ma anche il conteggio "estivo" è certamente poco preciso, soprattutto per le aree esterne all'Oasi del Barant, dove gli animali gravitano spesso al limite di zone

boscate o non monitorate con il censimento del Camoscio; deve pertanto presumersi che la colonia abbia certamente una consistenza maggiore di quella stimata.

La pressione venatoria non incide comunque assolutamente sulla dinamica di popolazione della specie, vista l'esiguità del numero di capi abbattuti.

Risultati dei censimenti del Muflone dal 1996 al 2015



Note: dato aprile 2006 capi censiti Val Pellice derivante dal monitoraggio intensivo

2. CERVO (*Cervus elaphus*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1989 in Val Chisone (Pragelato, Roure, Perosa Argentina), dal 1995 in Val Germanasca (Massello, Salza di Pinerolo, Prali, Perrero) e dal 2005 anche in Bassa Val Chisone (S. Germano, Pramollo, Prarostino, Inverso Pinasca e Pinasca).

METODICHE APPLICATE

Dal 1999 sono applicate, per il censimento del Cervo, due metodiche:

- un conteggio primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in quest'occasione viene effettuato anche il censimento del Capriolo nelle Valli Chisone e Germanasca);
- osservazioni notturne con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone e in Val Germanasca allo scopo di integrare i dati ricavati con la precedente metodica in un ambiente boscato e antropizzato difficile da censire a vista.

Vengono altresì vagliate le osservazioni di gruppi di Cervi relative ai giorni immediatamente antecedenti e seguenti i suddetti censimenti allo scopo di eventualmente integrare i dati raccolti.

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita nel 2015 comprende per intero quella occupata dal Cervo nell'ambito del CATO1 nel periodo in esame e interessa il territorio dei Comuni di Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Perrero, Salza di Pinerolo, Prali, Pramollo, San Germano e Inverso Pinasca.

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone e Val Germanasca			
Settore	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Val Germanasca	Bassa Val Chisone 2	TOTALE
Superficie censita prevista ha	3.661	4.968*	4.627*	3.018*	16.274*
Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha	0	0	0	0	0
Numero zone previste	17	19+3	36+4	13+3	85+10
Superficie censita coperta ha	3.362	4.809+159	4.212	1.301+1.292	15.134
Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha	0	0	0	0	0
Numero zone coperte	16	19+3	31+4	10+4	77+10
S.U.S. Cervo ha (dati OGUR)	4.841	5.911	13.922	5.512	30.186
% di S.U.S. censita	69,4	84,0	30,3	47,4	50,1

Note: * = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro. Il numero di zone indicato dopo il "+" è riferito alle zone censite con il faro.

2.1 CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

DATE

Calendario programmato:

Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Val Germanasca	Bassa Val Chisone 2
18/4	18/4	19/4	19/4

Calendario effettivamente realizzato (solo censimenti diurni):

Date	Numero Zone				TOTALE
	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca	
18/4	16	19	9		44
24/4			1		1
26/4				28	28
30/4				3	3
TOTALE	16	19	10	31	76

METEO (solo censimento diurno e solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca
Data	18/4	18/4	18/4	26/4
Cielo	Sereno	Coperto	Coperto	Coperto
Precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Moderato	Moderato	Moderato	Moderato
Visibilità	Buona	Discreta	Discreta	Pessima
Quota neve vers. S m.s.l.m.	2.100	2.000	2.000	2.300
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.800	1.600	1.600	1.800
Meteo giorno precedente	Sereno	Sereno	Variabile	Pioggia

PARTECIPANTI (solo censimento diurno)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca	Val Germanasca	Totale
Data	18/4	18/4	18/4	24/4	26/4	30/4	
N. zone	16	19	9	1	28	3	76
Totale operatori	33	42	19	2	54	2	152
Tecnici faunistici CA	1	1		2	2	2	8
Coordinatore reg.							
Soci CA	32	40	19		50		141
Agenti venatori prov.							
Guardie volontarie							
Agenti CFS							
Guardaparco							
Laici		1			2		3

ORARIO DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca
Data	18/4	18/4	18/4	26/4
Località ritrovo	Pragelato	Perosa A.	S.Germano	Perrero
Ora ritrovo	6,00	5,30	5,30	5,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	8,30	8,30	8,30	8,30

RISULTATI

Distretto Pragelato:

N.	Zona	Totale	Piccoli 14	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Faussimagna-Confini AFVA	13		1	5	7		
2	Buffavento-Soucheres basses	4			4			
3	Sotto Grand Puy	0						
4	Gran Puy-Lauson	0						
5	Gran Puy-Rocce	10			6	4		
6	Rif-Allevè	0						
7	Allevè-Villardamont	0						
8	Villardamont-Moucrons	39	6		8	20	5	
9	Giarrasson-Blegier	23	6	1	2	14		
10	Bruns-Bourget	1			1			
11	Pitre-Confini CATO2	12			9			3
12	Clot la Soma-Joussaud	13	1		3	3		6
13	Laval - Cumbal d'la Vulp	11	5			6		
14	Burel	NE						
15	Seytes-Confini PNVT	0						

N.	Zona	Totale	Piccoli 14	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
16	Dx or. Val Chisone monte	0						
17	Dx or. Val Chisone valle	0						
	TOTALE	126	18	2	38	54	5	9

Settore Bassa Val Chisone 1:

N.	Zona	Totale	Piccoli 14	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Bacino - Confini AFVA	13			2		1	10
2	Aigliero	6	2			3	1	
3	Gleisolle - Faetto – Balma	23			5			18
4	Madonna della Neve	2				1	1	
5	Colle della Roussa-Bocciarda	0						
6	Bocciarda – Pelvo	0						
7	Castel del Bosco – Vignal	4	1			1	2	
8	Fondovalle Roure	1					1	
9	Meano – Perosa	13	3			5		5
10	Vallone di Bocciarda	3	1			2		
11	Vallone delle Miniere	0						
12	Pra Fayet - Rocca Nalais	10		2		7	1	
13	Clea	12		2	1	7	2	
14	Bourcet: Cappella – Chasteiran	4				4		
15	Bourcet: Colet – Serre	5	1			4		
16	Bourcet: Chaulieres	0						
17	Bourcet: Serrodel Comba del Torno	0						
18	Garnier Orti	3				3		
19	Garnier Monte Morel	0						
	TOTALE	99	8	4	8	37	9	33

Settore Bassa Val Chisone 2:

N.	Zona	Totale	Piccoli 14	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
26	Leiretta – Sappè	9	4			5		
27	Pianet – Lazzarà	0						
27b	Ruata – Pianet	3				3		
28	Buffa - Pralumier – Ribetti	0						
28b	Col Furan	0						
28c	Grange – Pralumier	NE						
29	Clotti –Maison– Dormiglioni	NE						
30	Faetto – Feugiorno	0						
31	Pomeano – Buviera	0						
31b	Oasi Sappè *	0						
32	Pralarossa – Pragiassaud	NE						
33	Combaviola – Costa rauta	1						1
34	Perlà – Roca Tumbà	0						
	TOTALE	13	4	0	0	8	0	1

Note: la numerazione è quella delle schede del capriolo; * zona censite il 24/4

Settore Val Germanasca:

N.	Zona	Totale	Piccoli 14	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Rocca Galmunt	6					6	
2	Cugno-Miande	0						
3	Orgere	0						
4	Giordano-Pomieri	0						
5	Bout du Col - Selle e Turè	0						
6	Indritti - Nido dell'Orso	9	3		2	4		
7	Maiera - Praiet	0						

N.	Zona	Totale	Piccoli 14	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
8	Rodoretto-Crò Allieri	2			2			
9	Crò d'la Rama - Rimas	0						
10	Balma - Berg. della Balma	NE						
11	Crosetto-Aguglia-Gavalupo	0						
12	Gianna-Gardiola-sotto Fontane	0						
13	Rivoira-Meison-Fontane	0						
14	Indritto di Salza *	0						
15	Inverso di Salza - Col. Fontane *	0						
16	Vallone di Salza *	5		2	3			
17	Bessè	0						
18	Maniglia	NE						
19	Vallone-Buccetto-Clot des Ors	0						
20	Ciamunie-Praprumie	0						
21	Traverse-Parant	0						
22	S. Martino - Granero	NE						
23	Muret - Clapier	1			1			
24	Pomayfre	0						
24b	Inverso Pomayfre	NE						
25	Airassa - Balbencia	0						
26	Chiotti - Villasecca	0						
27	Bovile	0						
28	Inverso di Perrero	0						
29	Albarea - Olivieri - Colletto	0						
30	Cassas - Grangette - Pomarat	NE						
31	Crò - Linsard - Faetto - Poet	6						6
32	Ricliaretto	0						
33	Enfouns - Clot - Gilli - Fort Luis	0						
34	Faure-Cerisieri-Torre	4	1			3		
35	Ponte Raut	0						
	TOTALE	33	4	2	8	7	6	6

Note: * zone censite il 30/4

2.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO

2.2.1 Settore Bassa Val Chisone 1

Come dal 1999, è stato realizzato un censimento notturno con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone, allo scopo di integrare i dati ottenuti con il censimento a vista.

L'itinerario percorso (il medesimo degli anni precedenti) ha interessato sia territori coperti dal censimento sopra citato, ma anche zone non osservate situate alla destra orografica del torrente Chisone all'altezza di Villaretto, Balma, Castel del Bosco, Selvaggio, Passoir e Perosa Argentina borgate alte.

Data: 15 aprile 2015

Meteo: sereno.

Orario: dalle 21,30 alle 24,00

Comuni interessati: Roure e Perosa Argentina.

Partecipanti: 7 (2 Tecnici faunistici dipendenti del CA, 1 laici e 4 soci del CA).

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
105	15	36	5	14	35

Note: * classe I M/F nati nel 2014; ** classe II M nati nel 2013

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
1999	41	10				31
2000	40	4	2	1	1	32
2001	27	3	2	2		20
2002	63	3	18	2	8	32
2003	50	1	6	1	4	38
2004	106	9	33	2	13	49
2005	94	18	3	5		68
2006	98	7	29	4	15	43
2007	104	9	17	4	11	63
2008	58	4	17		3	34
2009	74	8	20	4	9	33
2010	68	12	10	3	3	40
2011	33	1	12	3	3	14
2012	90	7	11	8	8	56
2013	101	6	23	5	10	57
2014	72	2	34	2	8	26
2015	105	15	36	5	14	35

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **30 animali (8 maschi adult, 3 daguet, 7 piccoli e 12 indeterminati)**.

2.2.2 Settore Bassa Val Chisone 2

Per il territorio colonizzato dagli animali immessi a scopo di ripopolamento nel febbraio 2002 nel Comune di Pramollo, viene organizzato dal 2005 un censimento notturno con il faro, che interessa alcune aree frequentate in periodo primaverile allo scopo di integrare le osservazioni raccolte durante il censimento al capriolo per osservazione diretta.

Data: 8 aprile 2015.

Meteo: poco nuvoloso.

Orario: dalle 21,30 alle 24,00.

Comuni interessati: San Germano, Prarostino.

Partecipanti: 4 (2 tecnici faunistici dipendente del CA, 1 laico e 1 socio del CA)

Data: 9 aprile 2015.

Meteo: sereno.

Orario: dalle 21,30 alle 24,00.

Comuni interessati: Pramollo, San Germano, Inverso Pinasca, Pinasca, Villar Perosa.

Partecipanti: 4 (2 tecnici faunistici dipendente del CA e 2 soci del CA)

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
33	7	3	7	1	15

Note: * classe I M/F nati nel 2014; ** classe II M nati nel 2013

Il risultato è la combinazione delle osservazioni delle due uscite, tenendo conto della localizzazione degli animali, dei loro possibili spostamenti e della composizione dei branchi.

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2005	11	--	3	--	1	7
2006	15	3	7	1	4	--
2007	17	7	7	--	2	--
2008	40	7	11	1	4	17
2009	34	6	7	2	3	16
2010	37	9	9	2	3	14
2011	29	--	19	3	5	2
2012	23	4	9	--	1	9
2013	64	4	15	5	9	31
2014	22	2	2	2	--	16
2015	33	7	3	7	1	15

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **23 animali (7 maschi adulti, 1 femmina adulta, 7 daguet e 8 indeterminati)**.

2.2.3 Settore Val Germanasca

Allo scopo di integrare le poche osservazioni del censimento diurno per osservazione diretta, dal 2014 si è adottata la tecnica del censimento notturno anche in questo settore.

Data: 16 aprile 2015.

Meteo: poco nuvoloso.

Orario: dalle 21,30 alle 24,00.

Comuni interessati: Pomaretto, Perrero.

Partecipanti: 8 (2 tecnici faunistici dipendente del CA, 2 laici e 4 soci del CA)

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
15	10	4	1	--	--

Note: * classe I M/F nati nel 2014; ** classe II M nati nel 2013

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2014	31	3	5	3	4	16
2015	15	10	4	1	--	--

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **15 animali (11 maschi adulti, 4 femmine adulte e 1 daguet)**.

2.3 OSSERVAZIONI VARIE

Per il settore Val Germanasca sono state raccolte alcune segnalazioni relative ad osservazioni di animali nei giorni immediatamente antecedenti o seguenti il censimento a vista.

Queste riguardano **10 animali (1 piccoli, 3 femmine e 6 indeterminati)** sicuramente sfuggiti durante le operazioni di censimenti diurno e notturno.

2.4 CENSIMENTO AL BRAMITO

Le ultime Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ruminanti approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 non prevedono più l'obbligo di organizzare, con cadenza triennale, operazioni di censimento durante il periodo di bramito, da svolgersi in tutti gli istituti interessati dalla presenza della specie. Le precedenti Linee Guida approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011, riprendendo quelle del 2007, prevedevano quest'obbligo; lo scopo di questo monitoraggio è quello di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata.

Nel settembre 2007 la Regione Piemonte invitava gli istituti interessati dalla presenza del Cervo ad organizzare nel periodo del bramito un censimento per osservazione diretta. Considerate le difficoltà organizzative che impedivano di realizzare un censimento siffatto su vasta scala, visto il ridotto numero di operatori e le poche giornate a disposizione per effetto della già concomitante presenza dell'attività venatoria, si è organizzato un conteggio su area campione, anche allo scopo di saggiare la metodica.

Per il CATO1 l'area prescelta è stata il distretto di Pragelato, con particolare riferimento alla sua porzione in destra orografica, dove maggiori erano le possibilità di osservare animali, più una zona in sinistra orografica dove era stata accertata la presenza di animali alcuni giorni prima del censimento.

Il censimento è stato organizzato in forma sperimentale nel 2007 quindi ripetuto nel 2008, in forma più organica. Nella stessa giornata è stato organizzato un censimento analogo nel Parco Naturale della Val Tronca, nell'Azienda faunistico-venatoria Valloncrò e in una porzione dell'Azienda faunistico-venatoria Albergian.

Nel 2011 il censimento è stato ripetuto essendo trascorso il triennio previsto dalle Linee guida regionali. Purtroppo il forte vento ha certamente influenzato i risultati dei censimenti, penalizzando sia l'osservazione che il contatto acustico con gli animali.

Risultati

Anno	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi	Femmine	Indet.Ad.	Indet.
2007	75	14	3	13	34	11	--
2008	79	20	0	9	28	--	22
2011	19	6	1	2	10	--	--

RIEPILOGO

Distretto/Settore	Totale	Piccoli**	Daguets*	Maschi	Femmine	Indet.
Pragelato	126	18	2	38	54	14
Bassa Val Chisone 1	129	15	7	16	48	43
Val Germanasca	48	4	3	18	11	12
Bassa Val Chisone 2	36	4	7	7	9	9
TOTALI	339	41	19	79	122	78

Note: * classe II M nati nel 2013; ** classe I M/F nati nel 2014; conteggi Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimento notturno; conteggio Val Germanasca comprensivo anche di integrazioni occasionali.

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Distretto	Pragelato	Val Chisone1	V. Germanasca	Val Chisone2	Tot. CATO1
Superficie censita ha	3.362	4.968	4.212	2.592	15.134
N. cervi censiti	126	129	48	36	339
Densità (capi/100 ha)	3,7	2,6	1,1	1,4	2,2
% di indeterminati	11,1	33,3	25,0	25,0	23,0

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguetts	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Pragelato	5/5	15	3.679	204	30	9	27	72	66	5,5
	Bassa Val Chisone	5/5	7	1.761	25	3	1	3	12	6	1,4
	Val Germanasca	15/5	9	1.874	13		1		6	6	0,7
	TOTALI		31	7.314	242	33	11	30	90	78	3,3
1997	Pragelato	19-20/4	16	3.679	177	34	19	15	85	24	4,8
	Bassa Val Chisone	19-20/4	9	2.025	39	3	4	7	23	2	1,9
	Val Germanasca	19-20/4	11	2.176	49	5	2	12	19	11	2,3
	TOTALI		36	7.880	265	42	25	34	127	37	3,4
1998	Pragelato	18/4	14	3.679	112	17	6	6	47	36	3,0
	Bassa Val Chisone	18-19/4	16	2.857	43	2	1	4	20	16	1,5
	Val Germanasca	19/4	21	2.695	59	13	1	5	26	14	2,2
	TOTALI		51	9.231	214	32	8	15	93	66	2,3
1999	Pragelato	17/4	15	3.679	140	33	4	6	65	32	3,8
	Bassa Val Chisone	17-18-19/4	19	3.437	76	9	3	12	27	25	2,2
	Val Germanasca	17-18/4	28	3.898	68	2	3	5	27	31	1,7
	TOTALI		62	11.104	284	44	10	23	119	88	2,6
2000	Pragelato	16/4	16	3.723	192	19	9	12	55	97	5,2
	Bassa Val Chisone	13-16/4	18	4.705	63	5	1	7	23	27	1,3
	Val Germanasca	16/4	26	3.974	44	4	2	6	20	12	1,1
	TOTALI		60	11.835	299	28	12	25	98	136	2,5
2001	Pragelato	7/4	17	3.661	154	18	8	15	41	72	4,2
	Bassa Val Chisone	8/4	18	4.872	97	20	2	7	55	13	2,0
	Val Germanasca	8-9/4	30	4.052	54	5	5	6	11	27	1,3
	TOTALI		65	12.585	305	43	15	28	107	112	2,4
2002	Pragelato	30/4	17	3.661	182	26	12	23	55	66	5,0
	Bassa Val Chisone	14-18-20/4	18	4.907	79	10	2	13	29	25	1,6
	Val Germanasca	21/4	24	3.033	24	2	0	6	5	11	0,8
	TOTALI		59	11.601	285	38	14	42	89	102	2,5
2003	Pragelato	18/4	17	3.661	126	14	5	15	38	54	3,4
	Bassa Val Chisone	12-15/4	17	4.699	64	5	1	1	18	39	1,4
	Val Germanasca	13/4	24	3.033	35	4	1	5	15	10	1,2
	TOTALI		59	11.393	225	23	7	21	71	103	2,0
2004	Pragelato	7/5	17	3.661	203	29	13	27	71	63	5,5
	Bassa Val Chisone	17-20-24/4	19	4.968	110	14	3	9	34	50	2,2
	Val Germanasca	18-27/4	23	2.673	23	2	0	2	8	11	0,9
	TOTALI		59	11.302	336	45	16	38	113	113	3,0
2005	Pragelato	7/5	17	3.661	193	27	7	20	62	77	5,3
	Bassa Val Chisone	23-30/4; 4/5	19	4.809	100	3	5	20	14	58	2,1
	Val Germanasca	30/4	19	2.437	14	0	2	3	6	3	0,6
	TOTALI		55	10.907	307	30	14	43	82	138	2,8
2006	Pragelato	22/5	17	3.661	184	71	23	22	17	51	5,0
	Bassa Val Chisone	19-22-23/4	15	4.070	105	34	7	16	4	44	2,6
	Val Germanasca	23/4	21	2.760	38	14	6	1	8	9	1,4
	TOTALI		53	10.491	327	119	36	39	29	104	3,1

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguetts	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
2007	Pragelato	21/4	17	3.661	281	41	10	38	72	120	7,7
	Bassa Val Chisone	18-21/4	15	4.640	112	12	5	10	23	62	2,4
	Val Germanasca	21/4	21	2.890	26	0	2	6	10	8	0,9
	TOTALI		57	11.191	419	53	17	54	105	190	3,7
2008	Pragelato	24/4	17	3.661	183	35	5	20	69	54	5,0
	Bassa Val Chisone	16-20/4	15	4.640	87	13	2	5	30	37	1,9
	Val Germanasca	20/4	21	2.890	41			2	3	36	1,4
	TOTALI		57	11.191	311	48	7	27	102	127	2,8
2009	Pragelato	18/4	16	3.362	97	15	5	29	32	16	2,9
	Bassa Val Chisone 1	18-22/4	17	4.421	124	12	4	10	28	70	2,8
	Val Germanasca	3/5	20	2.780	31	3		16	8	4	1,1
	Bassa Val Chisone 2	6-9/4		1.337	46	3	2	11	8	22	3,4
	TOTALI		53	11.900	298	33	11	66	76	112	2,5
2010	Pragelato	17/4	15	3.289	55	10	4	17	23	1	1,7
	Bassa Val Chisone 1	17-18-21/4	17	4.421	113	11	7	11	39	45	2,6
	Val Germanasca	18/4	29	4.046	23	0	1	15	6	1	0,6
	Bassa Val Chisone 2	6-8-18/4		2.100	49	7	3	12	13	14	2,3
	TOTALI		61	13.856	240	28	15	55	81	61	1,7
2011	Pragelato	16/4	17	3.661	148	44	26	12	2	64	4,0
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	19	4.968	70	21	4	4	3	38	1,4
	Val Germanasca	17/4	29	3.882	14	2	11	0	0	1	0,4
	Bassa Val Chisone 2	5-7-16-17/4	13	2.297	31	19	2	5	3	2	1,3
	TOTALI		78	14.808	263	86	43	21	8	105	1,9
2012	Pragelato	21/4	16	3.407	175	18	7	27	69	54	5,1
	Bassa Val Chisone 1	17-21/4	21	4.968	130	10	9	7	22	82	2,6
	Val Germanasca	22/4	30	3.991	42	1	1	19	9	12	1,1
	Bassa Val Chisone 2	5-11-22/4	17	3.018	36	1		4	9	22	1,1
	TOTALI		84	15.384	383	30	17	57	109	170	2,5
2013	Pragelato	24/4	15	3.411	154	12	3	41	44	54	4,5
	Bassa Val Chisone 1	15-24/4	10	3.453	127	11	7	10	38	61	3,7
	Val Germanasca	5/5	31	4.060	41	2	1	20	12	6	1,0
	Bassa Val Chisone 2	3-8-10/4	6	2.592	64	9	5	4	15	31	2,5
	TOTALI		62	13.516	386	34	16	75	109	152	2,9
2014	Pragelato	12/4	15	3.334	209	32	6	44	73	54	6,2
	Bassa Val Chisone 1	10-12/4	22	4.968	104	13	3	6	45	37	2,1
	Val Germanasca	13-16/4	34	4.212	56	5	3	12	13	23	1,3
	Bassa Val Chisone 2	3-9-13-18/4	15	2.780	33	1	3	2	4	23	1,2
	TOTALI		86	15.294	402	34	16	75	109	152	2,6
2015	Pragelato	18/4	16	3.362	126	18	2	38	54	14	3,7
	Bassa Val Chisone 1	15-18/4	22	4.968	129	15	7	16	48	43	2,6
	Val Germanasca	16-26-30/4	35	4.212	48	4	3	18	11	12	1,1
	Bassa Val Chisone 2	8-9-18-24/4	14	2.592	36	4	7	7	9	9	1,4
	TOTALI		87	15.134	339	41	19	79	122	78	2,2

Note: i risultati 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 distretti Bassa Val Chisone 1 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i risultati 1999, 2000 e 2002, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2015 distretto Val Germanasca comprensivi di integrazioni per osservazioni occasionali e quelli del 2014 e del 2015 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i dati 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 del distretto Bassa Val Chisone 2 derivano dall'analisi critica di censimenti notturni e di osservazioni condotte durante il censimento al capriolo.

COMMENTO


Come in tutte le altre occasioni in cui i censimenti si sono svolti con limitato ricaccio in alta valle e un buon ricaccio in media e bassa Val Chisone, ma concentrato nei prati e pascoli di fondovalle, si sono registrate anche quest'anno ottime consistenze di animali nel settore Bassa Val Chisone 2 e nell'Azienda faunistico-venatoria Albergian, e più limitate presenze a Pragelato.

I dati dei settori Val Germanasca e Bassa Val Chisone 2 sono invece fortemente influenzati dalla "fortuna" di contattare animali al momento dei censimenti, sia diurni che notturni e mascherano, soprattutto per il distretto Bassa Val Chisone 2, una fortissima sottostima.

Complessivamente l'esito del censimento è positivo e nonostante la flessione di animali conteggiati a Pragelato (per i motivi sopra esposti), denota per l'intera Val Chisone una sostanziale stabilità del popolamento di questo cervide.

Si segnala, per la prima volta, un relativamente rilevante numero di avvistamenti di cervi in Val Pellice durante il censimento al Capriolo e nei giorni/settimane precedenti e successivi il conteggio. Non meno di una decina di esemplari diversi sono stati osservati fra Bibiana e Lusernetta, e in dx orografica al confine fra Villar Pellice e Bobbio Pellice.

Risultati dei censimenti del Cervo dal 1996 al 2015



3. CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)

Censimenti diretti della specie sono eseguiti annualmente dal 1988 nell'area di Pragelato, dal 1992 in alcune zone della bassa Val Chisone e dal 1998 in Val Germanasca ed in Val Pellice, dove fra il 1994 ed il 1998 sono stati effettuati diversi conteggi in battuta su zona-campione.

METODICHE APPLICATE

Censimento primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in concomitanza con il censimento del Cervo in Val Chisone ed in Val Germanasca e con il Muflone in Val Pellice).

I dati della bassa Val Chisone e della Val Germanasca, e della Val Pellice nel 2015, sono integrati con quelli ricavati dalle osservazioni notturne con il faro per il Cervo (cfr. par. 3.2).

AREA OGGETTO DI INDAGINE

Il censimento a vista del Capriolo del 2015 ha interessato la maggior parte delle aree prative e pascolive del CA, comprese entro il territorio di 22 Comuni (Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, San Pietro, Pinerolo, Pramollo, San Germano, Prarostino, Perrero, Pomaretto, Prali, Salza, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Rorà, Lusernetta, Luserna S.G., Bibiana).

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Superficie censita prevista ha	9.184	3.661	10.497 *	4.609	27.951
Superficie in Oasi/ZRC prevista ha	1.740	0	480	95	2.315
Numero zone previste	73	17	39	35	163
Superficie censita coperta ha	6.224+776	3.362	8.101+1.958	4.392	24.814
Superficie coperta in Oasi/ZRC ha	911	0	480	94	1.485
Numero zone coperte	52+1	16	39+7	31+4	138+12
S.U.S. Capriolo ha (dati OGUR)	22.732	4.177	19.911	12.680	59.439
% della S.U.S. censita	30,8	91,8	50,5	34,6	41,7

Note: * = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro (cfr. par. 2.2); ** = 4 zone coperte con il censimento notturno. Il numero di zone indicato dopo il "+" è riferito alle zone censite con il faro.

3.1 CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

DATE

Calendario programmato:

Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
11-12/4	18/4	18-19/4	19/4

Calendario effettivamente realizzato (solo censimento diurno):

Date	Numero zone coperte				TOTALE
	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	
11/4	34				34
12/4	18				18
18/4		16	38		54
24/4			1		1
26/4				23	23
30/4				2	2
7/5				6	6
TOTALE	52	16	39	31	138

PARTECIPANTI (solo censimento diurno, solo zone valide)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	Val Germanasca	Val Germanasca	TOTALE
Data	11/4	12/4	18/4	18/4	24/4	26/4	30/4	7/5	
N. zone	34	18	16	38	1	22	3	6	138
Totale operatori	65	39	33	83	2	41	2	10	275
Tecnici faunistici CA	2	2	1	1	2	1	2	2	13
Coordinatore regionale									
Soci CA	62	36	32	80		39		8	257
Agenti venatori prov.									
Guardie volontarie									
Agenti CFS									
Guardaparco									
Laici	1	1		2		1			5

ORARI DEL CENSIMENTO (solo riferiti alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
Data	11-12/4	18/4	18/4	18/4	26/4
Località ritrovo	Villar P. Torre P.	Pragelato	Perosa A.	S. Germano	Perrero Loc.Sabbiona
Ora ritrovo	5,45	6,00	5,30	5,30	5,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

METEO (solo censimento diurno e solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
Data	11/4	12/4	18/4	18/4	26/4
Cielo	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Nuvoloso
Precipitazioni	Assente	Assente	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Moderato	Moderato	Moderato	Moderato	Moderato
Visibilità	Buona	Buona	Buona	Buona	Pessima
Quota neve vers. S m.	1.600	1.600	2.000	2.100	2.200
Quota neve vers. N m.	1.200	1.200	1.700	1.700	1.800
Meteo giorno precedente	Variabile	Sereno	Variabile	Variabile	Pioggia

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Saret-Forest	0			
2	Romana - Colletto - Faugiau	2			2
3	Carbonieri - Pautas	4	1	2	1
4	Fragnun	NE			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
5	Crosette - Comba Lausa	2	1	1	
6	Vallone della Bruna	0			
7	Cumbal d'la Roussa - Fautet	0			
8	Pralapia - Bosso	0			
9	Giaven - Cialancie	0			
10	Selle - Ponset	0			
10b	Ponset-Gianna	NE			
11	Barbara - Content	NE			
12	Barant	NE			
13	Inverso di Bobbio	2		2	
14	Malbec - Campi - Bariund	5	1	3	1
15	Rostagni - Eiretta	NE			
16	Saret - Eiretta	NE			
17	Cairus - Bariund	5	1	4	
18	Biava - Imeut	4	3	1	
19	Vallone di Eyssart	14	6	8	
20	Villanova- Randulire	8	2	4	2
21	Chiot - Cernira - Maisons	NE			
22	Mirabucas	0			
23	Chiot-Pera Tajà	2	1	1	
24	Crosenna	NE			
25	Mirabucas - Gias d'l'Urs	NE			
26	Pra Curnalio	NE			
27	Pra Agriturismo	NE			
28	Pra Partia d'amunt	NE			
29	Prapic - Giausarant	1			1
30	Cruel - Armaglie	10	5	5	
31	Serre Cruel - Albarea - Sarsenà	17	3	11	3
32	Serre Sarsenà - Rocca Ciabert	5	1		4
33	Podio - Posette - Vigne	3		1	2
34	Bessè - Pra la Comba	17	5	10	2
35	Garnier - Mause - Ciampas	0			
36	Bodeina - Cucuruc - Uccuire *	3		2	1
36b	Fondovalle Bobbio - Villar	65	25	40	
37	Pertusel *	8	2	6	
37b	Gardetta - Falconera	2		2	
38	Gardetta - Carofrate	5	1	3	1
39	Boscas	NE			
40	Peyron - Forestet - Mamauro inf. *	2	1	1	
41	Mamauro di mezzo e sup. - Rami*	2	2		
42	Sapichiot*	2	2		
43	Comba Liussa dx or. *	5	1	4	
43b	Comba Liussa sx or. *	5	1	3	1
44	Chiotas - Codissard - Mondon	4		3	1
45	Podio - Marsili - Sura	11		4	7
46	Inverso di Torre Pellice *	9	1	7	1
47	Pellice - Chabriols *	0			
48	Ruà - Sea di Torre *	24	10	9	5
48b	Nora - Rossenghi - Novarea	NE			
49	Serre - Oddino - Marchetti *	20	4	8	8
49b	Pramula - SerreMalan - SerreLalie	NE			
50	Buonanotte - Arvura - Maria *	12	3	4	5
51	Costa di Rognosa *	7	3	3	1
52	Vaccera - Albarea - Bagnau*	11	3	5	3
52b	Mont Servin - Criulira	NE			
53	Barfè*	8	3	5	
54	Cialaroccia - Sapè - Imbergeria	NE			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
55	Ciampas - Riaglio - Arcia	NE			
56	Tournas - Anchioccia *	1			1
57	Ceresarea - Giasset	NE			
58	Ivert - Ronzei - Fornaci	7	2		5
59	Rummer - Peyret - Ciot	8	2	1	5
60	Pian Frollero - La Palà	NE			
60b	Cornour - Aia delle Balme	NE			
61	Bordella	2		2	
62	Villanot - Giavazze - Sea *	11	5	6	
63	Rorà - Verneis *	4	1	1	2
64	Pian Porcile	0			
65	Vista - Forest	3	2	1	
	TOTALE	342	104	173	65

Note: * = zone censite il 12/4; le altre zone sono state censite l'11/4

Distretto Pragelato:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Faussimagna-Confini AFVA	4	1	1	2
2	Buffavento-Soucheres basses	6	3	2	1
3	Sotto Grand Puy	2		2	
4	Gran Puy-Lauson	6	2	3	1
5	Gran Puy-Rocce	3			3
6	Rif-Allevè	6	2	1	3
7	Allevè-Villardamont	1		1	
8	Villardamont-Moucrons	0			
9	Giarrasson-Blegier	3		3	
10	Bruns-Bourget	3	1		2
11	Pitre-Confini CATO2	5	1	4	
12	Clot la Soma-Joussaud	4	1		3
13	Laval - Cumbal d'la Vulp	1			1
14	Burel	NE			
15	Seytes-Confini PNVT	3	1	2	
16	Dx or. Val Chisone monte	1			1
17	Dx or. Val Chisone valle	0			
	TOTALE	48	12	19	17

Distretto Bassa Val Chisone:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Bacino - Confini AFVA	3			3
2	Aigliero	3		2	1
2b	Fondovalle Villaretto	1			1
3	Gleisolles - Faetto - Balma	2		1	1
4	Madonna della Neve	3		2	1
5	Colle della Roussa-Bocciarda	3	1	2	
6	Bocciarda - Pelvo	3		2	1
7	Castel del Bosco - Vignal	2		2	
8	Fondovalle Roure	3		2	1
9	Meano - Perosa	20		2	18
10	Vallone di Bocciarda	0			
11	Vallone delle Miniere	0			
12	Pra Fayet - Rocca Nalais	15	5	4	6
13	Clea	14	2	11	1
13b	Greisoniere-Roca furà	10	1	8	1
14	Bourcet:Cappella-Chasteiran	3		3	
15	Bourcet: Colet - Serre	10	2	6	2

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
16	Bourcet: Chaulieres	13	4	8	1
17	Bourcet: Serrodel-C.delTorno	7	2	4	1
18	Garnier Orti	4	1	3	
19	Garnier Monte Morel	2	1	1	
20	Pralamar - Cialmette	8	3	4	1
20b	Rocceria - Cuccetto	5	1	2	2
20c	Tagliaretto - Grandubbione	5	1	1	3
21	Grandubbione - Aquila	2		2	
22	Gradubbione-C.le del Besso	6	2	3	1
23	Carla - Col Ceresera	8	2	3	3
24	Crò - Comba la Pera	5	2	3	
25	Dairin - Ciardonnet	8		1	7
26	Leiretta - Sappè	7	1	4	2
27	Pianet - Lazzarà	12	5	7	
27b	Ruata - Pianet	1		1	
28	Buffa - Pralumier - Ribetti	5	2	1	2
28b	Col Furan	1	1		
28c	Grange-Pralumier	NE			
29	Clotti - Maison - Dormigliosi	NE			
30	Faetto - Feugiorno	2	1		1
31	Pomeano - Buviera	2			2
31b	Oasi Sappè *	1			1
32	Pralarossa - Pragiassaud	NE			
33	Combaviola - Costarauta	0			
34	Perlà - Rocca Tumbà	3	1	2	
		202	41	97	64

Note: * = zona censita il 24/4

Distretto Val Germanasca:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Rocca Galmunt *	4	1	2	1
2	Cugno-Miande *	9	3	3	3
3	Orgere	10	3	6	1
4	Giordano-Pomieri	1	1		
5	Bout du Col - Selle e Turè	4	1	1	2
6	Indritti - Nido dell'Orso	2	1	1	
7	Maiera - Praiet	2	1	1	
8	Rodoretto-Crò Allieri *	19	6	8	5
9	Crò d'la Rama - Rimas *	4	2	2	
10	Balma - Berg. della Balma	NE			
11	Crosetto-Aguglia-Gavalupo	2	1		1
12	Gianna-Gardiola-sotto Fontane	0			
13	Rivoira-Meison-Fontane *	1	1		
14	Indritto di Salza **	0			
15	Inverso di Salza - Col. Fontane **	2	1	1	
16	Vallone di Salza **	2	1		1
17	Bessè	1	1		
18	Maniglia	NE			
19	Vallone-Buccetto-Clot des Ors	6	1	3	2
20	Ciamunie-Praprumie	5	2	3	
21	Traverse-Parant	2	1		1
22	S. Martino - Granero	NE			
23	Muret - Clapier *	8	1	4	3
24	Pomayfrè	0			
24b	Inverso Pomayfrè	NE			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
25	Airassa - Balbencia	11	3	6	2
26	Chiotti - Villasecca	3	2		1
27	Bovile	3		3	
28	Inverso di Perrero	0			
29	Albarea - Olivieri – Colletto	8	3	5	
30	Cassas - Grangette - Pomarat	NE			
31	Crò - Linsard - Faetto - Poet	1		1	
32	Riclarotto	0			
33	Enfouns - Clot - Fort Luis	5	1	2	2
34	Faure-Cerisieri-Torre	0			
35	Ponte Raut	2	1	1	
	TOTALE	117	39	53	25

Note: * = zone censite il 7/5; ** = zone censite il 30/4

3.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO

3.2.1 Distretto Bassa Val Chisone e Pinerolese

Come ormai dal 1999, in occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Bassa Val Chisone 1 del 15 aprile 2015 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Roure e Perosa Argentina oggetto del censimento della specie. Sono stati osservati **75 animali (21 maschi, 24 femmine e 30 indeterminati)**.

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Indet.
75	21	24	30

Confronto con gli anni precedenti:

	Totale	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1999	36		12	6	18
2000	78		23	30	25
2001	85		16	19	50
2002	106		19	17	70
2003	74		13	30	31
2004	147		24	26	97
2005	67		9	18	40
2006	112		25	19	68
2007	53		8	8	37
2008	43		14	19	10
2009	86		26	44	16
2010	51		24	22	5
2011	57		16	16	25
2012	92		39	32	21
2013	179		64	68	47
2014	86		27	30	29
2015	75		21	24	30

Durante il censimento notturno con il faro per il Cervo nel settore Bassa Val Chisone 2 in data 8 e 9 aprile sono stati invece osservati **129 animali (31 maschi, 51 femmine e 47 indeterminati)**, localizzati nel territorio dei Comuni di Prarostino, San Germano, Pramollo, Inverso Pinasca, Pinasca e Villar Perosa.

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **154 animali (47 maschi adulti, 57 femmine adulte e 50 indeterminati)**.

3.2.2 Distretto Val Germanasca

In occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Val Germanasca del 16 aprile 2015 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Pomaretto e Perrero oggetto del censimento della specie.

Sono stati osservati **78 animali (24 maschi, 36 femmine e 18 indeterminati)**.

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **61 animali (19 maschi adulti, 28 femmine adulte e 14 indeterminati)**.

3.2.3 Distretto Val Pellice

In occasione del primo censimento notturno al Cervo in bassa Val Pellice del 1° aprile 2015 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Lusernetta e Bibiana oggetto del censimento della specie.

Sono stati osservati **13 animali (13 indeterminati)**.

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **13 animali (13 indeterminati)**.

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	355	104	173	78
Pragelato	48	12	19	17
Bassa Val Chisone	356	88	154	114
Val Germanasca	178	58	81	39
TOTALE	937	262	427	248

Note: dati distretti Val Pellice, Bassa Val Chisone e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimenti notturni.

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
Pragelato	--	--	--			
Val Pellice	Barant	756	36	11	22	3
	TOTALE	756	36	11	22	3
Bassa Val Chisone	Grandubione	220	--			
	Perlà - Chiabrera	98	--			
	Sappè	161	--			
	TOTALE	479	--	--	--	--
Val Germanasca	Perlà-Chabrera	83	1			1
	Rodoretto Audaccia	12	--			
	TOTALE	95	1	--	--	1
TOTALI		1.330	37	11	22	4

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Superficie censita ha	7.000	3.362	10.060	4.392	24.814
N. caprioli censiti	355	48	356	178	937
Densità (capi/100 ha)	5,1	1,4	3,5	4,1	3,8
Sex-ratio (FF/MM)	1,7	1,6	1,7	1,4	1,6
% indeterminati	22,0	35,4	32,0	29,2	21,9

Confronto con i censimenti precedenti:

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Val Pellice				n.e.					
	Pragelato	5/5	15	3.679	300	73	88	21	118	8,2
	Bassa Val Chisone	5/5	7	1.716	27	6	15		6	1,5
	Val Germanasca				n.e.					
	TOTALI		16	3.767	327	79	103	21	124	6,0
1997	Val Pellice	4/5		88	8	6	5		2	14,8
	Pragelato	19-20/4	16	3.679	295	67	80	25	123	8
	Bassa Val Chisone				n.e.					
	Val Germanasca				n.e.					
	TOTALI		16	3.767	308	73	85	25	125	8,2
1998	Val Pellice	11-26/4	24	2.352	65	22	35	1	7	2,8
	Pragelato	18/4	14	3.679	259	65	91	29	74	7
	Bassa Val Chisone	18-19/4	16	2.857	84	26	39	10	9	2,9
	Val Germanasca	19/4	21	2.695	157	29	39	11	78	5,8
	TOTALI		75	11.583	565	142	204	51	168	4,9
1999	Val Pellice	17-27-30/4; 5/5	38	4.554	146	38	54	5	49	3,2
	Pragelato	17/4	15	3.679	269	75	78	20	96	7,3
	Bassa Val Chisone	17-18-19/4	19	4.181	141	41	48	12	40	3,4
	Val Germanasca	17-18/4	28	3.898	229	65	79	22	63	5,9
	TOTALI		100	16.312	785	219	259	59	248	4,8
2000	Val Pellice	8-9/4; 2/5	60	7.686	303	80	92	22	109	3,9
	Pragelato	16/4	16	3.723	266	56	61	10	139	7,1
	Bassa Val Chisone	15-16-18/4	27	7.143	287	77	116	28	66	4
	Val Germanasca	16-17/4	36	5.280	348	94	130	47	77	6,6
	TOTALI		139	23.832	1.204	307	399	107	391	5,1
2001	Val Pellice	31/3; 1-14/4	63	8.184	369	78	118	42	131	4,5
	Pragelato	11/4	17	3.661	386	118	120	24	124	10,5
	Bassa Val Chisone	24/3; 7-8/4	28	7.326	287	68	82	21	116	3,9
	Val Germanasca	8-9/4	40	5.523	378	90	125	41	122	6,8
	TOTALI		148	24.694	1.420	354	445	128	493	5,7
2002	Val Pellice	6-7/4	63	8.067	375	92	148	72	63	4,6
	Pragelato	30/4	17	3.661	325	68	133	24	100	8,9
	Bassa Val Chisone	14-18-20/4	31	7.665	349	85	125	32	107	4,5
	Val Germanasca	21/4	34	4.504	334	78	95	30	131	7,4
	TOTALI		145	23.897	1.383	323	501	158	401	5,8
2003	Val Pellice	5-6/4	65	8.275	425	124	170		131	5,1
	Pragelato	18/4	17	3.661	265	78	129		58	7,2
	Bassa Val Chisone	12-15/4	31	6.998	299	82	132		85	4,3
	Val Germanasca	13/4	34	4.288	329	98	130		101	7,7
	TOTALI		147	23.222	1.318	382	561		375	5,7
2004	Val Pellice	3-24/4	54	6.378	361	104	148		109	5,7
	Pragelato	7/5	17	3.661	237	52	83		102	6,5
	Bassa Val Chisone	17-18-20-24/4	38	8.167	347	74	113		160	4,2
	Val Germanasca	18-27/4	33	4.245	328	80	101		147	7,7
	TOTALI		142	22.451	1.273	310	445		518	5,7
2005	Val Pellice	9-10-30/4	51	5.953	369	131	160		78	6,2
	Pragelato	7/5	17	3.661	209	67	96		46	5,7
	Bassa Val Chisone	23-30/4; 4/5	32	6.968	294	76	109		109	4,2
	Val Germanasca	30/4	28	3.882	267	85	103		79	6,9
	TOTALI		128	20.464	1.139	359	468		312	5,6

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
2006	Val Pellice	8-9/4	57	6.705	448	118	210		120	6,7
	Pragelato	22/5	17	3.661	277	92	138		47	7,6
	Bassa Val Chisone	19-22-23/4	30	6.599	315	98	111		106	4,8
	Val Germanasca	23/4	30	4.205	308	87	129		92	7,3
	TOTALI		134	21.170	1.348	395	588		365	6,4
2007	Val Pellice	14-15/4	63	7.503	614	199	227		188	8,2
	Pragelato	21/5	17	3.661	256	67	105		84	7,0
	Bassa Val Chisone	18-21-22/4	40	8.359	297	76	110		111	3,6
	Val Germanasca	21-22/4	32	4.352	359	89	161		109	8,2
	TOTALI		152	23.875	1.526	431	603		492	6,4
2008	Val Pellice	12-13/4	66	8.000	758	228	347		183	9,5
	Pragelato	24/4	17	3.661	318	110	140		68	8,7
	Bassa Val Chisone	16-20/4	36	7.711	259	82	124		53	3,4
	Val Germanasca	20/4	32	4.424	366	102	149		115	8,3
	TOTALI		151	23.796	1.701	522	760		419	7,1
2009	Val Pellice	24-25/4	55	6.666	462	159	213		90	6,9
	Pragelato	5/5	16	3.362	145	52	78		15	4,3
	Bassa Val Chisone	18-22-25/4	37	7.602	324	99	160		65	4,3
	Val Germanasca	18-25/4; 3/5	28	3.872	246	64	100		82	6,4
	TOTALI		136	21.502	1.177	374	551		252	5,5
2010	Val Pellice	10-11/4	54	6.667	464	140	209		115	6,9
	Pragelato	27/4	16	3.362	134	50	65		19	4,0
	Bassa Val Chisone	6-8-17-18-21/4	38	9.412	344	101	157		86	3,7
	Val Germanasca	18/4	29	4.046	277	84	86		107	6,8
	TOTALI		137	23.487	1.219	375	517		327	5,2
2011	Val Pellice	9-10/4	56	6.710	507	182	225		100	7,6
	Pragelato	16/4	17	3.661	107	24	52		31	2,9
	Bassa Val Chisone	6-7-13-16-17/4	42	8.527	335	116	133		86	3,9
	Val Germanasca	17/4	29	3.882	218	60	106		52	5,6
	TOTALI		144	22.780	1.167	382	516		269	5,1
2012	Val Pellice	21-22/4	56	6.805	596	190	261		145	8,8
	Pragelato	21/4	16	3.407	107	28	57		22	3,1
	Bassa Val Chisone	5-11-17-21-22/4	46	10.497	354	95	137		137	3,4
	Val Germanasca	22/4	30	3.882	256	60	116		80	6,6
	TOTALI		148	24.591	1.313	373	516		369	5,3
2013	Val Pellice	13-14/4	57	6.783	572	175	236		161	8,4
	Pragelato	24/4	15	3.411	123	32	58		33	3,6
	Bassa Val Chisone	3-8-10-15-24-25/4	31	5.860	461	154	197		110	5,9
	Val Germanasca	5/5	31	4.060	316	88	139		89	7,8
	TOTALI		134	20.114	1.472	449	630		393	6,7
2014	Val Pellice	5-6/4	55	6.577	433	132	198		103	6,6
	Pragelato	12/4	15	3.334	53	14	29		10	1,6
	Bassa Val Chisone	2-9-10-12-13-18/4	47	10.258	347	110	145		92	3,4
	Val Germanasca	13-16/4	34	4.212	233	73	92		68	5,5
	TOTALI		151	24.381	1.066	329	464		273	4,4
2015	Val Pellice	1-11-12/4	53	7.000	355	104	173		78	5,1
	Pragelato	18/4	16	3.362	48	12	19		17	1,4
	Bassa Val Chisone	8-9-15-18-24/4	46	10.060	356	88	154		114	3,5
	Val Germanasca	16-26-30/4; 7/5	35	4.392	178	58	81		39	4,1
	TOTALI		150	24.814	937	262	427		248	3,8

Note: i dati del 1997 del Distretto Val Pellice sono riferiti ad un censimento in battuta su area campione; i dati del 1998 del Distretto Val Pellice sono integrati con un censimento in battuta su area campione; i dati del 1999 dei Distretti Val Pellice e Bassa Val Chisone sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 del Distretto Bassa Val Chisone sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati 2014 e 2015 del Distretto Val Germanasca sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati 2015 del Distretto Val Pellice sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni.

COMMENTO


Il conteggio del Capriolo in Val Pellice è stato effettuato in un contesto ambientale di abbondante innevamento, anche alle quote di media montagna, e ricaccio limitato alle sole zone di fondovalle. Anche per Pragelato, una settimana più tardi, le condizioni erano analoghe, soprattutto per quanto riguarda il ricaccio. Le condizioni sono state invece ottimali per il conteggio in Bassa Val Chisone. Per la Val Germanasca la situazione ambientale è stata pessima: il censimento è stato rimandato per maltempo di una settimana rispetto alla data prefissata e nell'occasione del recupero il ricaccio nelle erbacee e della foglia nelle zone di bassa valle era già molto avanzato. Inoltre, il tutto il distretto, la visibilità è stata molto limitata a causa di una fitta nebbia. Per questo distretto, per alcune zone il dato è stato quindi desunto dal censimento notturno, altre zone sono state ripetute con due uscite successive, senza però ottenere risultati particolarmente soddisfacenti.

Complessivamente sono stati conteggiati su tutto il territorio del CATO1 129 caprioli in meno del 2014, con una flessione del 12%. Le diminuzioni maggiori sono state registrate in Val Pellice (-18%) e in Val Germanasca (-24%), distretto particolarmente penalizzato dalle cattive condizioni ambientali durante le operazioni di conteggio. Il dato di Pragelato mostra una flessione inferiore (-9%), e solo il distretto Bassa Val Chisone e Pinerolese mostra un leggerissimo aumento del numero di animali osservati (+2,6%), probabilmente in relazione alle ottimali condizioni ambientali e climatiche al momento del censimento.


Considerato il trend degli ultimi anni è ormai innegabile, evidente e generalizzata la diminuzione del numero di esemplari di questa specie sull'area di censimento.

Si deve considerare comunque che la presenza stabile e diffusa del Lupo non solo incide negativamente per effetto di predazione diretta sugli animali, ma contribuisce anche a causare modificazioni comportamentali che possono incidere sulla distribuzione, sulla contattabilità e sull'osservazione degli animali. Insomma, la flessione reale di questi ultimi anni della popolazione di Capriolo nelle Valli Pellice, Chisone e Germanasca potrebbe essere inferiore a quanto si registra con i censimenti, la cui sottostima potrebbe essere aumentata proprio in funzione dei fattori sopra indicati.

Risultati dei censimenti del Capriolo dal 1998 al 2015



Confronto fra superficie esplorata e numero di animali censiti dal 1996 al 2015



4. CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987.

METODICA APPLICATA

Censimento tardo-primaverile dopo i parti mediante conteggio diretto a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili. Dal 2000 viene adottata per la prima volta una variante a questa metodica tradizionale sopra descritta con la realizzazione di un censimento per la parte bassa dei distretti Val Chisone e Val Germanasca (Comuni di Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Pramollo, Inverso Pinasca, Pomaretto) a fine marzo, prima dei parti e prima del ricaccio della foglia.

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita complessivamente coincide quasi per intero con quella occupata dalla specie nell'ambito dei distretti di caccia al Camoscio del CATO1 nel periodo in esame, oltre ad alcune aree esterne ai distretti ed interessa il territorio dei seguenti Comuni: Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, Pramollo, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pomaretto, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Angrogna, Frossasco, Cantalupa, San Pietro Val Lemina e Pinerolo.

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE CATO1
Superficie censita prevista ha	11.600	7.522	9.275	28.397
Superficie in Oasi/ZRC prevista ha	3.024	691	159	3.874
Numero zone previste	55	43	49	147
Superficie censita coperta ha	9.969	6.574	8.641	25.184
Superficie coperta in Oasi/ZRC ha	2.572	582	159	3.313
Numero zone coperte	44	36	41	121
S.U.S. Camoscio ha (dato OGUR)	14.096	11.257	11.884	37.237
% di S.U.S. censita	70,7	58,4	74,6	67,6

DATE

Calendario programmato:

Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	Zone fuori distretti
20/6	18/4	19/4	19/4
21/6	19/4	21/6	20/6
	20/6		

Calendario effettivamente realizzato:

Date	Numero zone coperte				TOTALE
	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	Zone fuori distretti	
18/4		28		1	29
24/4		1			1
26/4			4		4
20/6	35	7			42
21/6	9		37		44
TOTALE	44	36	41	1	122

PARTECIPANTI (dati complessivi riferiti alle sole schede ritenute valide)

Distretto	Val Chisone (bassa)	Val Chisone (basse)	Val Germanasca (bassa)	Val Pellice	Val Chisone (Pragelato)	Val Pellice	Val Germanasca (alta)	Zone furoi distretti	TOTALE
Data	18/4	24/4	26/4	20/6	20/6	21/6	21/6	18/4	
Zone di osservazione	28	1	4	35	7	9	37	1	122
Totale operatori	58	2	9	68	14	16	63	2	232
Tecnici faunistici CA		2		2		1	1		6
Soci CA	57		9	61	14	14	61	2	219
Agenti venatori prov.									
Agenti CFS									
Guardiaparco									
Laici				5		1	1		7

ORARI DI CENSIMENTO (solo riferiti alle giornate principali)

Distretto	Val Chisone	Val Germanasca	Val Pellice	Val Chisone	Val Pellice	Val Germanasca
Data	18/4	26/4	20/6	20/6	21/6	21/6
Località ritrovo	Perosa A. S. Germano	Perero Sabbione	Bivio Rif. Barbara	Pragelato	Torre Pellice	Perero Sabbione
Ora ritrovo	5,30	5,30	4,30	5,00	4,30	4,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

METEO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Chisone	Val Germanasca	Val Pellice	Val Chisone	Val Pellice	Val Germanasca
Data	18/4	26/4	20/6	20/6	21/6	21/6
Cielo	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Moderato	Moderato	Debole	Debole	Debole	Moderato
Visibilità	Buona	Scarsa	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima
Quota neve vers. S m.s.l.m.	2.100	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Meteo giorno precedente	Variabile	Variabile	Variabile	Variabile	Sereno	Sereno

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 15	Yearling	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Plà – Malanà	18		8		1	8	1
2	Chiot la Sella – Piantasse	6		1		2	1	2
3	Ciabraressa – Frioland	16		5	2	3	5	1
4	Garbasse	5		2			2	1
5	Camisa	6		1	1		1	3
6	Grange della Gianna	NE						
7	Sea Bessa – Fiunira	30			12	14	1	3
8	Causinas – Colle della Gianna	4				2	2	
9	Rocche bianche – Rocche nere	4				2	2	
10	Fagnun – Garin	NE						
11	Bruna – Cumbal d'le Nivie	NE						
12	Roussa – Fautet	22		4	2	2	6	8
13	Col Barant	31		2	4	4	12	9
14	Biava - inverso Barant	1						1
15	Barbara - Punta Pleng	53		15	14	5	19	
16	Cianai di Coi	41	9	13	2	2	15	
17	Arbancie – Manzol – Armoine	19		2	7	4	6	
18	P-Sineive–Vittona-C.le vecchio	7		1		5	1	
19	Agugliassa – Comba Meutira	0						
20	Rif. Granero – Lago Nero	NE						
21	Cumbalas - Genebrera	17		1	8	6	1	1
22	Punta Pleng	44		8	11	7	12	6
23	Col Porsel – Pra Agriturismo	7		1		1	1	4
24	Colle della Croce	5				2		3
25	Barant vers. Pra	21		7	3	2	9	
26	Bars di Arè	35		7	3	4	11	10
27	Barricate – Colle dell'Urina	22		4	2	9	7	
28	Gias d'l'Urs – Gorgia	16		3		3	3	7
29	Crosennetta – Spessa	31		5	3	7	8	8
30	Crosenna – Content - Resiassa	13		2	1	4	5	1
30b	Bucie - Mait Bucie	NE						
31	Villanova – Prà	17		3	2		9	3
32	Vallone della Pissa	37		12	5	6	14	
33	Colletta delle Faure	14			1	5	3	5
34	Burfarant - Bariund*	NE						
34b	Eyssartet-Bariund	NE						
35	Vallone Giulian – Rousset	41		14	4	2	14	7
36	Pisset - Guglia*	7				2	4	1
37	Costa Sandrone - Pisset*	66		19	1	7	30	9
38	Fondovalle Barma d'Aut	9		2	1	4	2	
38b	Rocca Ciabert	4		1	1	1	1	
39	Caugis - Gias Subiasco	43		5	11	13	10	4
40	Pisset - Cornour*	64	1	26	4	4	26	3
41	Turle - Vergia*	41	7	13	4	1	16	
41b	Fautet - Turle	NE						
42	Pertusel - Rospard*	6	2	2			2	
43	Gard - Vantacul*	28		5	8	7	7	1
44	Gardetta – Falconera	4						4
45	Castelluzzo – Costa chiosa	3			1			2
46	Villanot - Cialaroccia	NE						
47	Sella - Piatta di Biasi	NE						

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 15	Yearling	Maschi	Femmine	Indet.Ad
48	Infernet – Gran Truc*	10				4	1	5
49	Lausas – Infernet*	32		8	1	7	8	8
50	Giasset – Sparvira*	28		8	2	5	10	3
51	Sella Vecchia - Roux	NE						
	TOTALE	928	19	210	121	159	295	124

Note: * zone censite il 21/6; tutte le altre sono state censite il 20/6

Distretto Val Chisone (censimento bassa valle):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 15	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Aigliero - Gran Saret	4				2		2
2	Comba Rouen	2				1		1
3	Malvicino	0						
4	Clea - Malvicino	7			1	1	1	4
5	Bourcet – Cappella	4						4
6	Greisoniere - Rocca pertusà	7			3	1	3	
7	Bourcet - Serre	7			2	2	3	
8	Bourcet – Chaulieres	28				7		21
9	Serrondet - Comba del Torno	1				1		
10	Falconera Monte Morel	5				1	3	1
11	Garnier orti	6				2	1	3
12	C.le della Roussa – Bocciarda	0						
13	Ciambellier – Pelvo	51			4	8	12	27
13b	Vivian - Giavella	NE						
14	Briere - Vallone di Bocciarda	29			6	10	3	10
15	Vallone delle Miniere	35	11	3	4	7	10	
16	Pra Fayet – Rocca Nalais	11			2	3	3	3
17	Pralamar - Cuccetto – Merla	30			12	6	12	
18	Aquila - Alpe di Giana	18	9		2	3	4	
19	Muretto – Besso	8			3	2	1	2
20	Ceresera – Cristetto	10			2	2	3	3
21	Crò - Comba la pera	2				1	1	
22	Tagliaretto - Grandubbione	18	14		1	1		2
23	M. Cuccetto	2				1	1	
24	Pralarossa - M. Castelletto	NE						
25	Cialmetta - Miandette	3			1	1	1	
26	Oasi Sappè *	31	7		6	6	8	4
27	Rocca Renier	NE						
28	Leiretta - Costa Lazzarà	0						
29	Lazzarà – Pralumier	NE						
30	Combaviola - Costarauta	1				1		
31	Perlà - Rocca Tumbà*	9			1	2	4	2
32	Col Furan	24			8	2	3	11
	TOTALI	353	41	3	58	74	77	100

Note: * = zona censita il 24/4.

Distretto Val Chisone (censimento alta valle del 20.6.2015):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 15	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
33	Banchetta	10		1	6	1	2	
34	Burel	NE						
35	Seytes – Morefredo	1				1		
36	Vallone di Mendia	4				4		
37	Vallone del Gran Mioul	3	2			1		
38	Pra d'Amont	15		3	5	3	4	
39	Vallone di Soucheres basses	NE						
40	Col Basset - Pitre de l'Aigle	2			1		1	
41	Rocce – Faussimagna	10			5	4	1	
42	Costa Piana - Genevris	NE						
	TOTALI	45	2	4	17	14	8	0

Distretto Val Germanasca (censimento alta valle del 21.6.2015):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 15	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Costa Frappier	25		6	1	5	9	4
2	Pian Littorio - Lago Verde	NE						
3	Pian Littorio - Gran Guglia	16			6	3	2	5
4	Fondovalle Bout du Col	7		3	1		3	
5	Bout du Col	11		1		4	1	5
6	Vallone della Longia	12		4	1	1	6	
7	Vergia	105	73	16			16	
8	Monte Selletta	1						1
9	Rocca Galmount	6					4	2
10	Vallone delle Miniere	8			1	1	3	3
11	Vallone Giulian	5		1		1	1	2
12	Vallone dei 13 Laghi	25				2		23
13	Rocca Bianca – Lago d'Envie	2				2		
14	Maiera – Praiet	1				1		
15	Lausa Bruna	9		4		1	4	
16	Crosetto – Malzas	1				1		
17	Gavalupo – Aguglia	10		3	2	2	3	
18	Pra dl'Urs – Cavallo Bianco	7			2	3		2
19	Vergia – Cavallo Bianco	20			5	5	10	
20	Barifreddo – Pignerol	26	1		9	4	12	
21	Rimas – Trusciera - Fetulà	5				5		
22	Misiera – Laparè	NE						
23	Castello – Violetti	4				3		1
24	Alpe di Salza – Fournet	34	4	11	2	6	11	
25	Servecchio – Fontane	7		3			3	1
26	Rivoira – Meisons	6		1		2	1	2
27	Pomeifrè	6		2	1	1	2	
28	Pelvo – Ortiarè – Plan	13		3		3	3	4
29	Bric Rosso – Fea Nera	7		2		3	2	
30	Ruetas – Beth	2				2		
31	Martoretto – Bric dei Denti	58		3	8	23	12	12
32	Balmetta – Culmina	55		17	3	7	18	10
33	Muret	15		5	2	2	6	
34	Quins	NE						
35	Bessè	NE						
36	Rocca Bianca (Faetto)	32		4	9	3	5	11
37	Bauciusa	24		5	1	2	9	7
38	A. della Balma – R.ca Bianca	56		16	14	4	20	2
39	Cialancia – Punta Bruta	NE						
40	Cialaretto - Voutour	NE						
41	Gran Truc - Lauson	2				2		
42	Vallone d'Envie	3			2		1	
43	Colle della Buffa - Muret	16		4	2	1	9	
44	Costanera	NE						
	TOTALE	642	78	114	72	105	176	97

Distretto Val Germanasca (censimento bassa valle del 26.4.2015):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 15	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
45	Vallone di Riclaretto	0						
46	Ponte Raut	2				1		1
47	Faure - Tre Valli	0						
48	Enfous – Cabote	1				1		
49	Cave Brandoneugna	NE						
	TOTALE	3	0	0	0	2	0	1

Altre zone censite esterne ai distretti di caccia al Camoscio:

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 15	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Sperina – Freidour *	24		5	3	5	7	4
2	Sbarua - Tre Denti	NE						
3	Cantualupa – Tre Denti	NE						
4	Col Marione - M. Brunello	NE						
5	Cornour – La Palà	NE						
6	Valanza-Cavallo	NE						
7	Monte Benedetto	NE						
	TOTALI	24	0	5	3	5	7	4

Note: * = zone censite il 18/4

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad.
Val Pellice	928	19	210	121	159	295	124
Bassa Val Chisone	353	41	3	58	74	77	100
Alta Val Chisone	45	2	4	17	14	8	0
Bassa Val Germanasca	3	0	0	0	2	0	1
Alta Val Germanasca	642	78	114	72	105	176	97
Zone fuori distretti	24	0	5	3	5	7	4
TOTALI	1.995	140	336	271	359	563	326

RIASSUNTO (solo distretti di caccia)

Distretto	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad.
Val Pellice	928	19	210	121	159	295	124
Val Chisone	398	43	7	75	88	85	100
Val Germanasca	645	78	114	72	107	176	98
TOTALI	1.971	140	331	268	354	556	322

RIEPILOGO (classi degli indeterminati accorpate)

Distretto	Totale	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	928	210	121	159	295	143
Val Chisone	398	7	75	88	85	143
Val Germanasca	645	114	72	107	176	176
TOTALI	1.971	331	268	354	556	462

di cui contati in Oasi di Protezione o Zona di Ripopolamento e cattura:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet. Ad.
Val Pellice	Barant	2.039	237	9	52	37	23	85	31
	Subiasco	533	147	1	48	11	19	58	10
	TOTALE	2.571	384	10	100	48	42	143	41
Val Chisone	Grandubbione	219	10	9	0	0	1	0	0
	Perlà Chiabrera	60	34	0	0	9	5	7	13
	Sappè	302	26	5	0	6	6	5	4
	TOTALE	582	70	14	0	15	12	12	17

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet. Ad.
Val Germanasca	Rodoretto Audaccia	107	0	0	0	0	0	0	0
	Perlà Chiabrera	50	1	0	0	0	1	0	0
	TOTALE	157	1	0	0	0	1	0	0
TOTALI		3.310	455	24	100	63	55	155	58

Parametri rilevati sulla popolazione censita (dati calcolati sugli animali conteggiati nei distretti di caccia):

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE CATOI
Superficie censita ha	9.969	6.574	8.641	25.184
N. camosci censiti	928	398	645	1.971
Densità (capi/100 ha)	9,3	**	7,5	**
Densità pre-parti (capi/100 ha)	7,2	5,9	6,1	6,5
Sex-ratio (FF/MM)	1,9	1,0	1,8	1,6
Incremento 2015 (% capretti)**	22,6	**	17,7	**
Capretti/100 femmine**	71,2	**	64,8	**
% indeterminati	15,4	35,9	27,3	23,4

** dati non calcolabile per la Val Chisone essendo questo distretto censito in parte prima dei parti

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adulti	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Val Pellice	8/6	30	7.906	704	103	105	100	120	159	117	7,6
	Val Chisone	15/6	20	4.659	387	50	67	60	57	81	72	6,9
	Val Germanasca	15/6	20	7.657	1.071	497	111	91	94	119	159	12,5
	TOTALI		70	20.222	2.162	650	283	251	271	359	348	9,1
1997	Val Pellice	7-8/6	44	10.623	1.188	18	241	124	237	324	244	8,9
	Val Chisone	31/5; 7-8/6	24	5.024	430	32	66	68	91	92	81	7,2
	Val Germanasca	7-8/6	29	9.437	1.139	180	167	146	181	244	221	10,3
	TOTALI		97	25.084	2.757	230	474	338	509	660	546	9,1
1998	Val Pellice	30-31/5	46	10.997	1.187	116	217	168	223	310	153	8,8
	Val Chisone	6-7/6; 13-14/6	28	5.364	431	18	97	49	69	118	80	6,2
	Val Germanasca	7/6-14/6	34	10.312	1.491	68	313	163	256	374	317	11,4
	TOTALI		108	26.673	3.109	202	627	380	548	802	550	9,3
1999	Val Pellice	29-30/5	50	12.018	1.321	98	208	144	269	339	263	9,3
	Val Chisone	5-6/6; 13/6	27	5.364	360	34	59	58	68	80	61	5,6
	Val Germanasca	6-13/6	37	10.608	1.492	139	287	172	230	360	304	11,3
	TOTALI		114	28.000	3.173	271	554	374	567	779	628	9,4
2000	Val Pellice	3-4-15/6	51	11.458	1.362	116	278	121	242	342	263	9,5
	Val Chisone	25-26/3; 17/6	35	6.632	524	83	19	84	130	110	98	7,6
	Val Germanasca	25-26/3; 18-24-25/6	44	11.386	1.644	199	368	120	222	423	312	11,3
	TOTALI		130	29.476	3.530	398	665	325	594	875	673	9,7
2001	Val Pellice	14-19/6	51	11.600	1.296	134	286	108	199	338	231	8,7
	Val Chisone	24/3; 22/6	40	7.153	485	47	4	102	110	120	102	6,7
	Val Germanasca	24/3; 17/6	41	9.982	1.288	228	191	141	248	270	210	11
	TOTALI		132	28.735	3.069	409	481	351	557	728	543	9
2002	Val Pellice	15-16/6	49	11.184	1.116	97	248	99	178	307	187	7,8
	Val Chisone	23/3; 22/6	40	7.081	465	71	10	85	101	99	99	6,4
	Val Germanasca	23/3; 23-27-29/6	49	10.166	1.304	98	278	115	217	379	217	10,0
	TOTALI		138	28.431	2.885	266	536	299	496	785	503	8,3

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adulti	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
2003	Val Pellice	14-15/6	48	11.303	1.079	78	229	92	188	308	184	7,5
	Val Chisone	29/3; 21/6	37	6.534	452	84	1	84	99	94	90	6,9
	Val Germanasca	29/3; 23-27/6	46	10.082	1.362	217	327	86	173	371	188	10,3
	TOTALI		131	27.919	2.893	379	557	262	460	773	462	8,3
2004	Val Pellice	12-13-18/6	51	11.438	864	41	209	71	112	259	172	5,7
	Val Chisone	18-24/4; 19/6	40	6.844	413	84	6	53	79	77	114	5,9
	Val Germanasca	18/4; 20-21-24/6	45	9.656	999	74	225	74	136	269	221	7,9
	TOTALI		136	27.938	2.276	199	440	198	327	605	507	6,6
2005	Val Pellice	18-19-20/6	46	10.278	954	45	235	88	135	299	152	7,0
	Val Chisone	23-30/4; 4/5; 25/6	34	6.454	433	45	47	65	88	109	79	6,0
	Val Germanasca	30/4-26/6	44	8.728	923	76	204	87	140	257	159	8,2
	TOTALI		124	25.460	2.310	166	486	240	363	665	390	7,2
2006	Val Pellice	17-18/6	48	10.367	973	92	215	74	152	304	136	7,3
	Val Chisone	22-23/4; 24/6	32	6.015	347	26	0	66	89	100	66	5,8
	Val Germanasca	23/4-25/6	43	8.629	866	68	192	90	107	226	183	7,8
	TOTALI		123	25.041	2.186	186	407	230	348	630	385	7,1
2007	Val Pellice	16-17/6	51	11.153	1.122	37	295	138	166	375	111	7,4
	Val Chisone	21-22/4; 23/6	40	6.840	392	30	10	81	102	109	60	5,6
	Val Germanasca	21-22/4; 24/6	47	9.246	801	41	162	76	137	209	176	6,9
	TOTALI		138	27.239	2.315	108	467	295	405	693	347	6,8
2008	Val Pellice	28-29/6; 5/7	52	11.183	826	42	177	93	122	240	152	5,8
	Val Chisone	20/4; 21-22-29/6	35	6.396	487	12	104	63	73	164	71	6,0
	Val Germanasca	20/4; 22/6; 1/7	45	8.876	747	21	152	90	137	208	139	6,7
	TOTALI		132	26.455	2.060	75	433	246	332	612	362	6,2
2009	Val Pellice	13-14/6	49	10.203	936	24	226	89	131	302	164	7,0
	Val Chisone	18-25/4; 20-21/6	40	7.134	415	9	59	73	74	124	76	5,0
	Val Germanasca	18-25/4; 3/5; 21/6	39	7.758	538	22	104	48	98	136	130	5,6
	TOTALI		128	25.095	1.889	55	389	210	303	562	370	6,0
2010	Val Pellice	12-13/6	49	10.225	1.086	34	285	124	147	324	172	7,8
	Val Chisone	17-18/4; 19-22/6	37	6.789	485	17	70	73	87	133	105	6,1
	Val Germanasca	18/4; 27/6	40	8.404	674	28	126	66	125	173	156	6,5
	TOTALI		131	25.418	2.245	79	481	263	359	630	433	6,9
2011	Val Pellice	11-12/6	48	11.155	1.066	36	255	102	179	321	173	7,3
	Val Chisone	16-17/4; 18/6	39	6.789	380	29	1	56	88	104	102	5,6
	Val Germanasca	17/4; 19/6	45	9.080	738	17	149	79	121	205	167	6,4
	TOTALI		132	27.024	2.184	82	405	237	388	630	442	6,6
2012	Val Pellice	16-17/6	51	11.035	1.000	55	233	95	156	301	160	7,0
	Val Chisone	21-22/4; 23/6	41	7.148	384	39	4	70	89	109	73	5,3
	Val Germanasca	22/4; 24/6	45	9.054	637	11	127	55	120	189	135	5,6
	TOTALI		138	27.237	2.021	105	364	220	365	599	368	6,0
2013	Val Pellice	15-16/6	51	10.760	1.142	31	287	112	180	387	145	7,9
	Val Chisone	24-25/4; 5/5; 22/6	36	6.811	367	17	47	59	68	93	83	4,7
	Val Germanasca	5/5; 23/6	44	8.889	789	88	161	55	132	218	135	7,0
	TOTALI		131	26.460	2.298	136	495	226	380	698	363	6,8
2014	Val Pellice	14-22/6	46	10.075	985	37	239	114	159	336	100	7,4
	Val Chisone	12-13/4; 14-21/6	38	7.069	344	15	51	46	65	122	45	4,1
	Val Germanasca	13/4; 22/6	46	9.205	709	11	139	56	108	193	202	6,2
	TOTALI		130	26.349	2.038	63	429	216	332	651	347	6,1
2015	Val Pellice	20-21/6	44	9.969	928	19	210	121	159	295	124	7,2
	Val Chisone	18-24/4; 20/6	36	6.574	398	43	7	75	88	85	100	5,9
	Val Germanasca	26/4; 21/6	41	8.641	645	78	114	72	107	176	98	6,1
	TOTALI		121	25.184	1.971	140	331	268	354	556	322	6,5

Note: il censimento degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007 e 2015 in Val Chisone è stato realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Pragelato); il censimento degli anni 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in Val Chisone è realizzato in parte in aprile (Comuni di Roure, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Persosa Arg., Pragelato, Pinasca); il censimento degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 in Val Germanasca è realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Pomaretto e Vallone di Ricalaretto). La densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (capretti).


COMMENTO

Dopo gli incrementi osservati nel 2013 del numero di capi censiti in tutti i distretti, i conteggi del 2014 mostrano, anche per il camoscio, un'inversione di tendenza, con flessioni in Val Pellice pari al -14%, in Val Germanasca del -10%, in Val Chisone del -6%.


Le condizioni meteorologiche al momento dei conteggi possono essere considerate soddisfacenti soprattutto per la Val Pellice e la Val Germanasca. Per la Val Chisone, l'area a maggior concentrazione di animali (massiccio delle Bocciarda), è stata censita solo a giugno, in quanto il previsto censimento di aprile non è stato realizzato per scarsa visibilità. Comprendendo per gran parte zone di media montagna si preferisce censire questo distretto a inizio primavera, prima del ricaccio del bosco, dove una parte degli animali staziona tutto l'anno.

Per la Val Germanasca la flessione di capi censiti è soprattutto nelle zone di confine con il Parco della Val Tronca e l'azienda faunistico-venatoria "Valloncrò"; è quindi ipotizzabile che si tratti di branchi non osservati perchè stazionanti al momento dei conteggi al di fuori dei confini del CATO1. Per la Val Pellice, la diminuzione è invece imputabile esclusivamente ad una significativa flessione di animali osservati nei valloni di Subiasco e Rospard (-36% rispetto al 2013, solo in quest'area).


Risultati dei censimenti al Camoscio dal 1996 al 2015



Superficie censita e densità complessiva osservata dal 1996 al 2015




Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2005 al 2015 per macrozona – Val Pellice




Legenda: A=Confine CACN1 (Frioland-Rocche nere); B=Confine Francia (Col vei - Crosennetta); C=Crosenna - Bancet - Bariund; D=Giulian -Pisset-Subiasco; E=Rospard-Vandalino; F=Angrogna; G=Oasi Barant e aree limitrofe.

Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2005 al 2015 per macrozona – Val Chisone



Legenda: A=Confini PNOR; B=Malvicino-Clea-Bourcet; C=Garnier; D=Bocciarda; E=Grandubbione; F=Pramollo-Sappè; G=Inverso Pinasca; H=Pragelato. Tutte le consistenze sono al netto degli individui di classe 0.

Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2005 al 2015 per macrozona – Val Germanasca




Legenda: A=Frappier-Longia-Vergia-Galmount; B=Guglia-Miniere-Giulian-Rocca Bianca; C=Rodoretto; D=Salza
E=Fontane-Pomaifrè; F=Massello; G=Faetto-Crosetto; H=Muret.


CENSIMENTO UNGULATI 2015

CARTOGRAFIA


Censimento primaverile Muflone 2015 - Area di censimento prevista




Censimento estiva Muflone 2015 - Area di censimento prevista




Censimento Capriolo 2015 - Area di censimento prevista




Censimento Cervo 2015 - Area di censimento prevista




Censimento Camoscio 2015 - Area di censimento prevista




Censimento primaverile Muflone 2015 – Area di censimento e localizzazione animali osservati




Censimento estivo Muflone 2015 – Area di censimento e localizzazione animali osservati




Censimento Capriolo 2015 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



Censimento Cervo 2015 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



Censimento Camoscio 2015 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



Censimento Camoscio 2015 - Densità osservate

