



**COMPRESORIO ALPINO TO 1
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA**

STAGIONE VENATORIA 2015/2016

***INCHIESTA SULLA PRESSIONE DI CACCIA
ALLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA
ATTRAVERSO L'ANALISI
DEI TAGLIANDI DI CACCIA GIORNALIERI***

Bricherasio, 13 gennaio 2016

**A cura di
MARCO GIOVO
Responsabile Tecnico CATO1**

Come già effettuato al termine di ogni anno, a partire dalla stagione 2004/05, anche per l'annata 2015/16 sono stati analizzati i tagliandi imbucati dai praticanti la caccia alla tipica fauna alpina.

L'obbligo di imbucare i tagliandi, come per la caccia di selezione, è una novità prevista per la prima volta dalla D.G.R. n. 71-10504 del 22.9.2003 (disposizione valida però per l'anno successivo) e ripresa nelle stagioni seguenti. Nel tagliando sono indicati i seguenti dati: nome e cognome del cacciatore, data, località di inizio caccia, comune, e consentono di calcolare la pressione giornata per giornata in ogni singolo distretto. Dalla stagione 2009/2010 il Comitato di Gestione ha richiesto di indicare anche la specie principale oggetto della battuta di caccia. I tagliandi vengono imbucati nelle 15 cassette all'uopo distribuite sul territorio del CA e sono raccolti dagli Agenti faunistici del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino.

Nel corso degli anni sono intervenuti numerosi cambiamenti normativi che hanno influenzato la pressione di caccia a queste specie. Quelli degli ultimi anni sono riassunti di seguito.

Stagione venatoria 2004/05:

- caccia alla coturnice è limitata ad un mese

Stagione venatoria 2005/06:

- caccia alla coturnice è limitata ad un mese

Stagione venatoria 2006/07:

- la caccia alla tipica fauna alpina inizia la seconda settimana di ottobre
- caccia alla coturnice è limitata ad un mese
- caccia alla lepre variabile è sospesa nel CATO1

Stagione venatoria 2007/08:

- la caccia alla tipica fauna alpina viene limitata ad un massimo di 10 giornate
- caccia alla pernice bianca è sospesa su tutto il territorio regionale

Stagione venatoria 2008/09:

- introduzione della quota economica di 20 euro per chi vuole partecipare alla caccia alla tipica fauna alpina

Stagione venatoria 2009/10:

- il numero di soci autorizzabili non può superare il tetto di 2,5 volte il numero di capi complessivamente prelevabili, per cui vengono definiti dei criteri per la definizione di una graduatoria;
- introduzione dell'indicazione nel tagliando della specie principale oggetto del prelievo;
- la quota economica viene aumentata a 25 euro;
- caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile sospesa nel CATO1, caccia alla Coturnice vietata sul territorio del comune di Pragelato

Stagione venatoria 2011/12:

- caccia alla lepre variabile sospesa nel CATO1, caccia alla Coturnice vietata sul territorio del comune di Pragelato

Stagione venatoria 2012/13:

- soppressione della verifica dei capi dopo 5 giornate e dell'obbligo di chiusura anticipata della caccia alle specie con percentuale di realizzazione inferiore al 50% del piano di prelievo autorizzato;
- modifica del carniere per l'abrogazione della Legge 70/96. Il nuovo carniere prevede nel rispetto del tetto massimo stagione di quattro capi di tipica fauna alpina pro capite, il limite giornaliero di due, purchè di specie diverse (scompare il limite di un capo all'anno per il fagiano di monte e la lepre variabile e quello di due per coturnice e pernice bianca e il limite giornaliero di un capo per tutte le specie);
- possibilità di ammissione ai CA, e alla caccia alla tipica, anche di cacciatori già ammessi in altri CA, con conseguente revisione dei criteri di ammissione per questa forma di caccia;
- caccia alla Coturnice vietata sul territorio del comune di Pragelato
- caccia vietata su terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve

Stagione venatoria 2013/14:

- ritorno ad un periodo di prelievo teorico di due mesi (per un totale di 18 giornate utili);
- caccia alla Coturnice vietata sul territorio del comune di Pragelato

Stagione venatoria 2014/15:

- caccia alla pernice bianca ed alla lepre variabile sospesa su tutto il territorio regionale
- caccia alla Coturnice vietata sul territorio del comune di Pragelato

Stagione venatoria 2015/16:

- caccia alla lepre variabile sospesa su tutto il territorio regionale
- caccia alla Coturnice consentita sul territorio del comune di Pragelato, esterno alla ZPS Val Tronca
- il cacciatore ammesso in più CA può partecipare alla caccia alla Tipica in un solo CA

Numero soci autorizzati

Nel 2015 sono pervenute all'ufficio 125 richieste per poter partecipare alla caccia alla tipica fauna alpina (a fronte dei 768 soci del CA).

In ottemperanza alla DGR n. 93-3804 del 27.4.2012, come nella passata stagione venatoria, anche nell'annata 2015/2016 poteva essere ammessi alla caccia alla tipica fauna alpina solamente un numero di cacciatori non superiore a 2,5 volte il numero di capi di queste specie complessivamente prelevabili.

Per definire una sorta di graduatoria, il Comitato di Gestione ha quindi stabilito una serie di criteri che producevano dei punti. I soci ammissibili risultavano quindi quelli con più punti a loro favore.

E' stato previsto anche quest'anno il versamento di una quota economica, pari a euro 25,00, riprendendo quanto già stabilito per le precedenti stagioni venatorie.

I criteri di ammissione per la stagione 2015/2016 sono i praticamente i medesimi delle precedente stagione venatoria, con alcune differenze per i punteggi attribuiti alla proprietà del cane e alla disponibilità per i censimenti:

Proprietà di un cane da caccia da ferma (gruppo 7 classificazione ENCI), come dimostrato da titolo di proprietà in cui sia evidenziato il nome del proprietario e la razza del cane (certificato di iscrizione all'anagrafe canina e/o certificato LOI-LIR)	Punti 100
oppure Proprietà di un cane da caccia di altra razza (gruppi 3, 4, 5, 6, 8, 10 classificazione ENCI), come dimostrato da titolo di proprietà in cui sia evidenziato il nome del proprietario e la razza del cane (certificato di iscrizione all'anagrafe canina e/o certificato LOI-LIR)	Punti 25
Scelta della caccia alla tipica come caccia esclusiva (no richiesta caccia al cinghiale e alla selezione)	Punti 100
oppure Scelta della caccia alla tipica oltre alla selezione (no cinghiale)	Punti 60
oppure Scelta della caccia alla tipica oltre il cinghiale (no selezione)	Punti 40
oppure Scelta della caccia alla tipica oltre il cinghiale e la selezione	Punti 0
Ammissione esclusiva al CATO1	Punti 90
Disponibilità per i censimenti primaverili ed estivi *	Punti 5 per censimento

Note: * La disponibilità non significa l'automatico diritto alla partecipazione ai censimenti indicati, in quanto la scelta degli operatori sarà effettuata dai tecnici faunistici secondo le necessità di ogni conteggio. In caso di chiamata e effettiva partecipazione ad un censimento a cui era stata data disponibilità, vengono assegnati altri 10 punti. In caso di rifiuto, per qualsivoglia motivazione, alla richiesta di partecipazione si perdono 20 punti. In caso di censimenti organizzati in date diverse da quelle stabilite, ai soci contattati che partecipano al censimento viene garantito un bonus ulteriore di 15 punti per censimento. Nessun punto viene tolto in caso di diniego.

Il regolamento prevedeva poi quanto segue:

A parità di punteggio, sarà data priorità ai soci residenti nei Comuni ricadenti in tutto o in parte entro i confini del CA. A parità di punteggio ulteriore, sarà data priorità ai soci più anziani. Agli esclusi sarà restituita la quota economica versata a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione.

La domanda di partecipazione alla caccia alla tipica fauna alpina deve essere presentata entro il 10.7.2015. I documenti di proprietà del cane dovranno essere presentati tassativamente insieme alla domanda pena la perdita dei punti relativi. Non fanno fede i documenti di proprietà del cane presentati per la stagione precedente, ma la documentazione di proprietà dovrà essere ripresentata ogni anno. Il CA si riserva di effettuare gli opportuni controlli per verificare l'effettiva proprietà e lo stato in vita dei cani dichiarati. In caso di attestazione non accertata il richiedente sarà escluso dalla graduatoria. Ai soci stagionali o ammessi in deroga che faranno domanda di ammissione al CA dopo il 10.7.2015, non sarà consentito l'accesso ai piani di prelievo per la tipica fauna alpina. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

Successivamente, terminati i censimenti estivi, verrà approntata la graduatoria che sarà disponibile presso l'ufficio del CA di Bricherasio e consultabile sul sito internet. E' ammesso presentare ricorso scritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione; decorso tale termine la graduatoria verrà considerata definitiva.

L'ammissione o la non ammissione al piano di prelievo sarà comunicata non appena approvati i piani di prelievo. In caso di ammissione al prelievo, qualora il contrassegno non venga ritirato entro il termine della prima giornata di caccia, questo sarà riassegnato al primo degli esclusi.

Per la stagione venatoria 2015/16 la Giunta regionale ha sospeso in tutti i CA il prelievo per la Lepre variabile, mentre ha approvato piani di prelievo per le altre tre specie. Per il CATO1 i piani di prelievo di Fagiano di monte, Pernice bianca e Coturnice ammontavano a complessivi 61 animali, e sono quindi risultati

ammissibili 152 soci. Di conseguenza, per la prima volta, non sono risultati esclusi cacciatori, ed è stato persino consentito richiedere la partecipazione anche dopo i termini stabiliti, ammettendo ancora 2 richieste. Dei 127 soci così autorizzati, 14 non hanno però ritirato il contrassegno. Nella tabella seguente i dati sono confrontati con quelli degli anni precedenti.

Stagione	N. Soci	N. richieste	N. contrassegni consegnati	% sul n. totale soci
2004/05	912	599	584	64,0
2005/06	858	574	569	66,3
2006/07	841	582	578	68,7
2007/08	800	542	545	68,1
2008/09	765	289	285	37,3
2009/10	749	221	108	14,4
2010/11	731	189	132	18,1
2011/12	679	161	140	20,6
2012/13	724	166	140	19,3
2013/14	767	173	150	19,6
2014/15	806	160	110	13,6
2015/16	768	127	113	14,7

Negli anni passati, analizzando le scelte operate dai soci che hanno richiesto di partecipare alla caccia alla tipica fauna alpina, emerge che tutti i cacciatori che praticano la caccia a queste specie in forma esclusiva sono stati autorizzati, e che tutti quelli proprietari di un cane da ferma sono stati autorizzati. Ovviamente nel punteggio della graduatoria le scelte si combinano, ma è evidente che i soci che effettivamente praticano questa caccia sono stati praticamente tutti autorizzati, mentre sono esclusi quelli che praticano più forme di caccia, che non hanno il cane e che non hanno dato disponibilità per i censimenti. Sempre preponderante è la quota di soci non residenti nei Comuni del CATO1 fra i soci autorizzati alla caccia alla tipica.

L'ammissione esclusiva al CATO1 (criterio previsto solo dalla stagione 2013/14) non ha penalizzato chi pratica questa caccia in forma esclusiva e chi è proprietario di un cane, mentre ha penalizzato negli altri casi. Per la stagione 2014/15 la selezione dei soci è stata condizionata dal ridotto numero di soci autorizzabili per effetto del divieto di caccia a Pernice bianca e Lepre variabile. La limitazione di capi prelevabili ha ridotto il numero di soci autorizzabili e sono stati esclusi da questa caccia anche cacciatori che nelle medesime condizioni (es. scelta esclusiva della caccia alla tipica, proprietà di un cane da ferma) negli anni passati sarebbero stati tranquillamente autorizzati.

Nella stagione 2015/16 il ritorno ad un carniere complessivo più sostanzioso, unitamente ad una diminuzione del numero di richieste di partecipazione a questa forma di caccia (anche per effetto della disposizione regionale che prevedeva l'ammissione a questa caccia in un solo CA in caso di ammissioni multiple), ha consentito la possibilità a tutti i richiedenti di partecipare al prelievo di queste specie. Si riportano comunque le scelte dei 125 soci inizialmente autorizzati:

Tipi di caccia richieste	solo tipica	27
	tipica+sel	50
	tipica+cing	10
	tipica+cing+sel	38
	Totale complessivo	125
Proprietà del cane	Da ferma	83
	Di altre razze	5
	No	37
	Totale complessivo	125
	Totale complessivo	125
disponibilità per i censimenti	Si	96
	No	29
	Totale complessivo	125
residenza nel CA	Si	44
	No	81
	Totale complessivo	125

Ammissione esclusiva al CATO1

Si	97
No	28
Totale complessivo	125

Confronto con la stagione 2014/2015:

Soci autorizzati e non rispetto ai tipi di caccia prescelti	Tipi di caccia richieste	Aut	Non Aut	Totale
	solo tipica	21	2	23
	tipica+sel	54	7	61
	tipica+cing	6	5	11
	tipica+cing+sel	29	36	65
	Totale complessivo	110	50	160

Soci autorizzati e non rispetto alla proprietà del cane	Proprietà del cane	Aut	Non Aut	Totale
	Da ferma	95	2	97
	Di altre razze	4	4	8
	No	11	44	55
	Totale complessivo	110	50	160

Soci autorizzati e non rispetto alla disponibilità per i censimenti	Disponibilità ai censimenti	Aut	Non Aut	Totale
	Si	97	19	116
	No	13	31	44
	Totale complessivo	110	50	160

Soci autorizzati e non rispetto alla residenza nel CA	Residenza nel CA	Aut	Non Aut	Totale
	Si	32	31	63
	No	78	19	97
	Totale complessivo	110	50	160

Soci autorizzati e non rispetto all'ammissione esclusiva al CATO1	Ammissione esclusiva	Aut	Non Aut	Totale
	Si	82	31	113
	No	28	19	47
	Totale complessivo	110	50	160

Confronto con la stagione 2013/2014:

Soci autorizzati e non rispetto ai tipi di caccia prescelti	Tipi di caccia richieste	Aut	Non Aut	Totale
	solo tipica	27		27
	tipica+sel	68	7	75
	tipica+cing	18		18
	tipica+cing+sel	37	16	53
	Totale complessivo	150	23	173

Soci autorizzati e non rispetto alla proprietà del cane	Proprietà del cane	Aut	Non Aut	Totale
	Da ferma	104		104
	Di altre razze	7		7
	No	39	23	62
	Totale complessivo	150	23	173

Soci autorizzati e non rispetto alla disponibilità per i censimenti	Disponibilità ai censimenti	Aut	Non Aut	Totale
	Si	123	7	130
	No	27	16	43
	Totale complessivo	150	23	173

Soci autorizzati e non rispetto alla residenza nel CA	Residenza nel CA	Aut	Non Aut	Totale
	Si	51	13	64
	No	99	10	109
	Totale complessivo	150	23	173

Soci autorizzati e non rispetto all'ammissione esclusiva al CATO1

Ammissione esclusiva	Aut	Non Aut	Totale
Si	115	12	127
No	35	11	46
Totale complessivo	150	23	173

Confronto con la stagione 2012/2013:

Soci autorizzati e non rispetto ai tipi di caccia prescelti

Tipi di caccia richieste	Aut	Non Aut	Totale
solo tipica	28		28
tipica+sel	69	6	75
tipica+cing	15		15
tipica+cing+sel	28	20	48
Totale complessivo	140	26	166

Soci autorizzati e non rispetto alla proprietà del cane

Proprietà del cane	Aut	Non Aut	Totale
Da ferma	104	1	105
Di altre razze	5		5
No	31	25	46
Totale complessivo	140	26	166

Soci autorizzati e non rispetto alla disponibilità per i censimenti

Disponibilità ai censimenti	Aut	Non Aut	Totale
Si	111	9	120
No	29	17	46
Totale complessivo	140	26	166

Soci autorizzati e non rispetto alla residenza nel CA

Residenza nel CA	Aut	Non Aut	Totale
Si	48	17	65
No	92	9	101
Totale complessivo	140	26	166

Soci autorizzati e non rispetto all'ammissione esclusiva al CATO1

Ammissione esclusiva	Aut	Non Aut	Totale
Si	109	18	127
No	31	8	39
Totale complessivo	140	26	166

Confronto con la stagione 2011/2012:

Soci autorizzati e non rispetto ai tipi di caccia prescelti

Tipi di caccia richieste	Aut	Non Aut	Totale
solo tipica	27		27
tipica+sel	65		65
tipica+cing	17		17
tipica+cing+sel	31	21	52
Totale complessivo	140	21	161

Soci autorizzati e non rispetto alla proprietà del cane

Proprietà del cane	Aut	Non Aut	Totale
Da ferma	109		109
Di altre razze	5		5
No	26	21	47
Totale complessivo	140	21	161

Soci autorizzati e non rispetto alla disponibilità per i censimenti

Disponibilità ai censimenti	Aut	Non Aut	Totale
Si	118	7	125
No	22	14	36
Totale complessivo	140	21	161

Soci autorizzati e non rispetto alla residenza del CA

Residenza nel CA	Aut	Non Aut	Totale
Si	53	17	70
No	87	4	91
Totale complessivo	140	21	161

Confronto con la stagione 2010/2011:

Soci autorizzati e non rispetto ai tipi di caccia prescelti

Tipi di caccia richieste	Aut	Non Aut	Totale
solo tipica	30	1	31
tipica+sel	75	9	84
tipica+cing	7	3	10
tipica+cing+sel	20	44	64
Totale complessivo	132	57	189

Soci autorizzati e non rispetto alla proprietà del cane

Proprietà del cane	Aut	Non Aut	Totale
Da ferma	128	7	135
Di altre razze	1	6	7
No	3	44	47
Totale complessivo	132	57	189

Soci autorizzati e non rispetto alla disponibilità per i censimenti

Disponibilità ai censimenti	Aut	Non Aut	Totale
Si	113	18	131
No	19	39	58
Totale complessivo	132	57	189

Soci autorizzati e non rispetto alla residenza del CA

Residenza nel CA	Aut	Non Aut	Totale
Si	40	33	73
No	92	24	116
Totale complessivo	132	57	189

Confronto con la stagione 2009/2010:

Soci autorizzati e non rispetto ai tipi di caccia prescelti

Tipi di caccia richieste	Aut	Non Aut	Totale
solo tipica	24		24
tipica+sel	55	20	75
tipica+cing	6	11	17
tipica+cing+sel	27	78	105
Totale complessivo	112	109	221

Soci autorizzati e non rispetto alla proprietà del cane

Proprietà del cane	Aut	Non Aut	Totale
Si	110	8	118
No	2	101	103
Totale complessivo	112	109	221

Soci autorizzati e non rispetto alla disponibilità per i censimenti

Disponibilità ai censimenti	Aut	Non Aut	Totale
Si	93	25	118
No	19	84	103
Totale complessivo	112	109	221

Soci autorizzati e non rispetto alla residenza del CA

Residenza nel CA	Aut	Non Aut	Totale
Si	33	56	89
No	79	53	132
Totale complessivo	112	109	221

Pressione giornaliera e complessiva

La stagione venatoria 2015/16, della durata teorica di due mesi per un totale di 17 giornate, non è stata chiusa anzitempo per completamento di tutti i piani di prelievo.

Nelle 17 giornate di caccia sono stati imbucati complessivamente 581 tagliandi (pari a 34,2 tagliandi/giornata) distribuiti come segue:

Data	Giorno	Meteo	Quota neve (*)	Val Pellice	Valli Chisone e Germanasca	Totale
4-ott	DOM	Sereno	2000	31	50	81
7-ott	MER	Sereno	2600	21	52	73
11-ott	DOM	Sereno	3000	22	72	94
14-ott	MER	Sereno	2700	13	40	53
18-ott	DOM	Nuvoloso	2600	17	20	37
21-ott	MER	Variabile	2800	12	33	45
25-ott	DOM	Sereno	2800	9	36	45
28-ott	MER	Pioggia	2000	11	22	33
1-nov	DOM	Sereno	2700	16	13	29
4-nov	MER	Sereno	2600	1	12	13
8-nov	DOM	Sereno	3000	8	18	26
11-nov	MER	Sereno	--	5		5
15-nov	DOM	Sereno	--	9	17	26
18-nov	MER	Sereno	--	7		7
22-nov	DOM	Sereno	2500	4		4
25-nov	MER	Nuvoloso	2400	3		3
29-nov	DOM	Sereno	--	7		7
TOTALE				196	385	581

Note: * sui versanti esposti a Sud.

Confronto con gli anni precedenti:

Stagione	Numero Uscite	N. soci autorizzati	N. tagliandi imbucati	Tagliandi/giornata	Tagliandi Val Pellice	Tagliandi Valli Chisone Germanasca
2004/05	18	584	1.024	60,2	290	726
2005/06	18	569	891	49,5	261	625
2006/07	15	578	953	63,6	294	660
2007/08	10	545	783	78,3	224	546
2008/09	10	285	609	60,9	194	415
2009/10	10	108	440	44,0	141	299
2010/11	10	132	462	46,2	127	335
2011/12	10	140	553	55,3	154	399
2012/13	6	140	373	62,2	91	280
2013/14	17	150	499	29,3	155	334
2014/15	7	110	386	55,1	101	263
2015/16	17	113	581	34,2	196	385

Nota: le differenze fra la pressione totale e il numero di tagliandi imbucati derivano dall'imbuco di più di un tagliando (generalmente due) nella stessa giornata da parte dello stesso cacciatore, per segnalare un cambio della zona di caccia. Solitamente il cacciatore che si sposta e lo segnala resta comunque sempre nel medesimo distretto. Nella stagione 2005/06 i casi di doppio imbuco sono stati 5. Nella stagione 2007/8 i casi sono stati 13. Nella stagione 2012/13 i casi sono stati 2. Nella stagione 2013/14 i casi sono stati 12. Nella stagione 2014/15 i casi di doppio imbuco nella stessa giornata sono stati 22 casi. Nella stagione 2015/16 i casi di doppio imbuco nella stessa giornata sono stati ben 44 casi.

Per i dettagli delle stagioni venatorie precedenti, si rimanda alle relative relazioni annuali.

Nei primi otto anni della ricerca (dal 2004 al 2011) la pressione complessiva è diminuita progressivamente, per via della riduzione delle giornate di caccia e per la riduzione del numero di soci autorizzati, prima per effetto della previsione della quota di ammissione di 20 euro nel 2008, poi per la previsione della quota di 25 euro oltre la soglia del numero di soci comunque autorizzabili a partire dal 2009. Nella stagione 2012/13 la pressione ha raggiunto il minimo storico anche perchè la caccia è durata solo 6 giornate poi i piani sono stati completati

per tutte le specie. Nella stagione 2013/14 la pressione complessiva è nuovamente risalita per effetto dell'allungamento della stagione venatoria a due mesi e per il mai raggiunto completamento dei piani di prelievo a tutte le specie (benchè dopo la 9a giornata era consentito solo più il prelievo al Fagiano di monte). Nella stagione 2014/15 il dato è stato condizionato dal divieto di caccia alla Pernice bianca e alle Lepre variabile, che ha ridotto il carniere complessivo e quindi il numero di soci autorizzabili; inoltre il prelievo è durato solo sette giornate. Nella stagione 2015/16 la pressione è nuovamente aumentata, soprattutto per il maggior numero di giornate (la caccia non è mai terminata anzitempo per completamente di tutti i piani).

Confronto fra pressione e carniere

Al fine di confrontare per ogni giornata il numero di cacciatori dediti a questa forma di caccia con il numero di capi di queste specie ancora disponibili per l'abbattimento, è stato rapportato il numero di tagliandi imbucati con il numero di capi disponibili all'inizio di ciascuna giornata di caccia.

La situazione della stagione venatoria 2015/16 è la seguente:

Data	Giorno	Numero tagliandi	Animali prelevati	Piano residuo all'inizio della giornata
4-ott	DOM	81	10	61
7-ott	MER	73	9	51
11-ott	DOM	94	8	42
14-ott	MER	53	9	34
18-ott	DOM	37	1	24
21-ott	MER	45	4	24
25-ott	DOM	45	4	20
28-ott	MER	33	2	16
1-nov	DOM	29	1	14
4-nov	MER	13	2	13
8-nov	DOM	26	2	11
11-nov	MER	5	1	9
15-nov	DOM	26	5	8
18-nov	MER	7		5
22-nov	DOM	4		5
25-nov	MER	3		5
29-nov	DOM	7		5

Quest'anno c'è stata nuovamente una correlazione positiva, statisticamente altamente significativa, fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolato sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,85; $P>0,01$).

Per i dettagli delle stagioni venatorie precedenti, si rimanda alle relative relazioni annuali.

Stagione	1a-5a giornata			5a-10a giornata			oltre la 10a giornata		
	Tagliandi	Capi	Pressione	Tagliandi	Capi	Pressione	Tagliandi	Capi	Pressione
2015/16	338	37	9,1	165	13	12,7	78	8	9,8
2014/15	299	35	8,5	87	8	10,9			
2013/14	334	53	6,3	155	10	15,5	10	0	N.C.
2012/13	333	54	6,2	38	3	12,7			
2011/12	373	36	10,4	180	9	20,0			
2010/11	321	32	10,0	141	14	10,0			
2009/10	310	25	12,4	130	11	11,8			
2008/09	461	56	8,2	148	10	14,8			
2007/08	555	71	7,8	215	8	26,9			
2006/07	552	62	8,9	331	25	13,2	70	2	35,0
2005/06	437	55	7,9	275	26	10,6	174	5	34,8
2004/05	530	70	7,6	276	16	17,2	213	9	23,7

Per la stagione 2014/15 non c'è stata una correlazione positiva statisticamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolato sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,56). E' l'effetto della limitazione del carniere a due sole specie, del completamento in poche giornate dei piani di prelievo, di una pressione che si è mantenuta relativamente costante nel corso del tempo e di un prelievo distribuito in modo abbastanza uniforme.

Per la stagione 2013/14 è stata verificata una correlazione positiva statisticamente altamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolato sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,86; $P>0,01$). Le maggiori opportunità di carniere hanno certamente favorito il prelievo e mantenuto un'alta pressione per più giornate di caccia, mentre negli altri anni si osservava un netto calo del numero di cacciatori dopo le primissime giornate. L'ampliamento del carniere individuale giornaliero e stagione ha portato anche un maggior efficienza dello sforzo di caccia (mai si era osservato uno sforzo così basso per singolo capo prelevato nelle prime cinque giornate di caccia).

Per la stagione 2012/13 è stata verificata una correlazione positiva statisticamente altamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolato sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,94; $P>0,01$). Le maggiori opportunità di carniere hanno certamente favorito il prelievo e mantenuto un'alta pressione per più giornate di caccia, mentre negli altri anni si osservava un netto calo del numero di cacciatori dopo le prime giornate. L'ampliamento del carniere individuale giornaliero e stagione ha portato anche un maggior efficienza dello sforzo di caccia (mai si era osservato uno sforzo così basso per singolo capo prelevato nelle prime cinque giornate di caccia).

Per la stagione 2011/12 non è stata verificata una correlazione positiva statisticamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolato sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,54). Si è tornati ad osservare quanto emerso fino alla stagione 2008/09, ovvero che la pressione è diminuita nel corso della stagione, mentre lo sforzo di caccia per l'abbattimento di un capo è aumentato (calcolato dal rapporto fra pressione complessiva ed il numero capi abbattuti complessivamente fino a quel momento); dalla sesta giornata (19 ottobre) si è registrata una pressione complessiva di 180 cacciatori a fronte di solo 9 esemplari di tipica cacciati (con uno sforzo pari a 20,0 uscite per capo, il doppio delle 5 giornate iniziali). Si noti che anche in questa stagione di caccia come nelle tre precedenti, per alcune giornate, il numero di cacciatori sul campo è risultato di non molto superiore al numero di capi ancora disponibili per il prelievo a inizio giornata.

Per la stagione 2010/11 è stata verificata una correlazione positiva statisticamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolato sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,77; $P>0,01$). La pressione è diminuita nel corso della stagione, ma lo sforzo di caccia è rimasto pressoché invariato: in media, nelle prime cinque giornate di caccia lo sforzo per l'abbattimento di un capo è stato di 10,0 uscite (calcolato dal rapporto fra pressione complessiva ed il numero capi abbattuti complessivamente fino a quel momento); dalla sesta giornata (20 ottobre) si è registrata una pressione complessiva di 141 cacciatori a fronte di solo 14 esemplari di tipica cacciati (con uno sforzo pari a 10,0 uscite per capo). Si noti che anche in questa stagione di caccia come nelle due precedenti, per diverse delle giornate, il numero di cacciatori sul campo è stato di non molto superiore al numero di capi ancora disponibili per il prelievo a inizio giornata.

Nella stagione 2009/10 è stata verificata una correlazione positiva statisticamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolata sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,68; $P>0,05$). La pressione è diminuita nel corso della stagione, ma lo sforzo di caccia è rimasto pressoché invariato: in media, nelle prime cinque giornate di caccia lo sforzo per l'abbattimento di un capo è stato di 12,4 uscite (calcolato dal rapporto fra pressione complessiva ed il numero capi abbattuti complessivamente fino a quel momento); dalla sesta giornata (21 ottobre) si è registrata una pressione complessiva di 131 cacciatori a fronte di solo 11 esemplari di tipica cacciati (con uno sforzo pari a 11,8 uscite per capo). In questa stagione di caccia come nella precedente, per molte delle giornate, il numero di cacciatori sul campo è stato di poco superiore al numero di capi ancora disponibili per il prelievo a inizio giornata.

Nella stagione 2008/09 è stata verificata una correlazione positiva statisticamente altamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolata sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,955; $P>0,01$). Lo sforzo di caccia è però variabile nel tempo: in media, nelle prime cinque giornate di caccia lo sforzo per l'abbattimento di un capo è stato di 8,2 uscite (calcolato dal rapporto fra pressione complessiva ed il numero capi abbattuti complessivamente fino a quel momento); dalla sesta giornata (19 ottobre) è rimasta aperta solamente la caccia alla Coturnice, in entrambi i distretti e nelle ultime 5 giornate si è registrata una pressione complessiva di 148 cacciatori a fronte di solo 10 esemplari di tipica cacciati (con uno sforzo pari a 14,8 uscite per capo).

Nella stagione 2007/08 è stata verificata una correlazione positiva statisticamente altamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati calcolata sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,83; $P>0,01$). Lo sforzo di caccia è però variabile nel tempo: in media, nelle prime cinque giornate di caccia lo sforzo per l'abbattimento di un capo è stato di 7,8 uscite (calcolato dal rapporto fra

pressione complessiva ed il numero capi abbattuti complessivamente fino a quel momento); dalla sesta giornata (21 ottobre) è rimasta aperta solamente la caccia al Fagiano di monte, in entrambi i distretti e nelle ultime 5 giornate si è registrata una pressione complessiva di 215 cacciatori a fronte di solo 8 esemplari di tipica cacciati (con uno sforzo enorme pari a 26,9 uscite per capo).

Nella stagione 2006/07 non è stata verificata una correlazione positiva statisticamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati nelle prime sette giornate (R Spearman=0,53), la correlazione diventa invece altamente significativa se calcolata sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,82; $P>0,01$). In media nelle prime sette giornate lo sforzo per l'abbattimento di un capo è stato di 9,8 uscite (calcolato dal rapporto fra pressione complessiva ed il numero capi abbattuti complessivamente fino a quel momento). All'ottava giornata (1 novembre) è stata chiusa, per completamento dei piani di prelievo, la caccia alla Coturnice ed al Fagiano di monte in Val Pellice e dalla nona giornata è rimasta aperta sola la caccia al Fagiano di monte in Val Chisone e Val Germanasca. Nelle ultime 5 giornate si è registrata una pressione complessiva di 251 cacciatori a fronte di solo 17 esemplari di tipica cacciati (con uno sforzo pari a 14,8 uscite per capo).

Nella stagione 2005/06 stata verificata una correlazione positiva statisticamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati nelle prime sette giornate (R Spearman=0,84; $P>0,05$). La correlazione sostanzialmente non cambia se calcolata sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,80; $P>0,01$). In media nelle prime sette giornate lo sforzo per l'abbattimento di un capo è stato di 7,7 uscite (calcolato dal rapporto fra pressione complessiva ed il numero capi abbattuti complessivamente fino a quel momento). A partire dall'ottava giornata (26 ottobre) è rimasta aperta sola la caccia al Fagiano di monte in entrambi i distretti mentre la caccia alla Coturnice era chiusa per completamento dei piani e quella alla Pernice bianca ed alla Lepre variabile sospesa per mancato superamento del 50% del piano secondo le disposizioni regionali. Nelle ultime 11 giornate si è registrata una pressione complessiva di 290 cacciatori a fronte di solo 9 esemplari di fagiano di monte cacciati (con uno sforzo pari a 32,2 uscite per capo).

Nella stagione 2004/05 è stata verificata una correlazione positiva statisticamente significativa fra il numero di tagliandi imbucati ed il numero di capi prelevati nelle prime sette giornate (R Spearman=0,75; $P>0,05$). La correlazione aumenta se calcolata sull'intera stagione di caccia (R Spearman=0,83; $P>0,01$). In media nelle prime sette giornate lo sforzo per l'abbattimento di un capo è stato di 8,3 uscite (calcolato dal rapporto fra pressione complessiva ed il numero di capi abbattuti complessivamente fino a quel momento). A partire dall'ottava giornata (27 ottobre) rimaneva aperta sola la caccia al Fagiano di monte in entrambi i distretti mentre la caccia alle altre specie era chiusa per completamento dei piani. Nelle ultime 10 giornate si è registrata una pressione complessiva di 329 cacciatori a fronte di solo 12 esemplari di fagiano di monte cacciati (con uno sforzo pari a 27,4 uscite per capo).

Distribuzione spaziale della pressione

In tutti gli anni dell'indagine è sempre emersa evidente la differenza di pressione fra i due distretti. Il distretto Valli Chisone e Germanasca presenta una pressione nettamente superiore a quella del distretto Val Pellice; in media, il distretto Valli Chisone e Germanasca assorbe il 66-76% delle presenze di cacciatori dediti alla caccia alla tipica fauna alpina. Tale rapporto è costante negli anni, con leggere variazioni nell'entità delle differenze.

Stagione	Pressione totale	Pressione Val Pellice (1)	Pressione Valli Chisone e Germanasca (2)	Rapporto (2/1)
2004/05	1.016	290	726	2,5
2005/06	886	261	625	2,4
2006/07	953	294	660	2,2
2007/08	770	224	546	2,4
2008/09	609	194	415	2,1
2009/10	440	141	299	2,1
2010/11	462	127	335	2,6
2011/12	553	154	399	2,6
2012/13	371	91	280	3,1
2013/14	344	155	499	2,2
2014/15	364	101	263	2,6
2015/16	581	196	385	2,0

La distribuzione della pressione per Comune nella stagione 2015/16 è stata la seguente:

Comune	Totale	%
Prali	164	28,2
Pragelato	70	12,0
Perrero	68	11,7
Pramollo	52	9,0
Villar Pellice	49	8,4
Angrogna	47	8,1
Rorà	39	6,7
Bobbio Pellice	36	6,2
Torre Pellice	25	4,3
Roure	23	4,0
Pinasca	5	0,9
Salza di Pinerolo	2	0,3
Massello	1	0,2
TOTALE	581	100,0

Come già evidenziato nelle passate stagioni, evidente è il ruolo del Comune di Prali, che da solo conta oltre un quarto delle presenze complessive. I primi cinque Comuni (Prali, Pragelato, Perrero, Pramollo e Villar Pellice) registrano il 69,4% delle presenze.

Confronto con le cinque stagioni venatorie precedenti:

Anno	2014		2013		2012		2011		2010	
	N. tagliandi	%	N. tagliandi	%	N. tagliandi	%	N. tagliandi	%	N. tagliandi	%
Angrogna	21	5,4	31	6,2	20	5,4	33	6,0	39	8,4
Bobbio Pellice	30	7,8	23	4,6	18	4,8	42	7,6	40	8,7
Massello					2	0,5	0	0	3	0,6
Perosa Argentina							5	0,9	3	0,6
Perrero	59	15,3	73	14,6	52	13,9	101	18,3	63	13,6
Pinasca	10	2,6	11	2,2	4	1,1	12	2,2	22	4,8
Pragelato	27	7,0	49	9,8	59	15,8	51	9,2	69	14,9
Prali	144	37,3	165	33,1	133	35,7	163	29,5	126	27,3
Pramollo	27	7,0	32	6,4	10	2,7	39	7,1	34	7,4
Rorà	14	3,6	16	3,2	6	1,6	12	2,2	7	1,5
Roure	15	3,9	14	2,8	22	5,9	27	4,9	11	2,4
S. Pietro Val Lemina							0	0	3	0,6
Salza di Pinerolo	1	0,3					1	0,2	1	0,2
Torre Pellice	16	4,1	18	3,6	8	2,1	12	2,2	8	1,7
Villar Pellice	22	5,7	67	13,4	39	10,5	55	9,9	33	7,1
Totale	386	100,0	499	100,0	373	100,0	553	100	462	100

Note: nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 a Pragelato la caccia alla coturnice era vietata.

La distribuzione della pressione di caccia per Comune e la distribuzione dei capi prelevati sono correlati con significatività statisticamente altamente significativa (R Spearman=0,72; $P>0,01$):

Comune	Totale	N. capi prelevati
Angrogna	47	6
Bobbio Pellice	36	2
Massello	1	
Perosa Argentina		2
Perrero	68	8
Pinasca	5	
Pragelato	70	9
Prali	164	19
Pramollo	52	1
Rorà	39	3
Roure	23	3
Salza di Pinerolo	2	

Comune	Totale	N. capi prelevati
Torre Pellice	25	3
Villar Pellice	49	2
TOTALE	581	58

Confronto con le cinque stagioni venatorie precedenti:

Anno	2014		2013		2012		2011		2010	
	N. tagliandi	N. capi prelevati								
Comune										
Angrogna	21	2	31	13	20	4	33	10	39	6
Bobbio Pellice	30	6	23	5	18	7	42	2	40	5
Massello					2	1	0	0	3	1
Perosa Argentina	59	3				2	5	1	3	0
Perrero	59	3	73	2	52	3	101	2	63	3
Pinasca	10	2	11	0	4		12	1	22	2
Pragelato	27	1	49	4	59	4	51	2	67	7
Prali	144	16	165	31	133	25	163	18	126	14
Pramollo	27	2	32	1	10		39	2	34	1
Rorà	14	2	16	0	6		12	0	7	1
Roure	15	2	14	1	22	4	27	3	11	0
S. Pietro Val Lemina							0	0	3	0
Salza di Pinerolo	1	0	0	1			1	0	1	0
Torre Pellice	16	0	18	0	8	2	12	1	8	1
Villar Pellice	22	7	67	5	39	5	55	3	33	5
Totale	386	43	499	63	373	57	553	45	462	46

In tutti gli anni la correlazione fra la distribuzione della pressione di caccia sul territorio nella stagione e la distribuzione dei capi prelevati è stata statisticamente altamente significativa (2014/15: R Spearman=0,66; P>0,05; 2013/14: R Spearman=0,69; P>0,05; 2012/13: R Spearman=0,60; P>0,05; 2011/12: R Spearman=0,78; P>0,01, 2010/11: R Spearman=0,87; P>0,01; 2009/10: R Spearman=0,67; P>0,01).

Numero di soci praticanti la caccia alla tipica fauna alpina

Nella stagione 2015/16 sono stati 108 i soci che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 5,0 giornate sulle 17 effettivamente disponibili. E' importante notare che i soci autorizzati a questo tipo di caccia che hanno effettivamente ritirato i contrassegni erano 113, quindi 5 non hanno effettuato nemmeno un'uscita. Quest'anno la percentuale di soci autorizzati che ha effettuato una sola uscita è risultato essere solo pari al 12%.

N uscite	Stagione 2010/11		Stagione 2011/12		Stagione 2012/13		Stagione 2013/14		Stagione 2014/15		Stagione 2015/16	
	N cacc.	%										
1	21	17,8	24	17,6	29	24,0	20	15,0	18	19,4	13	12,0
2	15	12,7	22	16,2	25	20,7	31	23,3	10	10,8	16	14,8
3	25	21,2	18	13,2	19	15,7	28	21,1	20	21,5	13	12,0
4	14	11,9	14	10,3	20	16,5	12	9,0	11	11,8	9	8,3
5	13	11	17	12,5	15	12,4	12	9,0	14	15,1	14	13,0
6	14	11,9	19	14,0	13	10,7	14	10,5	10	10,8	12	11,1
7	5	4,2	8	5,9			4	3,0	10	10,8	5	4,6
8	5	4,2	6	4,4			9	6,8			11	10,2
9	4	3,4	8	5,9			3	2,3			5	4,6
10	2	1,7									5	4,6
11											4	3,7
12											1	0,9
13												
14												
Totale	118	100	136	100	121	100	133	100	93	100	108	100

Nella stagione 2014/15 sono stati 93 i soci che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 4,2 giornate sulle 7 effettivamente disponibili. E' importante notare che i soci autorizzati a questo tipo di caccia erano 110, quindi 17 non hanno effettuato nemmeno un'uscita. Quest'anno la percentuale di soci autorizzati che ha effettuato una sola uscita è risultato essere pari al 19%.

Nella stagione 2013/14 sono stati 133 i soci che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 3,1 giornate sulle 6 effettivamente disponibili. E' importante notare che i soci autorizzati a questo tipo di caccia erano 150, quindi 17 non hanno effettuato nemmeno un'uscita. La percentuale di soci autorizzati che ha effettuato una sola uscita è risultato essere pari al 15%.

Nella stagione 2012/13 sono stati 121 i soci che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 3,1 giornate sulle 6 effettivamente disponibili. E' importante notare che i soci autorizzati a questo tipo di caccia erano 140, quindi ben 19 non hanno effettuato nemmeno un'uscita. Il numero di soci autorizzati che ha effettuato una sola uscita è aumentato (24%) risultando il valore più alto degli ultimi 5 anni.

Nella stagione 2011/12 sono stati 136 i soci che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 4,1 giornate sulle 10 disponibili. Il 17,6% ha effettuato una sola uscita.

Nella stagione 2010/11 sono stati 118 i soci che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 4,6 giornate sulle 10 disponibili. Il 17,8% ha effettuato una sola uscita.

Nella stagione 2009/10 sono stati 101 i soci che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 4,4 giornate sulle 10 disponibili. Rispetto agli anni precedenti, dove un quinto dei soci autorizzati usciva una sola volta, quest'anno solo un minima parte di questi (11,9%) ha effettuato una sola uscita.

Nella stagione 2008/09 sono stati identificati 183 soci diversi che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 3,3 giornate sulle 10 disponibili. Un quinto di questi è comunque uscito una sola volta.

Nella stagione 2007/08 sono stati identificati 243 soci diversi che hanno praticato, almeno per una giornata, la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 3,2 giornate sulle 10 disponibili. Anche quest'anno quasi un terzo è comunque uscito una sola volta.

Nella stagione 2006/07 i soci identificati quali praticanti la caccia alla tipica fauna alpina erano stati 278, dedicandovi in media 3,4 giornate sulle 15 disponibili. Quasi un terzo comunque è uscito una sola volta.

Nella stagione 2005/06 in totale i soci che hanno praticato almeno per una giornata la caccia alla tipica fauna alpina sono stati 282 con un impegno medio di 3,1 giornate delle 18 disponibili. Anche per questa stagione di caccia, solo 1/3 dei cacciatori che hanno praticato la caccia alla Tipica fauna alpina ha effettuato una sola uscita e il 67% non più di tre uscite.

Nella stagione 2004/05 in totale erano stati identificati 281 soci diversi che avevano praticato in quella stagione la caccia alla tipica fauna alpina, dedicandovi in media 3,6 giornate sulle 17 disponibili. Oltre un quarto comunque è uscito una sola volta. Anche il fatto che il primo giorno alcuni soci potevano non aver imbucato il tagliando per effetto dei falsi avvisi, non può aver influenzato questo risultato, se questi soci, come probabilmente è poi avvenuto, sono poi tornati a caccia nelle giornate successive ed hanno imbucato.

I dati sulla pressione delle stagioni a partire da quella 2009/10 non sono comparabili a quelli delle stagioni precedenti, poiché il vincolo del limite massimo di soci ammissibili al prelievo, pari a 2,5 volte il numero di capi prelevabili, ha già prodotto un limite di cacciatori potenzialmente presenti sul territorio.

Nelle stagioni 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08 era emerso che meno di un terzo dei soci del CA dedicava almeno un giorno alla caccia alla tipica fauna alpina. Nella stagione 2008/09 l'introduzione della quote economica (20 euro) aveva dimezzato il numero di richieste di partecipazione e ridotto di un terzo il numero di effettivi praticanti rispetto alla media del quadriennio precedente.

Per confronto si ricorda che la percentuale di soci praticanti la caccia alle specie della tipica fauna alpina desunto dal questionario effettuato nel 2004 era del 21,4%, mentre il risultato di quanto dichiarato nel precedente questionario del 2002 era decisamente superiore (41,8%).

La percentuale di soci che abbatte almeno un capo varia negli anni fra il 20% e il 35%. Ovviamente tale percentuale è aumentata dalla stagione 2008/09 con l'introduzione del tetto massimo di soci autorizzabili, che ha selezionato e limitato questa forma di caccia ai soli cacciatori più motivati.

Nella stagione 2012/13 la percentuale di soci autorizzati al prelievo che ha abbattuto almeno un capo è stata la più alta mai registrata: più di un socio su tre di quelli che ha effettuato questa caccia è riuscito a catturare

almeno un esemplare di tipica fauna alpina nel corso dell'anno. Quella stagione è cambiato il carniere stagionale individuale ed è scomparso il limite di un capo annuale per il fagiano di monte e la lepre variabile. Nella stagione 2013/14 si è tornati a percentuali inferiori, in linea con gli anni precedenti, benchè il carniere fosse completo a tutte le specie, fra i più abbondanti degli ultimi anni e si sia prelevato il maggior numero di animali delle ultime 5 stagioni venatorie. Nella stagione 2014/15 nonostante la limitazione del carniere a due solo specie cacciabili, la percentuale è rimasta invariata rispetto alla stagione precedente.

La nuove regole del carniere, entrate in vigore nelle ultime quattro stagioni venatorie, non consentono di confrontare direttamente i dati degli ultimi 4 anni con quelli delle stagioni precedenti.

Stagione venatoria	N. capi abbattuti	N. soci che ha esercitato la caccia almeno una volta	Rapporto capi abbattuti/soci esercitanti	N. soci che ha prelevato almeno un capo	% di soci che hanno preso almeno un capo
2004/05	95	281	0,34	74	26,3
2005/06	86	282	0,30	59	20,9
2006/07	88	278	0,32	70	25,2
2007/08	79	243	0,33	59	24,3
2008/09	66	183	0,36	51	27,9
2009/10	36	101	0,36	32	31,7
2010/11	46	118	0,39	36	30,5
2011/12	45	136	0,33	35	25,7
2012/13	57	121	0,47	43	35,5
2013/14	63	133	0,47	38	28,6
2014/15	43	93	0,46	27	29,0
2015/16	58	108	0,54	36	33,3

Specie oggetto della battuta di caccia

Nella stagione 2009/10, per la prima volta, è stato chiesto ai soci di indicare nei tagliandi da imbucare a inizio giornata di caccia anche la specie principale oggetto della battuta. L'indicazione di una specie non pregiudica l'abbattimento di altre specie appartenenti alla tipica fauna alpina, ma permette di analizzare meglio la pressione di caccia. Purtroppo, in quella stagione, le limitazioni qualitative del carniere approvato dalla Giunta regionale, ridotto a sole due specie (Fagiano di monte e Coturnice), ha limitato quest'analisi, senz'altro più interessante con un maggior numero di specie cacciabili.

L'obbligo dell'indicazione della specie oggetto del prelievo è stato riproposta nelle stagioni 2010/11 (quattro specie cacciabili), 2011/12 (tre specie cacciabili), 2012/13 e 2013/14 (quattro specie cacciabili), 2014/15 (due specie cacciabili) e 2015/16 (tre specie cacciabili).

Quest'anno i tagliandi sono stati compilati correttamente nell'91,4% dei casi, nel 5,2% dei casi sono state indicate due specie cacciabili, nel 3,4% dei casi sono state indicate tutte le specie.

Nella stagione 2014/15 i tagliandi sono stati compilati correttamente nell'85% dei casi, nel 15% dei casi sono state indicate tutte e due le specie cacciabili.

Nella stagione 2013/14 i tagliandi sono stati compilati correttamente nel 94% dei casi, nel 3,6% dei casi sono state indicate due specie e nel 2,4% dei casi sono state indicate tutte le specie.

Nella stagione 2012/13 i tagliandi sono stati compilati correttamente nel 97,6% dei casi, nell'5,4% dei casi sono state indicate due specie e solo nello 0,8% dei casi sono state indicate tutte le specie.

Nella stagione 2011/12 i tagliandi sono stati compilati correttamente nel 97,6% dei casi, nell'5,4% dei casi sono state indicate due specie e solo nello 0,8% dei casi sono state indicate tutte le specie.

Nella stagione 2010/11 i tagliandi sono stati compilati correttamente nel 84,2% dei casi, nell'8% dei casi sono state indicate due specie, nel 6,3% dei casi sono state indicate tutte le specie e solo nell'1,5% dei casi non è stata indicata alcuna specie.

Nella stagione 2009/10 i tagliandi sono stati compilati correttamente nel 76,4% dei casi, nel 13,4% dei casi sono state indicate entrambe le specie, nel 10,2% dei casi non è stata indicata alcuna specie.

Nella tabella seguente è riportata la ripartizione della pressione per specie e per giornata:

Data	Forcello	Coturnice	Pernice bianca	Due specie	Tutte	Totale	
04-ott	41	27			8	5	81
07-ott	46	18			8	1	73
11-ott	85			2	3	4	94
14-ott	47			2	2	2	53
18-ott	36					1	37
21-ott	39			1	2	3	45
25-ott	41			3		1	45
28-ott	28				5		33
01-nov	27					2	29
04-nov	13						13
08-nov	25					1	26
11-nov	5						5
15-nov	24				2		26
18-nov	7						7
22-nov	4						4
25-nov	3						3
29-nov	7						7
Totale	478	45	8	30	20		581

Nella stagione venatoria 2015/16 la scelta della specie oggetto del prelievo, pur con tre specie cacciabili su quattro, è stata condizionata dalla neve al suolo (la normativa attuale vieta la caccia su terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, con la sola eccezione del caccia di selezione e della caccia al cinghiale). In un autunno complessivamente povero di neve rispetto agli anni precedenti, precoci nevicate a fine settembre, anche a quote relativamente modeste per il periodo, hanno però limitato la caccia al Fagiano di monte ed alla Pernice bianca per diverse giornate. Per questo motivo le prime uscite sono state dedicate principalmente alla caccia della Coturnice, chiusa dopo solo due giornate per completamento dei piani. Benchè il piano di prelievo della Pernice bianca sia stato poi persino superato, la caccia a questa specie è durata ben 13 giornate, evento raro per un prelievo di solito concentrato in pochi giorni. I tagliandi non riportano che raramente la scelta della caccia a questo Tetraonide poichè i cacciatori preferivano indicare il Fagiano di monte come obiettivo della battuta non essendo certi, al mattino, della praticabilità del prelievo della Pernice bianca per via della copertura nevosa delle zone di caccia a questa specie.

Confronto con i dati della stagione 2014/15:

Data	Forcello	Coturnice	Tutte	Totale
02-ott	42	8	18	68
06-ott	41	13	12	66
09-ott	25	13	16	54
13-ott	30	10	11	51
16-ott	41	18	1	60
20-ott	48			48
23-ott	39			39
Totale	266	62	58	386

Confronto con i dati della stagione 2013/14:

Data	Bianca	Forcello	Coturnice	Lepre	Due specie	Tutte	Totale	
02-ott	14	43	11		2	6	8	84
06-ott	5	55	15		1	6	2	84
09-ott		58			3			61
13-ott		44						44
16-ott		59			1	1		61
20-ott		57			1	2	2	62
23-ott		22						22
27-ott		34				2		36
30-ott		30			1	1		32
03-nov					3			3
06-nov					5			5

Data	Bianca	Forcello	Coturnice	Lepre	Due specie	Tutte	Totale
10-nov					2		2
13-nov					2		2
17-nov					1		1
Totale	19	402	26	22	18	12	499

Confronto con i dati della stagione 2012/13:

Data	Bianca	Forcello	Coturnice	Lepre	Due specie	Tutte	Totale	
3-ott	13	42	9		3	9	6	82
6-ott	2	46	18			5	3	74
10-ott		51	18			3	1	73
13-ott		57	1					58
17-ott		48						48
20-ott		38						38
Totale	15	282	46	3	17	10		373

Confronto con i dati della stagione 2011/12:

Data	Bianca	Forcello	Coturnice	Due specie	Tutte	Totale
2-ott	26	54	11	6	3	100
5-ott	9	40	8	3	1	61
9-ott		62	15	4		81
12-ott		45	13	5		63
16-ott		50	16	2		68
19-ott		27	6	3		36
23-ott		42	16	4		62
26-ott		11	5			16
30-ott		31	10	2		43
2-nov		12	11			23
Totale	35	374	111	29	4	553

Confronto con i dati della stagione 2010/11:

Data	Bianca	Forcello	Coturnice	Lepre	Due specie	Tutte	Non indicato	Totale	
3-ott	13	50	10		5		8	5	91
6-ott	12	29	10		1	11	2		65
10-ott	3	32	17		1	4	8	1	66
13-ott		24	18		2	4	3		51
17-ott		22	16		1	4	5		48
20-ott		33	12		1	3	1		50
24-ott		32	13			2			47
27-ott		17	3			1	1		22
31-ott		6	1			3	1	1	12
3-nov		6	4						10
Totale	28	251	104	6	37	29	7		462

Confronto con i dati della stagione 2009/10:

Data	Forcello	Coturnice	Due specie	Non ind.	Totale
04-ott	45	16	15	12	88
07-ott	39	9	12	5	65
11-ott	33	11	9	9	62
14-ott	24	10	7	4	45
18-ott	34	6	7	3	50
21-ott	13	3		1	17
25-ott	29	4	3	3	39
28-ott	16	5	4	1	26
01-nov	16	4	1	4	25
04-nov	11	8	1	3	23
Totale	260	76	59	45	440

Nella seguente tabella la pressione per specie è suddivisa per Comune:

Comune	Forcello	Coturnice	Pernice bianca	Due specie	Tutte	Totale
Angrogna	37	6	2	2		47
Bobbio Pellice	28	3		2	3	36
Massello			1			1
Perrero	60	2		6		68
Pinasca	2	3				5
Pragelato	52	8		3	7	70
Prali	133	5	5	13	8	164
Pramollo	44	4		2	2	52
Rora'	38	1				39
Roure	13	10				23
Salza di Pinerolo	2					2
Torre Pellice	22	2		1		25
Villar Pellice	47	1		1		49
Totale complessivo	478	45	8	30	20	581

Confronto con la stagione 2014/15:

Comune	Forcello	Coturnice	Tutte	Totale
Angrogna		17	4	21
Bobbio Pellice	6	10	14	30
Perrero	35	4	20	59
Pinasca	1	9		10
Pragelato	27			27
Prali	129	7	8	144
Pramollo	26		1	27
Rorà	8	4	2	14
Roure	9	1	5	15
Salza di Pinerolo	1			1
Torre Pellice	4	8	4	16
Villar Pellice	20	2		22
Totale complessivo	266	62	58	386

Confronto con la stagione 2013/14:

Comune	Bianca	Forcello	Coturnice	Lepre	Due specie	Tutte	Totale
Angrogna		18	7		4	2	31
Bobbio Pellice		15	4		1	3	23
Perrero		71		2			73
Pinasca		8	2	1			11
Pragelato		39		5	4	1	49
Prali	17	132	7	1	5	3	165
Pramollo		22	1	7	1	1	32
Rorà		16					16
Roure		11		3			14
Torre Pellice		9	3	2	2	2	18
Villar Pellice	2	61	2	1	1		67
Totale complessivo	19	402	26	22	18	12	499

Confronto con la stagione 2012/13:

Comune	Bianca	Forcello	Coturnice	Lepre	Due specie	Tutte	Totale
Angrogna		8	10		2		20
Bobbio Pellice	1	6	6		2	3	18
Massello			2				2
Perrero		47	1		3	1	52
Pinasca		1	2		1		4
Pragelato	2	53		1		3	59
Prali	10	106	4	1	9	3	133
Pramollo		10					10
Rorà		5	1				6
Roure		11	11				22
Torre Pellice		3	4	1			8
Villar Pellice	2	32	5				39
Totale complessivo	15	282	46	3	17	10	373

Confronto con la stagione 2011/12:

Comune	Bianca	Forcello	Coturnice	Due specie	Tutte	Totale
Angrogna		18	10	5		33
Bobbio Pellice	1	19	19	3		42
Perosa Argentina			4	1		5
Perrero		90	6	4	1	101
Pinasca		2	10			12
Pragelato	4	45		2		51
Prali	29	113	14	5	2	163
Pramollo		20	18	1		39
Rora'		12				12
Roure		15	10	2		27
S.Pietro Val Lemina			1			1
Torre Pellice		2	9	1		12
Villar Pellice	1	38	10	5	1	55
Totale complessivo	35	374	111	29	4	553

Confronto con la stagione 2010/11:

Comune	Bianca	Forcello	Coturnice	Lepre	Due specie	Tutte	Non indicato	Totale
Angrogna		3	22		3	10	1	39
Bobbio Pellice	2	16	18		2	2		40
Massello			2				1	3
Perosa Argentina			3					3
Perrero		49	11		2	1		63
Pinasca		2	16		3		1	22
Pragelato	2	52		6	3	6		69
Prali	23	69	8		18	4	4	126
Pramollo		19	11		2	2		34
Rora'		3	3		1			7
Roure		8	2			1		11
S.Pietro Val Lemina		3						3
Salza di Pinerolo		1						1
Torre Pellice		2	3		2	1		8
Villar Pellice	1	24	5		1	2		33
Totale	28	251	104	6	37	29	7	462

Confronto con la stagione 2009/10:

Comune	Forcello	Coturnice	Due specie	Non ind.	Totale
Angrogna	15	10	4	5	34
Bobbio Pellice	21	15	12	1	49
Massello		1	1		2
Perosa Argentina	3	4			7
Perrero	38	9	11		58
Pinasca	3	13	2		18
Pragelato	42			4	46
Prali	71	9	22	15	117
Pramollo	21	5		3	29
Rora'	9	1	1		11
Roure	9	5		7	21
S. Pietro Val Lemina	1				1
Torre Pellice	3	1	3	5	12
Villar Pellice	24	3	3	5	35
Totale complessivo	260	76	59	45	440

Il dato della stagione 2015/16 è infine raggruppato a livello di distretto:

Comune	Pernice					Tutte	Totale
	Forcello	Coturnice	bianca	Due specie	Tutte		
Val Pellice	172	13	2	6	3	196	
Valli Chisone e Germanasca	306	32	6	24	17	385	
Totale	478	45	8	30	20	581	

A livello di distretto non è evidente, nella stagione 2015/16, quanto emerso con i dati delle stagioni precedenti, ovvero la netta differenza di pressione per il Fagiano di monte, superiore in Val Chisone e Val Germanasca, mentre la pressione per la Coturnice è maggiore in Val Pellice. Questo probabilmente è in relazione con la riapertura della caccia a questa specie nel Comune di Pragelato, zona di caccia molto frequentata per la facilità di accesso.

E' però lampante, ancora una volta, come lo sforzo per il completamento dei piani (inteso come rapporto fra pressione e capi prelevati) sia nettamente inferiore in Val Pellice rispetto al distretto Valli Chisone e Germanasca.

Confronto con la stagioni precedenti:

Stagione	Distretto	Bianca	Forcello	Coturnice	Lepre	Due specie	Tutte	Non indicato	Totale
	Valli Chisone e Germanasca		228	21			34		283
	Totale		266	62			58		386
2013/14	Val Pellice	2	119	16	3	8	7		155
	Valli Chisone e Germanasca	17	283	10	19	10	5		344
	Totale	19	402	26	22	18	12		499
2012/13	Val Pellice	3	54	26	1	4	3		91
	Valli Chisone e Germanasca	12	228	20	2	13	7		282
	Totale	15	282	46	3	17	10		373
2011/12	Val Pellice	2	89	48		14	1		154
	Valli Chisone e Germanasca	33	285	63		15	3		399
	Totale	35	374	111		29	4		553
2010/11	Val Pellice	3	48	51		9	15	1	127
	Valli Chisone e Germanasca	25	203	53	6	28	14	6	335
	Totale	28	251	104	6	37	29	7	462
2009/10	Val Pellice		72	30		23		16	141
	Valli Chisone e Germanasca		188	46		36		29	299
	Totale complessivo		260	76		59		45	440