



**Comprensorio Alpino TO1  
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

**Stagione venatoria 2006/2007**

**RISULTATI E STATISTICHE  
PRELIEVI  
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI  
CINGHIALE  
TIPICA FAUNA ALPINA  
VOLPE**

**A cura di  
Marco Giovo,  
Responsabile tecnico CATO1**

**Bricherasio, 6 febbraio 2007**

**RISULTATI  
CACCIA DI SELEZIONE  
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE	Roure, Perosa Argentina
	VAL GERMANASCA	Perrero (solo sinistra orografica), Massello, Salza di Pinerolo, Prali
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI  
(come approvato dalla D.G.R. n. 104-3625 del 2.8.2006)

SPECIE	DISTRETTO	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	TOTALE GENERALE	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA			
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Maschi adulti	36	120	390	7 settembre 2006 4 novembre 2006	GIOVEDI' SABATO			
		Femmine adulte	42							
		Giovani dell'anno	42							
	PRAGELATO	Maschi adulti	24	80						
		Femmine adulte	28							
		Giovani dell'anno	28							
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Maschi adulti	29	95						
		Femmine adulte	33							
		Giovani dell'anno	33							
	VAL GERMANASCA	Maschi adulti	29	95						
		Femmine adulte	33							
		Giovani dell'anno	33							
CERVO	PRAGELATO	Maschi adulti	11	50	88	9 novembre 2006 21 dicembre 2006	GIOVEDI' SABATO			
		Femmine adulte	19							
		Daguet	5							
		Giovani dell'anno	15							
	BASSA VAL CHISONE	Maschi adulti	6	28						
		Femmine adulte	10				11 gennaio 2007 28 gennaio 2007			
		Daguet	3							
		Giovani dell'anno	9							
VAL GERMANASCA	VAL GERMANASCA	Maschi adulti	2	10		21/9-12/10/2006	GIOVEDI' SABATO			
		Femmine adulte	4			2/12-21/12/2006				
		Daguet	1			11/1-31/1/2007				
		Giovani dell'anno	3							
MUFLONE	VAL PELLICE	Maschi adulti	4	13	10	14 settembre 2006 11 novembre 2006	GIOVEDI' SABATO			
		Femmine adulte	5							
		Yearling maschi	1							
		Agnelli	3							
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Maschi adulti	23	80	225	14 settembre 2006 11 novembre 2006	GIOVEDI' SABATO			
		Femmine adulte	25							
		Yearling	26							
		Capretti dell'anno	6							
	VAL CHISONE	VAL CHISONE	Maschi adulti	13				45		
			Femmine adulte	14						
			Yearling	15						
			Capretti dell'anno	3						
	VAL GERMANASCA	VAL GERMANASCA	Maschi adulti	29				100		
Femmine adulte			31							
Yearling			33							
Capretti dell'anno			7							

In data 8 settembre, per ordinanza del TAR Piemonte, la caccia di selezione è stata sospesa fino al su tutto il territorio regionale fino al 4 ottobre. In seguito alla sentenza la Giunta regionale con la D.G.R. n. 2-3973 del 6.10.2006 faceva ripartire il prelievo selettivo, modificando i calendari con successiva D.G.R. n. 58-4075 del 17.10.2006 come segue:

Specie	Nuovo calendario
CAMOSCIO	18 ottobre 2006 - 2 dicembre 2006
CAPRIOLO	18 ottobre 2006 - 2 dicembre 2006
MUFLONE	18 ottobre 2006 - 2 dicembre 2006
CERVO Val Germanasca	19/10-4/11/2006; 2/12-21/12/2006; 11/1-28/1/2007

In pratica quindi, i calendari effettivi diventavano:

Specie	Calendario modificato
CAMOSCIO	7 ottobre 2006 - 2 dicembre 2006
CAPRIOLO	7 settembre 2006; 7 ottobre 2006 - 2 dicembre 2006
MUFLONE	7 ottobre 2006 - 2 dicembre 2006
CERVO Val Germanasca	7/10-12/10/2006 19/10-4/11/2006; 2/12-21/12/2006; 11/1-28/1/2007
CERVO Pragelato Bassa Val Chisone	9 novembre 2006 - 21 dicembre 2006 11 gennaio 2007 - 28 gennaio 2007

In data 7 novembre però la caccia di selezione veniva nuovamente sospesa con una nuova ordinanza del TAR fino al 15 novembre.

Con sentenza del 17 novembre il prelievo riprendeva nuovamente, con l'esclusione della specie capriolo la cui caccia riprendeva solamente il 25 novembre con D.G.R. n. 2-4491 del 23 novembre. Per quest'ultima sospensiva non è stato deliberato alcun recupero per cui, rispetto al calendario approvato con D.G.R. n. 58-4075 del 17.10.2006 sono state perse tre giornate per la caccia al Camoscio, al Muflone ed al Cervo (nei soli distretti Pragelato e Bassa Val Chisone) e cinque giornate per il Capriolo.

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI**

Il CA garantisce l'assegnazione di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto.

I criteri per le assegnazioni per la stagione 2006/2007 sono, per le specie Camoscio, Cervo e Muflone i seguenti:

- 1) assegnazione dei capi maschi adulti individualmente nel numero degli animali nel piano autorizzato dalla Giunta regionale, suddivisi per distretto;
- 2) assegnazione dei capi delle altre classi, in forma accorpata (per il camoscio "camoscio femmina adulta o yearling o giovane", per il cervo "cervo femmina adulta o daguet o giovane", per il muflone "muflone femmina adulta o yearling maschio o agnello"), fino ad un numero di autorizzazioni pari a 1,5 volte il numero di capi di queste classi nel piano, per ogni distretto, indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi. Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, sorteggio dei capi residui per quella classe ed assegnazione individuale.

Per la specie capriolo viene assegnata la specie con le tutte le classi in forma accorpata "capriolo maschio adulto o femmina adulta o giovane" fino ad un numero di autorizzazioni pari a 1,5 volte il numero di capi nel piano, per ogni distretto, indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra tutte le classi. Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, sorteggio dei capi residui per quella classe ed assegnazione individuale.

Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone per ogni distretto (esclusi i capi maschi assegnati nel numero esatto), in caso di richieste superiori a 1,5 volte del totale delle restanti classi, assegnazione di un numero di capi non maschi pari al numero delle richieste fino al massimo di 2 volte il numero dei capi di queste nel piano di quel distretto. Le assegnazioni per distretto sono fatte secondo la richiesta fino al raggiungimento della soglia stabilita; in caso di un numero di richieste superiore, verrà data priorità ai residenti nei Comuni componenti il distretto; agli eccedenti, individuati per sorteggio, verrà assegnato un altro distretto d'ufficio, oppure un capo di un'altra specie.

Per la specie Capriolo in caso di richieste superiori a 1,5 volte il totale dei capi in un distretto, assegnazione di un numero di capi pari al numero delle richieste fino al massimo di 2 volte il numero

dei capi nel piano di quel distretto. Le assegnazioni per distretto sono fatte secondo la richiesta fino al raggiungimento della soglia stabilita; in caso di un numero di richieste superiore, verrà data priorità ai residenti nei Comuni componenti il distretto; agli eccedenti, individuati per sorteggio, verrà assegnato un altro distretto d'ufficio, oppure un capo di un'altra specie.

Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone l'assegnazione del maschio viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi per un distretto, si procede secondo il seguente schema:

- 1) assegnazione dei maschi a chi nella passata stagione venatoria ha abbattuto un capo sanitario, di qualunque specie, e non ha richiesto o ottenuto un ulteriore capo;
- 2) assegnazione dei restanti maschi disponibili con precedenza a chi, nella stagione precedente, non ha avuto un maschio adulto assegnato della stessa specie pur avendolo richiesto (in caso di aventi questo diritto in numero superiore al numero di capi maschi ancora disponibili, si procederà per sorteggio);
- 3) in caso di ulteriori rimanenze, queste si assegneranno a sorteggio;

Solamente in caso di ulteriori rimanenze, potrà essere assegnato un capo maschio a chi, nella passata stagione venatoria, ha eseguito un abbattimento non conforme.

I capi non maschi adulti non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni pari a 1,5 volte il totale di questi capi autorizzati, verranno assegnati successivamente come secondo o terzo capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, ai sensi dell'art. 46 comma 3 della LR 70/96. Per gli assegnatari di un primo capo Camoscio, Capriolo o Muflone, i cui calendari sono pressoché contemporanei, è ammessa la possibilità di richiedere un secondo o un terzo capo anche di un'altra specie (non Cervo). Per gli assegnatari di un Cervo, il cui calendario di caccia è molto differenziato dalle altre specie, non è ammessa la possibilità di richiedere un ulteriore capo di un'altra specie. Per gli assegnatari di un Cervo in Val Germanasca, distretto il cui calendario di caccia di questo prevede un'apertura anticipata rispetto agli altri settori, l'eventuale richiesta immediata di un secondo capo potrà essere limitata solamente ad un altro Cervo in quel distretto. E' però ammessa la possibilità di richiedere un secondo capo cervo in un altro distretto al momento di concomitanza dei calendari.

L'assegnazione del secondo capo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capriolo giovane, un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del primo capo al Centro di controllo, un secondo capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un secondo capo di altra specie, è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un secondo capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come primo capo, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, un yearling maschio di muflone o di cervo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo.

Il raggiungimento del 90% del prelievo in un distretto per una classe qualunque del Capriolo o per una classe diversa dal maschio adulto nelle altre specie comporta quindi:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati alla caccia a quella specie in quel distretto che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati alla caccia a quella specie in quel distretto che non hanno ancora realizzato il proprio piano.

I primi esclusi nei sorteggi sono gli assegnatari di un secondo capo.

I sorteggi per le assegnazioni individuali sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sulla segreteria telefonica e mediante

affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In queste comunicazioni sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

In caso di interruzione della caccia ad una specie in un distretto per completamento del piano di prelievo, a coloro che non potranno godere per intero della stagione di caccia alla specie assegnata, nel distretto assegnato, verrà restituito l'anticipo della quota economica già versato per la caccia di selezione (105,00 Euro per il Cervo e 55,00 Euro per tutte le altre specie). Tale rimborso verrà effettuato solo ai possessori di una prima autorizzazione e solamente in caso di interruzione del prelievo prima della quartultima giornata.

L'assegnazione dei capi viene eseguita in locale aperto al pubblico, non appena la Regione comunica l'avvenuta approvazione del Piano di prelievo proposto. Successivamente i risultati delle assegnazioni ed i tempi ed i modi per il ritiro delle autorizzazioni saranno disponibili presso gli uffici del CA.

## ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	80	108	79	15	94
	Val Chisone	45	66	66	0	66
	Val Germanasca	100	135	122	13	135
	<b>TOTALE</b>	<b>225</b>	<b>309</b>	<b>267</b>	<b>28</b>	<b>295</b>
Capriolo	Val Pellice	120	180	109	63	172
	Pragelato	80	120	46	24	70
	Bassa val Chisone	95	142	82	25	107
	Val Germanasca	95	152	63	23	86
	<b>TOTALE</b>	<b>390</b>	<b>594</b>	<b>300</b>	<b>135</b>	<b>435</b>
Cervo	Pragelato	50	69	44	13	57
	Bassa val Chisone	28	39	36	3	39
	Val Germanasca	10	14	14	0	14
	<b>TOTALE</b>	<b>88</b>	<b>122</b>	<b>94</b>	<b>16</b>	<b>110</b>
Mufone	Val Pellice	13	17	5	2	7

## DISTRIBUZIONE DEI SECONDI CAPI ASSEGNATI SECONDO IL TIPO DI PRIMO CAPO CACCIATO

Specie	Distretto	1° autorizzazione		2° autorizzazione		3° autorizzazione	
		autoriz. rilasciate	capi prelevati	autoriz. rilasciate	capi prelevati	autoriz. rilasciate	capi prelevati
Camoscio	Val Chisone	66	37				
	Val Germanasca	122	67	13	7		
	Val Pellice	79	57	11	6	4	3
Capriolo	Bassa Val Chisone e F	82	48	22	13	3	2
	Pragelato	46	35	16	12	8	7
	Val Germanasca	63	45	18	11	5	2
	Val Pellice	109	55	49	33	14	7
Cervo	Bassa Val Chisone	36	17	3	2		
	Pragelato	44	19	13	1		
	Val Germanasca	14	9				
Mufone	Val Pellice	5	3	1		1	
<b>Totale complessivo</b>		<b>666</b>	<b>382</b>	<b>143</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>21</b>



## CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO 15.9-12.11	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	23	21	91%	29	24	83%	13	9	69%	65	54	83%
FEMMINE AD.	25	25	100%	31	31	100%	14	13	93%	70	69	99%
YEARLING	26	15 (8,7)	58%	33	10 (7,3)	30%	15	12 (8,4)	80%	74	37 (23,14)	50%
CAPRETTI	6	5 (4;1)	83%	7	9 (2;7)	129%	3	3 (1,2)	100%	16	17 (7,10)	106%
<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>83%</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>74%</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>82%</b>	<b>225</b>	<b>177</b>	<b>79%</b>
Di cui tiri non conf.					2						2	
Di cui sanitari		2			7						9	

CAPRIOLO 8/9-5/11	Val Pellice			Pragelato			Resto Chisone			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	36	36	100%	24	14	58%	29	25	86%	29	22	76%	118	97	82%
FEMMINE AD.	42	39	93%	28	26	93%	33	24	73%	33	28	85%	136	117	86%
GIOVANI	42	20 (9,11)	48%	28	14 (4,10)	50%	33	14 (9,5)	42%	33	8 (3,5)	24%	136	56 (25;31)	41%
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>79%</b>	<b>80</b>	<b>54</b>	<b>68%</b>	<b>95</b>	<b>63</b>	<b>67%</b>	<b>95</b>	<b>58</b>	<b>61%</b>	<b>390</b>	<b>270</b>	<b>69%</b>
Di cui tiri non conf.		1												1	
Di cui sanitari		2						2						4	

CERVO	Pragelato			Resto Val Chisone			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	11	8	73%	6	3	50%	2	2	100%	19	13	68%
FEMMINE AD.	19	6	32%	10	10	100%	4	5	125%	33	21	64%
DAGUET	5	4	80%	3	2	67%	1	1	100%	9	7	78%
GIOVANI	15	1 (0;1)	7%	9	5 (2;3)	56%	3	1 (1;0)	33%	27	7 (3;4)	26%
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>38%</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>71%</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90%</b>	<b>88</b>	<b>48</b>	<b>55%</b>
Di cui tiri non conf.		0			1			0			1	
Di cui sanitari		1			1			0			2	

MUFLONE 15.9-12.11	Val Pellice		
	PRE	REA	%
MASCHI AD.	4	2	50%
FEMMINE AD.	5		0%
FUSONI	1	1	100%
AGNELLI	3		0%
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>23%</b>
Di cui tiri non conf.		1	
Di cui sanitari			

Legenda:

PRE=Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	23	21	1	91%	29	24	4	83%	13	9		69%	65	54	5	83%
FEMMINE AD.	25	25	1	100%	31	31	2	100%	14	13		93%	70	69	3	99%
YEARLING	26	15		58%	33	10	1	30%	15	12		80%	74	37	1	50%
CAPRETTI	6	5		83%	7	9		129%	3	3		100%	16	17	0	106%
<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>66</b>		<b>83%</b>	<b>100</b>	<b>74</b>		<b>74%</b>	<b>45</b>	<b>37</b>		<b>82%</b>	<b>225</b>	<b>177</b>		<b>79%</b>

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Resto Chisone				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	36	36	1	100%	24	14		58%	29	25	1	86%	29	22	2	76%	118	97	4	82%
FEMMINE AD.	42	39	1	93%	28	26		93%	33	24	1	73%	33	28		85%	136	117	2	86%
GIOVANI	42	20		48%	28	14		50%	33	14		42%	33	8		24%	136	56	0	41%
<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>95</b>		<b>79%</b>	<b>80</b>	<b>54</b>		<b>68%</b>	<b>95</b>	<b>63</b>		<b>66%</b>	<b>95</b>	<b>58</b>		<b>61%</b>	<b>390</b>	<b>270</b>		<b>69%</b>

CERVO	Pragelato				Resto Val Chisone				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	11	8		73%	6	3		50%	2	2		100%	19	13	0	68%
FEMMINE AD.	19	6		32%	10	10		100%	4	5		125%	33	21	0	64%
DAGUET	5	4	1	80%	3	2		67%	1	1		100%	9	7	1	78%
GIOVANI	15	1		7%	9	5	1	56%	3	1		33%	27	7	1	26%
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>19</b>		<b>38%</b>	<b>28</b>	<b>20</b>		<b>71%</b>	<b>10</b>	<b>9</b>		<b>90%</b>	<b>88</b>	<b>48</b>		<b>55%</b>

MUFLONE	Val Pellice			
	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	4	2		50%
FEMMINE AD.	5			0%
FUSONI	1	1		100%
AGNELLI	3			0%
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>3</b>		<b>23%</b>

Legenda:

PRE=Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE





CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%

<b>Specie</b>	<b>Classe</b>	<b>Distretto</b>	<b>Data raggiungimento soglia 90%</b>	<b>Data completamento piano</b>
Camoscio	FA	Val Chisone	28-ott	
Camoscio	FA	Val Pellice	28-ott	
Cervo	DAG	Val Germanasca		28-ott
Camoscio	CAP	Val Germanasca		18-nov
Camoscio	FA	Val Germanasca	23-nov	
Camoscio	CAP	Val Pellice		25-nov
Camoscio	CAP	Val Chisone		25-nov
Capriolo	FA	Val Pellice	30-nov	
Muflore	FUS	Val Pellice		30-nov
Cervo	FA	Bassa Val Chisone	11-gen	25-gen
Cervo	FA	Val Germanasca		28-gen






Legenda:

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane;  
AGN=agnello; FUS=yearling maschio





## CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




## CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




## CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




MUFLONE: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAMOSCIO: AGE-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO







CAMOSCIO: SEX-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO







NB: nel piano previsto si ipotizza un prelievo paritario dei sessi nelle classi di yearling e capretti.



## CAMOSCIO AGE-RATIO: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI








## CAMOSCIO SEX-RATIO: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI








NB: nel piano previsto si ipotizza un prelievo paritario dei sessi nelle classi di yearling e capretti.

CAPRIOLO: SEX-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO








NB: nel piano previsto si ipotizza un prelievo paritario dei sessi nella classe dei giovani.

CAPRIOLO: AGE-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO








CAPRIOLO: SEX-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




NB: nel piano previsto si ipotizza un prelievo paritario dei sessi nella classe dei giovani.

# CAPRIOLO: AGE-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




MUFLONE: AGE-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




Note: nel piano previsto si ipotizza un numero di yearling femmine pari a quelli di yearling maschi.

MUFLONE: SEX-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




Note: nel piano previsto si ipotizza un rapporto paritario dei sessi negli agnelli.

MUFLONE: SEX-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




Note: nel piano previsto si ipotizza un rapporto paritario dei sessi negli agnelli.

MUFLONE: AGE-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




Note: nel piano previsto si ipotizza un numero di yearling femmine pari a quelli di yearling maschi.

## CERVO: SEX-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



Note: nel piano previsto si ipotizza un rapporto paritario dei sessi nei giovani.


## CERVO: AGE-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



Note: nel piano previsto si ipotizza un numero di yearling femmine pari a quelli di yearling maschi.




## CERVO: AGE-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI







Note: nel piano previsto si ipotizza un numero di yearling femmine pari a quelli di yearling maschi.

## CERVO: SEX-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI



Note: nel piano previsto si ipotizza un rapporto paritario dei sessi nei giovani.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI






Legenda: MM=maschi; FF=femmine

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Pragelato				Val Chisone				Val Germanasca				Val Pellice				Totale CATO1
		MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	
20060907	GIO	6	9	3	18	9	1		10	4	2	2	8	7	6	2	15	51
20061007	SAB	3	1	1	5		2	2	4	2	5	1	8	3	3	2	8	25
20061012	GIO		2		2	5	1	1	7	1	1		2	3	2	3	8	19
20061014	SAB		2	1	3	2	1	2	5	1	1	1	3	1	2		3	14
20061019	GIO					1		1	2		2		2			2	2	6
20061021	SAB	1	2	1	4	1	2		3	3	3		6	5	4	1	10	23
20061026	GIO		1	1	2	2	3		5	1	4	1	6	2	4	2	8	21
20061028	SAB	1	2	2	5	1	1		2		1		1	3	2	1	6	14
20061102	GIO	2			2					2	1		3	2	1		3	8
20061104	SAB		2	2	4		1	2	3	2	1	1	4	3	4		7	18
20061109	GIO																	
20061111	SAB																	
20061116	GIO																	
20061118	SAB																	
20061123	GIO																	
20061125	SAB	1	2	1	4	1	5	1	7	1	2	1	4	6	2	1	9	24
20061130	GIO		3	1	4	3	5	2	10		4		4		7	4	11	29
20061202	SAB			1	1		2	3	5	5	1	1	7	1	2	2	5	18
Totale complessivo		14	26	14	54	25	24	14	63	22	28	8	57	36	39	20	95	270

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

GIO = giovane  
TOT = totale distretto




 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato  
 = prelievo sospeso per decreto del TAR

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Chisone					Val Germanasca					Val Pellice					Totale CATO1
		GIO	BIN	FA	MA	TOT	GIO	BIN	FA	MA	TOT	GIO	BIN	FA	MA	TOT	
20060928	GIO												1*				1
20061007	SAB			1		1		1			1		2	2	1	5	7
20061012	GIO			5	2	7	1	1	3	3	8		3	5	5	13	28
20061014	SAB		2	1	2	5	1		4	3	8		2	3	2	7	20
20061019	GIO							1	1	1	3			2		2	5
20061021	SAB			3		3			1		1		1	1		2	6
20061026	GIO		1	1	1	3		1	4	1	6		1	5	2	8	17
20061028	SAB		1	2	1	4	1	1	4	1	7		1	4	2	7	18
20061102	GIO		1			1	1	1	3	3	8				3	3	12
20061104	SAB	1	2			3	2		2	2	6	1			1	2	11
20061109	GIO																
20061111	SAB																
20061116	GIO																
20061118	SAB		1			1	3		4	3	10						11
20061123	GIO	1	2			3		1	4	2	7	2	1		2	5	15
20061125	SAB	1			2	3		1	1		2	2		1		3	8
20061130	GIO		1			1		1		3	4		1	1	1	3	8
20061202	SAB		1		1	2		1		2	3		2	1	2	5	10
Totale complessivo		3	12	13	9	37	9	10	31	24	74	5	15	25	21	66	177

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta




BIN = yearling  
GIO = giovane

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato  
 = prelievo sospeso per decreto del TAR

Note: \* capo abbattuto durante il primo periodo di sospensione decretato dal TAR

CALENDARIO ABBATTIMENTI MUFLONE

Data	Giorno	AGN	FA	FUS	MA	Totale
20061007	SAB					
20061012	GIO					
20061014	SAB					
20061019	GIO					
20061021	SAB					
20061026	GIO					
20061028	SAB					
20061102	GIO				1	
20061104	SAB					
20061109	GIO					
20061111	SAB					
20061116	GIO					
20061118	SAB					
20061123	GIO				1	
20061125	SAB					
20061130	GIO			1		
20061202	SAB					
Totale complessivo				1	2	3

	= superamento del 90% del piano
	= piano completato
	= prelievo sospeso per decreto del TAR

Legenda:

MA = maschi adulto  
FA = femmina adulta





FUS = yearling maschio  
GIO = giovane

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO





DATA	GIORNO	Pragelato					Val Chisone					Val Germanasca					Totale CATO1	
		GIO	DAG	FA	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MA	TOT		
20060921	GIO																	
20060923	SAB																	
20060928	GIO																	
20060930	SAB																	
20061005	GIO																	
20061007	SAB																	
20061012	GIO																1	1
20061019	GIO																	
20061021	SAB																	
20061026	GIO											1					1	1
20061028	SAB											1					1	1
20061102	GIO															1	1	1
20061104	SAB																	
20061109	GIO																	
20061111	SAB																	
20061116	GIO																	
20061118	SAB	1		1	1	3	1	1	5	1	8							11
20061123	GIO		1		1	2	2		1		3							5
20061125	SAB		2		2	4												4
20061130	GIO																	
20061202	SAB																	
20061207	GIO			2		2												2
20061209	SAB			1	2	3		1	1		2							5
20061214	GIO													1			1	1
20061216	SAB																	
20061221	GIO		1		2	3	1		1		2							5
20070111	GIO								1	1	2			1	1	2		4
20070113	SAB																	
20070114	DOM									1	1							1
20070118	GIO																	
20070120	SAB																	
20070121	DOM			1		1												1
20070125	GIO			1		1			1		1							2
20070127	SAB																	
20070128	DOM						1				1			2			2	3
Totale complessivo		1	4	6	8	19	5	2	10	3	20	1	1	5	2	9		48

MA = maschio adulto  
 FA = femmina adulta  
 DAG = daguet




GIO = giovane  
 TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato  
 = caccia chiusa  
 = prelievo sospeso per decreto del TAR

## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI







## CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO








# CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



## CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



## GIORNATE IMPIEGATE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### CAMOSCIO

Classe	Parametro	VC	VG	VP	Totale
GIO	N	3	9	5	17
	Media	6,3	3,3	2,2	3,5
	D.S.	3,2	2,0	2,2	2,6
BIN	N	12	10	15	37
	Media	3,4	3,0	2,5	2,9
	D.S.	1,8	1,9	1,4	1,7
FA	N	13	31	24	68
	Media	2,3	2,7	2,6	2,6
	D.S.	1,3	1,7	1,9	1,7
MA	N	9	24	21	54
	Media	3,6	3,2	2,7	3,1
	D.S.	2,9	2,3	1,5	2,1
Conteggio generale		37	74	65	176
Media generale		3,3	3,0	2,6	2,9
D.S. generale		2,3	1,9	1,7	1,9

### MUFLONE

Classe	Parametro	VP
AGN	N	0
	Media	
	D.S.	
FA	N	0
	Media	
	D.S.	
FUS	N	1
	Media	9,0
	D.S.	N.D.
MA	N	2
	Media	5,0
	D.S.	2,8
Conteggio generale		8
Media generale		6,3
D.S. generale		3,1

### CAPRIOLO

Classe	Parametro	PR	VC	VG	VP	Totale
GIO	N	14	25	22	36	97
	Media	1,9	2,4	3,6	2,6	2,7
	D.S.	1,5	1,8	2,4	1,7	1,9
FA	N	26	24	28	39	117
	Media	1,9	3,9	3,0	2,8	2,8
	D.S.	1,2	1,9	1,7	1,9	1,8
MA	N	14	14	8	20	56
	Media	1,8	2,9	2,8	3,0	2,6
	D.S.	1,1	1,7	2,2	2,1	1,8
Conteggio generale		54	63	58	95	270
Media generale		1,9	3,1	3,2	2,8	2,7
D.S. generale		1,2	1,9	2,0	1,8	1,8

### CERVO





Classe	Parametro	PR	BVC	VG	Totale
GIO	N	1	5	1	7
	Media	1,0	4,6	3,0	3,9
	D.S.	N.D.	4,6	N.D.	4,0
DAG	N	4	2	1	7
	Media	3,0	3,0	2,0	2,9
	D.S.	2,0	2,8	N.D.	1,9
FA	N	6	9	5	20
	Media	4,0	2,6	7,4	4,2
	D.S.	2,5	2,1	4,2	3,3
MA	N	8	3	1	12
	Media	3,8	5,7	7,0	4,5
	D.S.	2,5	4,2	N.D.	2,9
Conteggio generale		19	19	8	46
Media generale		3,5	3,6	6,1	4,0
D.S. generale		2,3	3,3	3,9	3,1

Note:





PR=Pragelato  
 VC=Val Chisone  
 VP=Val Pellice  
 VG=Val Germanasca  
 BVC=Bassa Val Chisone

GIO=giovane  
 BIN=yearling  
 FA=femmina adulta  
 MA=maschio adulto  
 DAG=daguet  
 FUS=yearling maschio  
 AGN=agnello

TRENDS DEL NUMERO DI GIORNATE NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO SECONDO IL DISTRETTO



TRENDS DEL NUMERO DI GIORNATE NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO SECONDO LA CLASSE



Note: MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; BIN=yearling; DAG=daguet; FUS=yearling maschio; AGN=agnello; GIO=giovane

## ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### NUMERO PRELIEVI SANITARI

#### CAMOSCIO

Classe	VC	VG	VP	Totale
GIO				
BIN			1	1
FA		2	1	3
MA		4	1	5
Totale		7	2	9

#### CAPRIOLO

Classe	VC	VG	VP	Totale
GIO				0
FA		1	1	2
MA		1	1	2
Totale		2	2	4

#### CERVO

Classe	PR	VC	VG	Totale
GIO			1	1
DAG		1		1
FA				
MA				
Totale		1	1	2

#### Legenda:

GIO = giovane  
 BIN = yearling  
 DAG = daguet  
 FA = femmina adulta  
 MA = maschio adulto

PR = Prigelato  
 VC = Val Chisone  
 VG = Val Germanasca  
 VP = Val Pellice

### TIPI DI ANOMALIE

#### CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI				3	3
LESIONE DIVERSE				1	1
PESO			1		1
Totale complessivo			1	3	5

#### CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI			1	2
LESIONI DIVERSE				
PESO			1	1
Totale complessivo			2	2

#### CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MA	Totale
PESO	2				2
Totale complessivo	2				2

## ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### CAMOSCIO

Classe	VC	VG	VP	Totale
CAP				
BIN			1	1
FA				
MA			1	1
Totale complessivo			2	2

#### Tipi di errore

Classe	VC	VG	VP	Totale
MA x FA o BIN o CAP			1	1
FA x BIN o CAP				
BIN x MA			1	1
BIN x MA				
FA x BIN				
CAPO NON AUT.				
Totale complessivo			2	2

#### Legenda:

GIO = giovane  
 BIN = yearling  
 DAG = daguet  
 FA = femmina adulta  
 MA = maschio adulto  
 AGN = giovane  
 YRM = yearling maschio

PR = Prigelato  
 VC = Val Chisone  
 VG = Val Germanasca  
 VP = Val Pellice

### CAPRIOLO

Classe	PR	VC	VG	VP	Totale
GIO					
FA					
MA				1	1
Totale complessivo				1	1

#### Tipi di errore

Classe	PR	VC	VG	VP	Totale
MA x FA o GIO				1	1
FA x GIO					
Totale complessivo				1	1

### CERVO

Classe	VC	VG	PR	Totale
GIO				
DAG				
FA		1		1
MA				
Totale complessivo		1		1

#### Tipi di errore

Classe	VC	VG	PR	Totale
FAxGIOoDAG		1		1
Totale complessivo		1		1

### MUFLONE

Classe	Totale
AGN	
YRM	1
FA	
MA	
Totale complessivo	1





#### Tipi di errore

Classe	Totale
YM x MA	1
Totale complessivo	1

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza: 2 (1 cervo femmina adulta nel distretto Bassa Val Chisone e 1 camoscio yearling in Val Pellice)





Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI SANITARI NEGLI ANNI






# TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NEGLI ANNI




DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Mufione	Totale complessivo
ANGROGNA	4	7			11
BOBBIO PELLICE	39	44		3	86
BRICHERASIO		1			1
INVERSO PINASCA		1			1
LUSERNETTA		6			6
MASSELLO	8				8
PEROSA ARGENTINA	8	6			14
PERRERO	14	29	1		44
PINASCA	3	3			6
POMARETTO		2			2
PRAGELATO	13	54	19		86
PRALI	40	21	5		66
PRAMOLLO		19			19
RORA'		2			2
ROURE	13	25	20		58
S. GERMANO CHISONE		3			3
SALZA DI PINEROLO	12	6	3		21
TORRE PELLICE	2	9			11
VILLAR PELLICE	21	26			47
VILLAR PEROSA		6			6
Totale complessivo	177	270	48	3	498


# CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI




# CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# CERVO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



MUFLONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



**RISULTATI  
CACCIA AL CINGHIALE**

## CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 5	17 settembre 2006 17 dicembre 2006	MERCOLEDI' DOMENICA

## AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	F	M	Totale
VAL PELLICE	61	72	133
VAL CHISONE, GERM. E PIN.	138	113	251
Totale CATO1	199	185	384

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	F	M	Totale
Val Pellice	61	72	133
Pinerolese pedemontano	17	20	37
Val Chisone	95	79	174
Val Germanasca	26	14	40
Totale complessivo	199	185	384

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

Classe di età	Valli Chisone e Germ.				Val Pellice				Totale CATO1			
	F	M	Totale	%	F	M	Totale	%	F	M	Totale	%
0-12 mesi	56	62	118	47,0	24	30	54	40,6	80	92	172	44,8
13-24 mesi	45	32	77	30,7	16	25	41	30,8	61	57	118	30,7
25-36 mesi	29	8	37	14,7	12	12	24	18,0	41	20	61	15,9
oltre 36 mesi	8	11	19	7,6	9	5	14	10,5	17	16	33	8,6
Totale complessivo	138	113	251	100,0	61	72	133	100,0	199	185	384	100,0



CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE


Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		F	M	TOTALE	F	M	TOTALE	
20060917	DOM	10	6	16	9	9	18	34
20060920	MER	2	2	4	10	5	15	19
20060924	DOM	6	3	9	3	9	12	21
20060927	MER	3	4	7	5	4	9	16
20061001	DOM		5	5	4	4	8	13
20061004	MER		2	2	6	4	10	12
20061008	DOM	2	1	3	7	3	10	13
20061011	MER		1	1	2	1	3	4
20061015	DOM	3	1	4	5	4	9	13
20061018	MER	2	1	3	2	3	5	8
20061022	DOM				4	2	6	6
20061025	MER		1	1	5	4	9	10
20061029	DOM		4	4	4	5	9	13
20061101	MER	1	2	3	3	1	4	7
20061105	DOM	2	3	5	4	4	8	13
20061108	MER		1	1	3	4	7	8
20061112	DOM	4	5	9	7	7	14	23
20061115	MER	2	2	2	1	3	4	6
20061119	DOM	4	4	8	4	6	10	18
20061122	MER	3		3	5	4	9	12
20061126	DOM	3	3	6	12	1	13	19
20061129	MER	3	5	8	7	3	10	18
20061203	DOM	1	6	7	5	4	9	16
20061206	MER		1	1	2	2	4	5
20061210	DOM	6	4	10	6	8	14	24
20061213	MER	2	3	5	10	4	14	19
20061217	DOM	2	4	6	3	5	8	14
Totale complessivo		61	72	133	138	113	251	384

Legenda: F=femmine; M=maschi

## DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	13
BIBIANA	4
BOBBIO PELLICE	13
BRICHERASIO	14
CANTALUPA	18
FROSSASCO	5
INVERSO PINASCA	3
LUSERNA S. GIOVANNI	13
LUSERNETTA	4
PEROSA ARGENTINA	25
PERRERO	37
PINASCA	52
POMARETTO	1
PORTE	5
PRALI	2
PRAMOLLO	17
PRAROSTINO	2
RORA'	12
ROURE	52
S. GERMANO CHISONE	14
S. PIETRO VAL LEMINA	12
TORRE PELLICE	19
VILLAR PELLICE	41
VILLAR PEROSA	6
<b>Totale complessivo</b>	<b>384</b>

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'




L'età è espressa in mesi.

## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE



**RISULTATI  
CACCIA ALLE SPECIE DELLA  
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2006/2007

SPECIE	SETTORE	CAPI PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE (solo maschi)	VAL PELLICE	14	8 ottobre 2006 29 novembre 2006	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	26		
PERNICE BIANCA	VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	10		
COTURNICE	VAL PELLICE	21	8 ottobre 2006 8 novembre 2006	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	21		

Il Comitato di gestione del CA, in base alla verifica dei capi abbattuti al termine della giornata del 29 ottobre 2006, su indicazione del Coordinatore faunistico regionale, deve immediatamente procedere alla chiusura dell'attività venatoria alle specie di cui sopra, nel caso in cui il numero di capi presentati sia inferiore o uguale al 50% del piano autorizzato. Nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
<b>FAGIANO DI MONTE</b>	14	14	100%	26	25	96%	<b>40</b>	<b>39</b>	98%
<b>PERNICE BIANCA</b>							<b>10</b>	<b>9</b>	90%
<b>COTURNICE</b>	21	19	90%	21	22	105%	<b>42</b>	<b>41</b>	98%
<b>LEPRE VARIABILE</b>							<b>10</b>	<b>0</b>	0%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

## TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	specie	Sesso	AD	JUV	Totale
Valli Chisone e Germanasca	FAGIANO DI MONTE	M	12	13	25
	PERNICE BIANCA	F	3	1	4
		M	4	1	5
		TOT	7	2	9
	COTURNICE	F	4	2	6
		M		11	11
		IND	4	1	5
TOT		8	14	22	
Val Pellice	FAGIANO DI MONTE	M	8	6	14
	COTURNICE	F	5	3	8
		M		6	6
		IND	4	1	5
		TOT	9	10	19
Totale CATO1	FAGIANO DI MONTE	M	20	19	39
	PERNICE BIANCA	F	3	1	4
		M	4	1	5
		TOT	7	2	9
	COTURNICE	F	9	5	14
		M		17	17
		IND	8	2	10
TOT		17	24	41	

Legenda:

M = maschio

F = femmina

IND = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno

CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER  
COMPLETAMENTO DEL PIANO

<b>Specie</b>	<b>Distretto</b>	<b>Data completamento piano</b>
Pernice bianca	Tutto il CA	11-ott
Coturnice	Valli Chisone e Germanasca	22-ott
Fagiano di monte	Val Pellice	05-nov
Coturnice	Val Pellice	05-nov
Fagiano di monte	Valli Chisone e Germanasca	15-nov


DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Pernice B.	Coturnice	Totale
ANGROGNA	5		7	12
BOBBIO PELLICE	6		11	17
PEROSA ARGENTINA			3	3
PERRERO	4		1	5
PINASCA			3	3
PRAGELATO	1		3	4
PRALI	16	9	5	30
PRAMOLLO	1			1
ROURE	3		5	8
SALZA DI PINEROLO			2	2
TORRE PELLICE			1	1
VILLAR PELLICE	3			3
<b>Totale complessivo</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>89</b>




## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA


### Prelievo Fagiano di Monte




### Prelievo Pernice bianca







### Prelievo Coturnice







### Prelievo Lepre variabile



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA: DISTRETTO VAL PELLICE



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA: DISTRETTO VALLI CHISONE E GERMANASCA




CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			PERNICE BIANCA			COTURNICE			Totale CA
		VC	VP	Totale	VC	VP	Totale	VC	VP	Totale	
20061008	DOM	3	3	6	6		6	7	1	8	20
20061011	MER	5	2	7	3		3	5	2	7	17
20061015	DOM	1	3	4					3	3	7
20061018	MER							6	2	8	8
20061022	DOM	1	2	3				4	3	7	10
20061025	MER	3		3					1	1	4
20061029	DOM	3	1	4					2	2	6
20061101	MER	4	2	6					2	2	8
20061105	DOM		1	1					3	3	4
20061108	MER	3		3							3
20061112	DOM	1		1							1
20061115	MER	1		1							1
20061119	DOM										
20061122	MER										
20061126	DOM										
20061129	MER										
Totale complessivo		25	14	39	9	0	9	22	19	41	89

VP = Distretto Val Pellice





VC = Distretto Val Chisone e Germanasca




= caccia chiusa per completamento del piano

= caccia chiusa per disposizioni regionali


TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA




# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI FAGIANO DI MONTE



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI PERNICE BIANCA



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI COTURNICE





**RISULTATI  
CACCIA ALLA VOLPE**

## PIANO DI PRELIEVO E CALENDARIO 2006/2007

DISTRETTO	PIANO COMPLESSIVO (NUMERO CAPI)	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	<b>200</b>	17 settembre 2006 17 dicembre 2006  7 gennaio 2007 31 gennaio 2007	MERCOLEDI' DOMENICA

A gennaio 2007 la caccia alla Volpe è praticabile solamente in squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 10 cacciatori. E' consentito l'uso del cane, con un massimo di 4 cani per comitiva.

La composizione delle squadre, il giorno ed il luogo di caccia devono essere comunicati per iscritto imbucando un foglio con i dati sopra indicati nelle cassette utilizzabili per i tagliandi per la caccia di selezione, prima di iniziare la battuta di caccia. Utilizzare una delle cassette della valle dove si effettua la battuta. Il luogo di caccia comunicato non potrà essere successivamente variato.

Durante queste battute è vietato l'uso ed il porto di munizione intera.

## RISULTATI PRELIEVO VOLPE

Valle	classe	F	M	TOT
Valli Chisone, Germanasca e Pinerolese	AD	13	18	31
	JUV	10	12	22
	TOT	23	30	53
Val Pellice	AD	3	10	13
	JUV		5	5
	TOT	3	15	18
Totale CATO1	AD	16	28	44
	JUV	10	17	27
	TOT	26	45	71


Legenda:

F= femmina; M = maschio


JUV = giovane dell'anno; AD = adulto di 1 o più anni

IND = animale di sesso e/o età indeterminata

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DELLA VOLPE



## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI VOLPE



## CASI DI ROGNA

Anno	N. casi	Capi visitati	%
2001	17	101	16,8
2002	8	79	10,1
2003	2	101	2,0
2004	5	100	5,0
2005	5	78	6,4
2005	5	71	7,0

CALENDARIO PRELIEVO VOLPE


Data	Giorno	VAL CHISONE, GERM. E PIN.			VAL PELLICE			TOTALE CATO1
		F	M	TOT	F	M	TOT	
20060917	DOM	2	1	3		1	1	4
20060920	MER	1	3	4				4
20060924	DOM		2	2				2
20060927	MER	1	1	2				2
20061001	DOM		1	1				1
20061004	MER				1		1	1
20061008	DOM	2	3	5				5
20061011	MER				1		1	1
20061015	DOM					1	1	1
20061018	MER	2	1	3		2	2	5
20061022	DOM	1	1	2				2
20061025	MER	1		1		1	1	2
20061029	DOM		1	1				1
20061101	MER		1	1				1
20061105	DOM							
20061108	MER	1	2	3				3
20061112	DOM		1	1				1
20061115	MER		1	1				1
20061119	DOM							
20061122	MER	1	1	2				2
20061126	DOM	1	3	4		2	2	6
20061129	MER	2		2				2
20061203	DOM	2	1	3				3
20061206	MER							
20061210	DOM	1	1	2		1	1	3
20061213	MER	1	1	2		1	1	3
20061217	DOM	2	1	3		1	1	4
20070107	DOM	1	2	3		1	1	4
20070110	MER							
20070114	DOM					1	1	1
20070117	MER							
20070121	DOM		1	1		2	2	3
20070124	MER				1	1	2	2
20070128	DOM	1		1				1
20070131	MER							
Totale complessivo		23	30	53	3	15	18	71

M = maschio; F = femmina

## DISTRIBUZIONE PRELIEVI DI VOLPE NEI COMUNI

COMUNE	N. VOLPI
ANGROGNA	3
BOBBIO PELLICE	1
BRICHERASIO	1
INVERSO PINASCA	1
LUSERNA SAN GIOVANNI	1
PEROSA ARGENTINA	2
PERRERO	8
PINASCA	4
PINEROLO	1
POMARETTO	1
PORTE	1
PRAGELATO	3
PRALI	2
PRAROSTINO	4
ROLETTO	6
RORA'	1
ROURE	11
S. GERMANO CHISONE	4
S. PIETRO VAL LEMINA	4
SALZA DI PINEROLO	1
TORRE PELLICE	7
VILLAR PELLICE	4
Totale complessivo	71

# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI VOLPE



## CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2007/2008

Numero giornate per tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	MUFLONE	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA	VOLPE
<b>Meteo</b>							
nuvoloso			2		8	2	8
pioggia/neve	1	1	2	1	2	1	2
sereno	7	7	16	7	15	8	21
variabile	6	5	7	6	2		3
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>34</b>

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia (su pendici esposte a S):

