



**Comprensorio Alpino TO1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

Stagione venatoria 2010/2011

**RISULTATI E STATISTICHE
PRELIEVI
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
CINGHIALE
TIPICA FAUNA ALPINA
VOLPE**

**A cura di
Marco Giovo,
Responsabile tecnico CATO1**

Bricherasio, 25 gennaio 2011

**RISULTATI
CACCIA DI SELEZIONE
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI
(D.G.R. n. 55-469 del 2.8.2010)

SPECIE	DISTRETTO	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	TOTALE GENERALE	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Maschi adulti	36 (12)	120	350	16 settembre 2010 13 novembre 2010	GIOVEDI' SABATO
		Femmine adulte	36				
	Giovani dell'anno	48					
	PRAGELATO	Maschi adulti	12 (4)	40			
Femmine adulte	12						
BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Maschi adulti	31 (10)	105				
Femmine adulte	34						
Giovani dell'anno	40						
VAL GERMANASCA	Maschi adulti	25 (8)	85				
Femmine adulte	25						
Giovani dell'anno	35						
CERVO	PRAGELATO	Maschi adulti	5 (1)	24	72	21 ottobre 2010 18 dicembre 2010	GIOVEDI' SABATO
		Femmine adulte	8				
	Daguet	1					
	Giovani dell'anno	10					
BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti	7 (1)	30				
Femmine adulte	10						
Daguet	2						
Giovani dell'anno	11						
VAL GERMANASCA	Maschi adulti	1 (0)	8				
Femmine adulte	2						
Daguet	1						
Giovani dell'anno	4						
BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti	1 (0)	10				
Femmine adulte	4						
Yearling maschi	1						
Agnelli	4						
MUFLONE	VAL PELLICE	Maschi adulti	3	10	10	16 settembre 2010 13 novembre 2010	GIOVEDI' SABATO
Femmine adulte	4						
Yearling maschi	1						
Agnelli	2						
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Maschi adulti	26	90	220	16 settembre 2010 13 novembre 2010	GIOVEDI' SABATO
		Femmine adulte	28				
	Yearling	30					
Capretti dell'anno	6						
VAL CHISONE	Maschi adulti	14	50				
Femmine adulte	16						
Yearling	16						
Capretti dell'anno	4						
VAL GERMANASCA	Maschi adulti	23	80				
Femmine adulte	25						
Yearling	26						
Capretti dell'anno	6						

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. n. 37-6385 del 9.7.2007.

I criteri per le assegnazioni per la stagione 2010/2011 sono, per tutte le specie, i seguenti:

1) assegnazione dei capi maschi adulti di tutte le specie con un numero di autorizzazioni pari al numero esatto degli animali maschi adulti del piano autorizzato dalla Giunta regionale, suddivisi per distretto;

2) assegnazione dei capi delle altre classi, in forma accorpata (per il camoscio "camoscio femmina adulta o yearling o giovane", per il cervo "cervo femmina adulta o daguet o giovane", per il muflone "muflone femmina adulta o yearling maschio o agnello", per il capriolo "capriolo femmina adulta o giovane"), fino ad un numero di autorizzazioni, comprese quelle per i maschi adulti, di pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto, indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate. Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, sorteggio dei capi residui per quella classe ed assegnazione individuale.

In caso di richieste in un distretto per una specie in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, verrà data priorità ai residenti nei Comuni componenti il distretto; agli eccedenti, individuati per sorteggio, verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata (55,00 euro) e sarà garantita la priorità nelle assegnazioni nella stagione venatoria successiva. Per la stagione venatoria 2010/11, il CATO1 ha chiesto ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione, di fornire la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti agli Ungulati. Coloro i quali non hanno dato tale disponibilità potranno accedere al piano per la specie, il capo ed il distretto richiesti, solamente in caso di domande per quella specie, classe e distretto in numero inferiore al tetto stabilito, in subordine agli altri. La disponibilità a partecipare ai censimenti costituisce quindi criterio di merito, unitamente all'abbattimento di una femmina senza latte, ai sensi dei disposti della D.G.R. n. 1-5653 del 5.4.2007.

L'assegnazione del maschio viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi per un distretto, si procede secondo il seguente schema:

1) assegnazione dei maschi a chi nella passata stagione venatoria ha abbattuto un capo sanitario, di qualunque specie, e non ha richiesto o ottenuto un ulteriore capo;

2) assegnazione dei restanti maschi disponibili con precedenza a chi, nella stagione precedente, non ha avuto un maschio adulto assegnato della stessa specie pur avendolo richiesto e non ha abbattuto una femmina con il latte (nel caso gli aventi questo diritto siano in numero superiore al numero di capi maschi ancora disponibili, si procederà per sorteggio);

3) assegnazione dei restanti maschi ancora disponibili con precedenza a chi, nella stagione precedente, non ha avuto un maschio adulto assegnato della stessa specie pur avendolo richiesto e ha abbattuto una femmina con il latte (nel caso gli aventi questo diritto siano in numero superiore al numero di capi maschi ancora disponibili, si procederà per sorteggio);

4) in caso di ulteriori rimanenze, queste si assegneranno a sorteggio;

Solamente in caso di ulteriori rimanenze, potrà essere assegnato un capo maschio a chi, nella passata stagione venatoria, ha eseguito un abbattimento non conforme.

I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano, verranno assegnati successivamente come secondo, terzo o quarto capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta.

Per la stagione venatoria 2010/11, vista la sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere un ulteriore capo anche di un'altra specie.

L'assegnazione del secondo capo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capriolo giovane, un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del primo capo al Centro di controllo, un secondo capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un secondo capo di altra specie, è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un secondo capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come primo capo, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, uno yearling maschio di muflone o di cervo o di capriolo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo.

Tolti i casi relativi alle assegnazioni immediate, trascorso il mese di caccia ad una specie, l'assegnazione di ulteriori capi, viene fatta direttamente presso i Centri di Controllo, ai diretti interessati, fino ad esaurimento autorizzazioni disponibili.

Il raggiungimento del 90% del prelievo in un distretto per ogni specie per una classe qualunque diversa dal maschio adulto comporta quindi:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati alla caccia a quella specie in quel distretto che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati alla caccia a quella specie in quel distretto che non hanno ancora realizzato il proprio piano.

I primi esclusi nei sorteggi sono gli assegnatari di un secondo capo e di un terzo capo.

I sorteggi per le assegnazioni individuali sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sulla segreteria telefonica e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In queste comunicazioni sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

La Regione impone l'applicazione di un numero massimo di Cervi maschi coronati prelevabili per ciascun distretto. Tali animali non vengono assegnati, ma raggiunto il tetto indicato per ogni distretto, ne verrà data comunicazione e non potranno più essere cacciati animali con queste caratteristiche del trofeo.

Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti

numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

In caso di interruzione della caccia ad una specie in un distretto per completamento del piano di prelievo, a coloro che non potranno godere per intero della stagione di caccia alla specie assegnata, nel distretto assegnato, verrà restituito l'anticipo della quota economica già versato per la caccia di selezione (105,00 Euro per il Cervo e 55,00 Euro per tutte le altre specie). Tale rimborso verrà effettuato solo ai possessori di una prima autorizzazione e solamente in caso di interruzione del prelievo prima della quartultima giornata.

L'assegnazione dei primi capi viene eseguita non appena la Regione comunica l'avvenuta approvazione del Piano di prelievo proposto. Successivamente i risultati delle assegnazioni ed i tempi ed i modi per il ritiro delle autorizzazioni saranno disponibili presso gli uffici del CA.

L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso e a coloro che siano incorsi in qualsiasi infrazione della normativa venatoria vigente o del regolamento, a seguito di comunicazione ufficiale degli organi di vigilanza. L'abbattimento di una femmina con il latte (fino al 30 novembre) comporta la mancata riassegnazione di capi adulti con trofeo nella stagione in corso.

ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	90	117	96	21	117
	Val Chisone	50	65	58	7	65
	Val Germanasca	80	104	93	9	102
	TOTALE	220	286	247	37	284
Capriolo	Val Pellice	129	167	73	48	121
	Pragelato	40	52	19	12	31
	Bassa val Chisone	105	136	100	36	136
	Val Germanasca	85	110	32	31	63
	TOTALE	359	465	224	127	351
Cervo	Pragelato	24	31	20	11	31
	Bassa val Chisone1	30	39	19	16	35
	Bassa val Chisone2	10	13	11	2	13
	Val Germanasca	8	10	8	2	10
	TOTALE	72	93	58	31	89
Mufone	Val Pellice	10	17	7	4	11

DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autorizzazione		2° autorizzazione		3° autorizzazione		4° autorizzazione	
		autoriz.	capi	autoriz.	capi	autoriz.	capi	autoriz.	capi
Camoscio	Val Pellice	96	64	18	14	3	2		
	Val Chisone	58	41	5	5	1	1	1	1
	Val Germanasca	93	62	7	5	2			
Capriolo	Val Pellice	73	42	36	21	11	8	1	1
	Pragelato	19	10	7	6	3	2	2	
	Bassa Val Chisone	100	51	32	15	4	1		
	Val Germanasca	32	21	21	13	8	5	2	1
Cervo	Pragelato	20	9	11	3				
	Bassa Val Chisone1	19	12	12	5	4	2		
	Bassa Val Chisone2	11	9	1		1			
	Val Germanasca	8	6	2					
Mufone	Val Pellice	7	4	3	1	1			
Totale complessivo		536	331	155	88	38	21	6	3

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: 2 cervi femmina adulte a Pragelato.

CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO 16.9 - 13.11	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	26	22	85%	23	18	78%	14	13	93%	63	53	84%
FEMMINE AD.	28	28	100%	25	26	104%	16	15	94%	69	69	100%
YEARLING	30	23 (12;11)	77%	26	17 (11;6)	65%	16	16 (6;10)	100%	72	56 (29;27)	78%
CAPRETTI	6	7 (2;5)	117%	6	6 (3;3)	100%	4	4 (2;2)	100%	16	17 (7;10)	106%
Totale	90	80	89%	80	67	84%	50	48	96%	220	195	89%
Di cui tiri non conf.												
Di cui sanitari	6			3			1			10		

CAPRIOLO 16.9 - 13.11	Val Pellice			Pragelato			Resto Chisone			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	36	21	58%	12	6	50%	31	19	61%	25	13	52%	104	59	57%
FEMMINE AD.	36	36	100%	12	11	92%	34	33	97%	25	16	64%	107	96	90%
GIOVANI	48	15 (6;9)	31%	16	1 (0,1)	6%	40	15 (7;8)	38%	35	11 (2;9)	31%	139	42 (15;27)	30%
Totale	120	72	60%	40	18	45%	105	67	64%	85	40	47%	350	197	56%
Di cui tiri non conf.	1									1			1		
Di cui sanitari	3						1			1			5		

CERVO 21.9 - 18.12	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	5	4	80%	7	2	29%	1	1	100%	1	1	100%	14	8	57%
FEMMINE AD.	8	9	113%	10	10	100%	4	4	100%	2	3	150%	24	26	108%
DAGUET	1		0%	2	2	100%	1		0%	1	1	100%	5	3	60%
GIOVANI	10	1 (0,1)	10%	11	5 (2,3)	45%	4	4 (2;2)	100%	4	1 (0,1)	25%	29	11 (4;7)	38%
Totale	24	14	58%	30	19	63%	10	9	90%	8	6	75%	72	48	67%
Di cui tiri non conf.				1									1		
Di cui coronati	1			1			0			0			2		
Di cui sanitari				1									1		

MUFLONE 16.9 - 13.11	Val Pellice		
	PRE	REA	%
MASCHI AD.	3	1	33%
FEMMINE AD.	4	2	50%
FUSONI	1	1	100%
AGNELLI	2	1 (1;0)	50%
Totale	10	5	50%
Di cui tiri non conf.			
Di cui sanitari			

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	26	20	2	85%	23	16	2	78%	14	12	1	93%	63	48	5	84%
FEMMINE AD.	28	26	2	100%	25	25	1	104%	16	15		94%	69	66	3	100%
YEARLING	30	22	1	77%	26	17		65%	16	16		100%	72	55	1	78%
CAPRETTI	6	6	1	117%	6	6		100%	4	4		100%	16	16	1	106%
Totale	90	80		89%	80	67		84%	50	48		96%	220	195		89%

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Resto Chisone				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	36	19	2	58%	12	6		50%	31	19		61%	25	13		52%	104	57	2	57%
FEMMINE AD.	36	36		100%	12	11		92%	34	32	1	97%	25	16		64%	107	95	1	90%
GIOVANI	48	14	1	31%	16	1		6%	40	15		38%	35	10	1	31%	139	40	2	30%
Totale	120	72		60%	40	18		45%	105	67		64%	85	40		47%	350	197		56%

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	5	4		80%	7	1	1	29%	1	1		100%	1	1		100%	14	7	1	57%
FEMMINE AD.	8	9		113%	10	10		100%	4	4		100%	2	3		150%	24	26		108%
DAGUET	1			0%	2	2		100%	1			0%	1	1		100%	5	3		60%
GIOVANI	10	1		10%	11	5		45%	4	4		100%	4	1		25%	29	11		38%
Totale	24	14		58%	30	19		63%	10	9		90%	8	6		75%	72	48		67%

MUFLONE	Val Pellice			
	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	3	1		33%
FEMMINE AD.	4	2		50%
FUSONI	1	1		100%
AGNELLI	2	1		50%
Totale	10	5		50%

Legenda:

PRE=Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari





Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%






Specie	Classe	Distretto	Data raggiungimento soglia 90%	Data completamento piano
Camoscio	CAP	Val Chisone		23-set
Muflone	FUS	Val Pellice		23-set
Camoscio	CAP	Val Pellice		14-ott
Capriolo	FA	Val Pellice		23-ott
Cervo	DAG	Val Germanasca		23-ott
Cervo	FA	Val Germanasca		23-ott
Capriolo	FA	Pragelato	28-ott	
Capriolo	FA	Bassa Val Chisone	30-ott	
Camoscio	BIN	Val Chisone		30-ott
Camoscio	FA	Val Chisone	6-nov	
Camoscio	FA	Val Pellice	6-nov	
Camoscio	FA	Val Germanasca		11-nov
Camoscio	CAP	Val Germanasca		11-nov
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone 1		13-nov
Cervo	GIO	Bassa Val Chisone 2		2-dic
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 2		4-dic
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 1	9-dic	

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio






CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



MUFLONE: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2006/07	Val Pellice	83%	1,05	1,00	40,0%	30,3%	6,0	7,4
	Val Chisone	82%	1,05	1,06	40,0%	40,5%	5,6	5,5
	Val Germanasca	74%	1,04	1,24	40,0%	25,7%	7,6	6,9
	Totale	79%	1,05	1,11	40,0%	30,5%	6,6	6,8
2007/08	Val Pellice	84%	1,05	0,95	40,0%	30,3%	6,1	8,2
	Val Chisone	93%	1,05	0,83	40,0%	38,1%	6,9	4,6
	Val Germanasca	95%	1,02	0,96	40,0%	37,8%	6,4	8,7
	Totale	90%	1,04	0,93	40,0%	35,1%	6,4	7,7
2008/09	Val Pellice	96%	1,03	0,97	39,2%	38,0%	7,0	7,6
	Val Chisone	88%	1,04	1,21	39,6%	40,5%	5,4	5,8
	Val Germanasca	92%	1,02	1,08	39,8%	35,8%	6,4	9,7
	Totale	92%	1,03	1,06	39,5%	37,6%	6,4	8,1
2009/10	Val Pellice	93%	1,00	1,11	40,0%	37,8%	5,7	8,6
	Val Chisone	95%	1,00	1,11	40,0%	34,2%	6,6	5,6
	Val Germanasca	85%	1,00	1,20	42,3%	36,4%	6,3	6,0
	Totale	91%	1,00	1,14	40,7%	36,5%	6,1	7,1
2010/11	Val Pellice	89%	1,05	1,22	40,0%	37,5%	5,8	7,0
	Val Chisone	96%	1,08	1,29	40,0%	41,7%	6,6	6,5
	Val Germanasca	84%	1,05	1,09	40,0%	34,3%	5,9	6,2
	Totale	89%	1,06	1,19	40,0%	37,4%	6,1	6,6

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2006/07	Pragelato	38%	1,13	0,58	30,0%	5,3%	2,9	5,5
	Bassa Val Chisone	71%	1,07	1,86	32,1%	25,0%	3,0	5,1
	Val Germanasca	90%	1,22	1,25	30,0%	11,1%	3,5	3,0
	Totale	55%	1,12	1,09	30,7%	14,6%	3,0	4,7
2007/08	Pragelato	52%	1,04	1,36	34,0%	15,4%	4,4	3,6
	Bassa Val Chisone	50%	1,07	4,00	30,0%	20,0%	2,0	4,1
	Val Germanasca	44%	1,00	3,00	33,3%	25,0%	3,0	3,0
	Totale	51%	1,05	2,00	32,6%	17,8%	4,0	3,8
2008/09	Pragelato	50%	1,13	0,85	31,3%	4,2%	3,6	4,2
	Bassa Val Chisone	95%	1,10	1,10	31,8%	28,6%	5,2	4,1
	Val Germanasca	50%	1,22	1,50	30,0%	0,0%	3,0	5,0
	Totale	63%	1,13	1,00	31,3%	14,0%	4,1	4,3
2009/10	Pragelato	33%	1,00	1,17	42,5%	23,1%	4,7	4,5
	Bassa Val Chisone 1	63%	0,92	1,14	41,7%	26,7%	2,0	5,0
	Bassa Val Chisone 2	25%	1,29		50,0%	0,0%		3,0
	Val Germanasca	50%	1,00	0,33	37,5%	50,0%	2,0	3,0
2010/11	Pragelato	58%	1,18	2,50	41,7%	7,1%	4,2	3
	Bassa Val Chisone 1	63%	1,07	2,17	36,7%	26,3%	2,5	4,7
	Bassa Val Chisone 2	90%	1,50	2,00	40,0%	44,4%	5	3
	Val Germanasca	75%	1,00	2,00	50,0%	16,7%	3	1,7
	Totale	67%	1,15	2,20	40,3%	22,9%	3,7	3,5

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

MUFLONE: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2006/07	23%	1,00	0,00	38,5%	33,3%	2,0	
2007/08	46%	1,00	1,00	38,5%	16,7%	6,0	2,0
2008/09	27%	1,00	0,33	33,3%	25,0%	3,0	N.D.
2009/10	46%	1,00	0,20	38,5%	33,3%	3,0	6,0
2010/11	50%	1,00	0,67	40,0%	40,0%	4,0	5,5





Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani. Età delle femmine non sempre determinabile.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2006/07	Val Pellice	79%	1,11	1,11	35,0%	21,1%	2,9	3,2
	Pragelato	68%	1,11	2,00	35,0%	25,9%	3,4	2,7
	Bassa Val Chisone	67%	1,09	0,85	34,7%	22,2%	2,6	3,3
	Val Germanasca	61%	1,09	1,32	34,7%	13,8%	3,5	3,0
	Totale CATO1	69%	1,10	1,21	34,9%	20,7%	3,0	3,1
2007/08	Val Pellice	62%	1,10	1,66	35,3%	19,4%	2,8	3,5
	Pragelato	69%	1,08	1,17	34,7%	25,0%	2,3	3,1
	Bassa Val Chisone	72%	1,09	1,71	35,6%	23,1%	2,9	3,1
	Val Germanasca	50%	1,12	1,52	35,2%	17,0%	3,0	3,5
	Totale CATO1	63%	1,10	1,53	35,2%	20,9%	2,8	3,3
2008/09	Val Pellice	62%	1,10	1,22	34,9%	13,8%	3,0	3,4
	Pragelato	73%	1,13	1,82	35,3%	25,8%	3,8	3,3
	Bassa Val Chisone	59%	1,08	1,75	34,7%	13,6%	3,4	3,2
	Val Germanasca	64%	1,12	1,79	35,2%	14,9%	3,5	3,4
	Totale CATO1	64%	1,11	1,54	35,0%	16,7%	3,3	3,3
2009/10	Val Pellice	56%	1,02	2,6	37,3%	25,8%	3,7	3,8
	Pragelato	60%	1,11	1,7	35,0%	16,7%	3,4	3,7
	Bassa Val Chisone	58%	1,02	1,6	36,7%	23,1%	3,4	2,9
	Val Germanasca	71%	0,98	1	38,6%	30,0%	3,9	3,8
	Totale CATO1	61%	1,02	1,6	37,1%	25,0%	3,6	3,5
2010/11	Val Pellice	60%	1,00	1,7	40,0%	20,8%	2,9	2,5
	Pragelato	45%	1,00	2,0	40,0%	5,6%	2,2	3,9
	Bassa Val Chisone	64%	1,06	1,6	38,1%	22,4%	3,6	3,0
	Val Germanasca	47%	1,00	1,7	41,2%	27,5%	3,2	3,5
	Totale CATO1	56%	1,02	1,7	39,7%	21,3%	3,1	3,0

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI



Legenda: MM=maschi; FF=femmine

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Pragelato				Val Chisone				Val Germanasca				Val Pellice				Totale CATO1
		MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	
20100916	GIO		1		1	2	4	1	7		2		2	5	10	2	17	27
20100918	SAB	3	1	1	5	4	4	3	11	2			2	3	5		8	26
20100923	GIO		2		2	2	2	3	7	1	1	1	3	3	6		9	21
20100925	SAB						2		2	2	1	2	5	2	1	1	4	11
20100930	GIO	1	2		3	3	2		5	2			2	1	2	1	4	14
20101002	SAB		1		1	1	4		5		1	1	2		3	3	6	14
20101007	GIO									1	2		3	1	3	1	5	8
20101009	SAB	1			1	1	1		2					1	1		2	5
20101014	GIO		1		1	1	5		6		1		1	1		1	2	10
20101016	SAB					1	2		3			1	1					4
20101021	GIO		1		1		3	2	5		1		1		1		1	8
20101023	SAB					2		1	3			1	1		4		4	8
20101028	GIO		2		2		1	1	2	1	1	1	3	1		1	2	9
20101030	SAB	1			1	1	3	1	5		1	1	2			1	1	9
20101104	GIO									1	1		2					2
20101106	SAB					1		1	2	2	2	2	6					8
20101111	GIO							1	1		1	1	2			1	1	4
20101113	SAB							1	1	1	1	2	2	3		3	6	9
Totale complessivo		6	11	1	18	19	33	15	67	13	16	11	40	21	36	15	72	197

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta

GIO = giovane
TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Chisone					TOT	Val Germanasca					TOT	Val Pellice					TOT	Totale CATO1
		GIO	BIN	FA	MA	GIO		BIN	FA	MA	GIO	BIN		FA	MA					
20100916	GIO	1	2	1	2	6	1	3	2	2	8	2	8	4	4	18	32			
20100918	SAB	1	3	2	2	8		4	1	4	9	1	4	2	3	10	27			
20100923	GIO	2	1	1	1	5	1	2	4	3	10	2	1	5	2	10	25			
20100925	SAB		1	1	1	3			5	1	6	1	1	2	1	5	14			
20100930	GIO		3	1		4		2	2	1	5		3	1		4	13			
20101002	SAB		1		1	2			2		2						4			
20101007	GIO		1	1		2				1	1		1			1	4			
20101009	SAB				1	1	1			1	1						2			
20101014	GIO		1			1		2		2	1	1	2	2		5	8			
20101016	SAB			1		1			2	1	3		1		1	2	6			
20101021	GIO		1	1		2	1			1	1				1	1	4			
20101023	SAB			1		1			2	1	3		1	2	5	8	12			
20101028	GIO												1	1		2	2			
20101030	SAB		2	1	3	6		1	1	1	3			3	3	6	15			
20101104	GIO			1		1			1	1	2			3	1	4	7			
20101106	SAB			3	2	5								3		3	8			
20101111	GIO						2	2	4	2	10						10			
20101113	SAB							1			1				1	1	2			
Totale complessivo		4	16	15	13	48	6	17	26	18	67	7	23	28	22	80	195			

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta

BIN = yearling
GIO = giovane

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato

CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO

DATA	GIORNO	Pragelato				TOT	Bassa Val Chisone 1				TOT	Bassa Val Chisone 2				TOT	Val Germanasca				TOT	CATO1
		GIO	DAG	FA	MA		GIO	DAG	FA	MA		GIO	DAG	FA	MA		GIO	DAG	FA	MA		
20101021	GIO				2	2	1		1		2							1			1	5
20101023	SAB									1	1										3	4
20101028	GIO			1		1							1									2
20101030	SAB						1				1											1
20101104	GIO			1	1	2																2
20101106	SAB				1	1				1	1											4
20101111	GIO			2		2			1		1											4
20101113	SAB								1	1	2											2
20101118	GIO								1		1											1
20101120	SAB								1		1											1
20101125	GIO			1		1				2	2											3
20101127	SAB	1		1		2	1			2	3	1		1	1							8
20101202	GIO			1		1	1				1	1			1							4
20101204	SAB										1		1					1			1	2
20101209	GIO									1			1									1
20101211	SAB																1				1	1
20101216	GIO																					
20101218	SAB			2		2	1			1	2											4
Totale complessivo		1		9	4	14	5	2	10	2	19	4		4	1	9	1	1	3	1	6	48

MA = maschio adulto
 FA = femmina adulta
 DAG = daguet

GIO = giovane
 TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato

CALENDARIO ABBATTIMENTI MUFLONE

Data	Giorno	AGN	FUS	FA	MA	Totale
20100916	GIO					
20100918	SAB					
20100923	GIO	1	1		1	3
20100925	SAB			1		1
20100930	GIO					
20101002	SAB					
20101007	GIO					
20101009	SAB					
20101014	GIO					
20101016	SAB					
20101021	GIO			1		1
20101023	SAB					
20101028	GIO					
20101030	SAB					
20101104	GIO					
20101106	SAB					
20101111	GIO					
20101113	SAB					
Totale		1	1	2	1	5





 = superamento del 90% del piano
 = piano completato

Legenda:




MA = maschi adulto
 FA = femmina adulta

FUS = yearling maschio
 GIO = giovane





TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI







CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2006	Giovane	5	2,2	2,2	3	6,3	3,2	9	3,3	2,0	17	3,5	2,6
	Yearling	15	2,5	1,4	12	3,4	1,8	10	3,0	1,9	37	2,9	1,7
	Femmina adulta	24	2,6	1,9	13	2,3	1,3	31	2,7	1,7	68	2,6	1,7
	Maschio adulto	21	2,7	1,5	9	3,6	2,9	24	3,2	2,3	54	3,1	2,1
	Totale	65	2,6	1,7	37	3,3	2,3	74	3,0	1,9	176	2,9	1,9
2007	Giovane	4	4,0	2,6	3	3,3	1,5	8	3,4	3,2	15	3,5	2,7
	Yearling	19	2,9	2,9	13	2,6	1,0	26	2,9	2,5	58	2,8	2,4
	Femmina adulta	29	2,5	2,1	13	3,2	2,0	31	3,1	1,9	73	2,9	2,0
	Maschio adulto	24	4,3	3,2	12	3,4	2,9	25	4,0	3,5	61	4,0	3,2
	Totale	76	3,2	2,8	41	3,1	2,0	90	3,3	2,7	207	3,2	2,6
2008	Giovane	6	3,2	2,0	3	2,0	1,0	6	3,3	2,9	15	3,0	2,2
	Yearling	21	2,1	1,8	14	3,4	2,8	23	3,5	1,9	58	3,0	2,2
	Femmina adulta	26	3,1	2,4	13	1,8	0,9	27	3,1	2,5	66	2,8	2,2
	Maschio adulto	18	3,4	2,5	12	3,2	2,0	25	2,6	1,6	55	3,0	2,0
	Totale	71	2,9	2,2	42	2,7	2,1	81	3,1	2,1	194	2,9	2,1
2009	Giovane	6	2,0	0,6	3	3,0	2,0	6	5,0	2,8	15	3,4	2,4
	Yearling	22	2,4	1,4	10	3,8	2,5	10	3,9	2,6	42	3,1	2,1
	Femmina adulta	26	2,4	1,7	13	2,1	1,9	17	3,4	1,8	56	2,6	1,8
	Maschio adulto	20	3,8	3,0	12	2,8	2,7	11	4,2	3,5	43	3,6	3,0
	Totale	74	2,7	2,1	38	2,8	2,3	44	3,9	2,6	156	3,1	2,3
2010	Giovane	7	2,1	1,2	4	1,8	1,0	6	4,7	3,2	17	2,9	2,4
	Yearling	23	1,9	1,3	16	2,3	1,4	17	2,8	2,0	56	2,3	1,6
	Femmina adulta	28	2,7	1,6	15	3,5	2,2	26	3,5	2,3	69	3,2	2,0
	Maschio adulto	21	3,3	2,2	13	2,8	2,2	18	3,2	3,1	52	3,2	2,5
	Totale	79	2,6	1,8	48	2,8	1,9	67	3,3	2,5	194	2,9	2,1

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2006	Giovane	14	1,8	1,1	20	3,0	2,1	14	2,9	1,7	8	2,8	2,2	56	2,6	1,8
	Femmina adulta	26	1,9	1,2	39	2,8	1,9	24	3,9	1,9	28	3,0	1,7	117	2,8	1,8
	Maschio adulto	14	1,9	1,5	36	2,6	1,7	25	2,4	1,8	22	3,6	2,4	97	2,7	1,9
	Totale	54	1,9	1,2	95	2,8	1,8	63	3,1	1,9	58	3,2	2,0	270	2,7	1,8
2007	Giovane	13	1,8	1,1	18	4,0	3,1	15	4,3	1,8	9	3,4	2,6	55	3,5	2,5
	Femmina adulta	24	2,0	1,0	46	3,3	2,7	30	4,1	2,5	24	2,7	1,7	124	3,1	2,3
	Maschio adulto	15	2,5	1,9	28	4,6	3,4	19	3,8	2,7	20	4,9	3,6	82	4,1	3,1
	Totale	52	2,1	1,4	92	3,8	3,0	64	4,1	2,4	53	3,6	2,8	261	3,5	2,7
2008	Giovane	16	2,5	1,9	15	3,2	2,4	6	3,0	2,4	10	3,5	2,5	47	3,0	2,2
	Femmina adulta	28	1,6	0,9	52	3,4	2,9	23	2,4	1,7	37	3,3	2,3	140	2,9	2,3
	Maschio adulto	17	1,8	1,2	42	3,0	2,6	15	3,7	2,8	20	3,1	2,7	94	2,9	2,5
	Totale	61	1,9	1,3	109	3,2	2,7	44	2,9	2,2	67	3,3	2,4	281	2,9	2,4
2009	Giovane	4	2,8	1,7	16	3,3	2,2	12	4,7	3,1	15	4,1	2,1	47	3,8	2,4
	Femmina adulta	12	3,0	1,8	33	2,8	2,1	26	3,1	1,8	22	3,9	2,7	93	3,2	2,2
	Maschio adulto	8	2,9	3,8	13	4,5	3,4	14	4,4	2,5	13	4,7	3,5	48	4,3	3,2
	Totale	24	2,9	2,5	62	3,3	2,5	52	3,8	2,4	50	4,2	2,7	188	3,6	2,6
2010	Giovane	1	2,0		15	3,7	3,1	15	3,8	2,5	11	2,4	1,4	42	3,3	2,5
	Femmina adulta	11	2,6	1,4	36	2,3	1,6	33	3,3	1,7	16	4,2	2,7	96	3,0	1,9
	Maschio adulto	6	3,0	2,0	21	3,0	2,3	19	3,4	2,1	13	3,5	1,6	59	3,2	2,0
	Totale	18	2,7	1,6	72	2,8	2,2	67	3,4	2,0	40	3,5	2,2	197	3,1	2,1

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

MUFLONE: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	n	x	ds	Stagione	Classe	n	x	ds
2006	Agnello				2009	Agnello	1	2,0	-
	Yearling maschio	1	9,0	-		Yearling maschio	1	2,0	-
	Femmina adulta					Femmina adulta	1	2,0	-
	Maschio adulto	2	5,0	2,8		Maschio adulto	3	4,0	2,0
	Totale	3	6,3	3,1		Totale	6	3,0	1,7
2007	Agnello				2010	Agnello	1	3,0	-
	Yearling maschio	1	3,0	-		Yearling maschio	1	3,0	-
	Femmina adulta	3	5,3	4,0		Femmina adulta	2	2,5	2,1
	Maschio adulto	2	6,0	7,1		Maschio adulto	1	2,0	-
	Totale	6	5,2	4,2		Totale	5	2,6	1,1
2008	Agnello	1	1,0	-					
	Yearling maschio								
	Femmina adulta	1	1,0	-					
	Maschio adulto	2	3,5	2,1					
	Totale	4	2,3	1,9					

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Totale		
		N	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2006	Giovane	1	1,0	-	5	4,6	4,6				1	3,0	-	7	3,9	4,0
	Daguet	4	3,0	2,0	2	3,0	2,8				1	2,0	-	7	2,9	1,9
	Femmina adulta	6	4,0	2,5	10	3,4	3,3				5	7,4	4,2	21	4,5	3,6
	Maschio adulto	8	3,8	2,5	3	5,7	4,2				1	7,0	-	12	4,5	2,9
	Totale	19	3,5	2,3	20	4,0	3,6				8	6,1	3,9	47	4,2	3,2
2007	Giovane	4	5,8	4,5	3	4,3	2,5				1	2,0	-	8	4,8	3,5
	Daguet	5	2,0	1,0	1	6,0	-				1	4,0	-	7	2,9	1,8
	Femmina adulta	12	4,8	2,7	10	1,7	0,9				2	6,0	1,4	24	3,6	2,6
	Maschio adulto	5	6,2	4,5	1	2,0	-							6	5,5	4,4
	Totale	26	4,7	3,3	15	2,5	1,9				4	4,5	2,1	45	4,0	3,0
2008	Giovane	1	4,0	-	6	4,2	2,3							7	4,1	2,1
	Daguet	5	2,6	2,1	2	3,0	0,0				1	3,0	-	8	2,8	1,6
	Femmina adulta	10	2,6	1,6	8	3,4	1,5				3	5,0	1,7	21	3,2	1,7
	Maschio adulto	8	3,9	2,9	5	3,6	2,1				1	3,0	-	14	3,7	2,4
	Totale	24	3,1	2,2	21	3,6	1,8				5	4,2	1,6	50	3,4	2,0
2009	Giovane	2	5,5	3,5	1	1,0	-				1	1,0	-	4	3,3	3,3
	Daguet	1	1,0	-	3	7,0	1,7				1	1,0	-	5	4,6	3,5
	Femmina adulta	6	3,5	3,1	8	3,6	2,9	2	9,5	4,9	1	1,0	-	17	4,1	3,6
	Maschio adulto	4	4,3	3,9	3	8,0	2,0				1	2,0	-	8	5,4	3,6
	Totale	13	3,8	3,2	15	5,0	3,2	2	9,5	4,9	4	1,3	0,5	34	4,4	3,5
2010	Giovane	1	3,0	-	5	5,0	4,2	4	8,0	4,2	1	4,0	-	11	5,8	4,0
	Daguet				2	6,0	0,0				1	2,0	-	3	4,7	2,3
	Femmina adulta	7	3,7	2,6	10	4,8	3,8	4	6,3	3,0	3	1,7	0,6	24	4,3	3,2
	Maschio adulto	4	2,8	2,1	2	2,5	0,7	1	6,0	-	1	4,0	-	8	3,3	1,8
	Totale	12	3,3	2,2	19	4,7	3,4	9	7,0	3,3	6	2,5	1,2	46	4,5	3,2

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NUMERO PRELIEVI SANITARI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO	1			1
BIN	1			1
FA	2	1		3
MA	2	2	1	5
Totale	6	3	1	10

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO			1		1
FA				1	1
MA		2			2
Totale		3	1	1	5

MUFLONE

Classe	VP	Totale
GIO		
BIN		
FA		
MA		
Totale		

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA					
MA			1		1
Totale			1		1

Legenda:

GIO = giovane	PR = Prigelato
BIN = yearling	VC = Bassa Val Chisone e Pinerolese
DAG = daguet	VG = Val Germanasca
FA = femmina adulta	VC1 = Bassa Val Chisone 1
MA = maschio adulto	VC2 = Bassa Val Chisone 2

TIPI DI ANOMALIE

CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI				2	5
LESIONE DIVERSE				1	1
PESO	1	1			2
Totale complessivo	1	1	3	5	10

CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI		1	1	2
PALCO IN VELLUTO			1	1
LESIONI DIVERSE				
PESO	2			2
Totale complessivo	2	1	2	5

MUFLONE

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI					
LESIONE DIVERSE					
PESO					
Totale complessivo					

CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI				1	1
PESO					
Totale complessivo				1	1

ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP				
BIN				
FA				
MA				
Totale complessivo				

Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o BIN o CAP				
GIO x FA o BIN				
FA x BIN o CAP				
BIN x MA				
FA x BIN				
Totale complessivo				

Legenda:

GIO = giovane
 BIN = yearling
 DAG = daguet
 FA = femmina adulta
 MA = maschio adulto
 AGN = giovane
 YRM = yearling maschio

PR = Prigelato
 VC = Val Chisone
 VG = Val Germanasca
 VP = Val Pellice

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA		1			1
Totale complessivo		1			1

Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO		1			1
FA x GIO					
Totale complessivo		1			1

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA		1			1
MA					
Totale complessivo		1			1

Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
FAxGIO		1			1
MAxFAoDAGoGIO					
Totale complessivo		1			1

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza: -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: 2 cervi femmina adulte a Prigelato

ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

Camoscio

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2006	Capretti	5			5	3			3	9			9	17			17
	Yearling	14			14	12			12	8	1	1	10	34	1	1	36
	Femmine ad.	23		1	24	13			13	29		2	31	65		3	68
	Maschi adulti	20		1	21	9			9	19	1	4	24	48	1	5	54
	Totale	62		2	64	37			37	65	2	7	74	164	2	9	175
2007	Capretti	4			4	3			3	7		1	8	14		1	15
	Yearling	18		1	19	13			13	24	1	1	26	55	1	2	58
	Femmine ad.	28		1	29	12		1	13	28		3	31	68		5	73
	Maschi adulti	20	1	3	24	11		1	12	23	1	1	25	54	2	5	61
	Totale	70	1	5	76	39		2	41	82	2	6	90	191	3	13	207
2008	Capretti	5	1		6	3			3	5		1	6	13	1	1	15
	Yearling	21			21	13	1		14	22		1	23	56	1	1	58
	Femmine ad.	25		1	26	13			13	27			27	65		1	66
	Maschi adulti	18			18	12			12	22		3	25	52		3	55
	Totale	69	1	1	71	41	1		42	76		5	81	186	2	6	194
2009	Capretti	6			6	3			3	6			6	15			15
	Yearling	21		1	22	10			10	10			10	41		1	42
	Femmine ad.	22		4	26	12		1	13	15		2	17	49		7	56
	Maschi adulti	20			20	11	1		12	10	1		11	41	2		43
	Totale	69		5	74	36	1	1	38	41	1	2	44	143	2	8	156
2010	Capretti	6		1	7	4			4	6			6	16		1	17
	Yearling	22		1	23	16			16	17			17	55		1	56
	Femmine ad.	26		2	28	15			15	25		1	26	66		3	69
	Maschi adulti	20		2	22	12		1	13	16		2	18	48		5	53
	Totale	74		6	80	47		1	48	64		3	67	185		10	195

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

Muflore

Stagione	Classe	CONF	ET	SAN	TOT
2006	Agnelli				
	Yearling maschi		1		1
	Femmine adulte				
	Maschi adulti	2			2
	Totale	2	1		3
2007	Agnelli				
	Yearling maschi		1		1
	Femmine adulte	3			3
	Maschi adulti	2			2
	Totale	5	1		6
2008	Agnelli	1			1
	Yearling maschi				
	Femmine adulte	1			1
	Maschi adulti	2			2
	Totale	4			4
2009	Agnelli	1			1
	Yearling maschi	1			1
	Femmine adulte			1	1
	Maschi adulti	3			3
	Totale	5		1	6
2010	Agnelli	1			1
	Yearling maschi	1			1
	Femmine adulte	2			2
	Maschi adulti	1			1
	Totale	5			5

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi, SAN=abbattimenti sanitari

Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa V. Chisone 1				Bassa V. Chisone 2				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2006	Giovani	1			1	4		1	5					1			1	6		1	7
	Daguet	3		1	4	2			2					1		1	1	6		1	7
	Femmine ad.	6			6	9	1		10					5		5	20	1			21
	Maschi adulti	8			8	3			3					2		2	13				13
	Totale	18		1	19	18	1	1	20					9		9	45	1	2		48
2007	Giovani	4			4	3			3					1		1	8				8
	Daguet	5			5	1			1					1		1	7				7
	Femmine ad.	12			12	10			10					2		2	24				24
	Maschi adulti	4		1	5	1			1								5		1		6
	Totale	25		1	26	15			15					4		4	44		1		45
2008	Giovani	1			1	6			6								7				7
	Daguet	5			5	2			2					1		1	8				8
	Femmine ad.	10			10	8			8					3		3	21				21
	Maschi adulti	6	2		8	5			5					1		1	12	2			14
	Totale	22	2		24	21			21					5		5	48	2			50
2009	Giovani	2			2	1			1					1		1	4				4
	Daguet	1			1	3			3					1		1	5				5
	Femmine ad.	6			6	8			8	2		2		1		1	17				17
	Maschi adulti	4			4	3			3					1		1	8				8
	Totale	13			13	15			15	2		2		1		1	34				34
2010	Giovani	1			1	5			5	4		4		1		1	11				11
	Daguet				0	2			2			0		1		1	3				3
	Femmine ad.	9			9	9	1		10	4		4		3		3	25	1			26
	Maschi adulti	4			4	1		1	2	1		1		1		1	7		1		8
	Totale	14			14	17	1	1	19	9		9		6		6	46	1	1		48

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

Capriolo


Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2006	Giovani	14			14	20			20	14			14	8			8	56			56
	Femmine ad.	26			26	38		1	39	23		1	24	28			28	115		2	117
	Maschi adulti	14			14	34	1	1	36	24		1	25	22			22	94	1	2	97
	Totale	54			54	92	1	2	95	61		2	63	58			58	265	1	4	270
2007	Giovani	13			13	18			18	15			15	9			9	55			55
	Femmine ad.	24			24	46			46	29		1	30	24			24	123		1	124
	Maschi adulti	14	1		15	26	2		28	19			19	19	1		20	78	4		82
	Totale	51	1		52	90	2		92	63		1	64	52	1		53	256	4	1	261
2008	Giovani	16			16	15			15	6			6	10			10	47			47
	Femmine ad.	27	1		28	51		1	52	23			23	35	2		37	136	3	1	140
	Maschi adulti	17			17	39	1	2	42	14	1		15	19	1		20	89	3	2	94
	Totale	60	1		61	105	1	3	109	43	1		44	64	3		67	272	6	3	281
2009	Giovani	4			4	16			16	11		1	12	15			15	46		1	47
	Femmine ad.	12			12	33			33	26			26	21	1		22	92		1	93
	Maschi adulti	6	2		8	11		2	13	14			14	13			13	44	2	2	48
	Totale	24			24	60		2	62	51		1	52	49	1		50	182	2	4	188
2010	Giovani	14		1	15	1			1	15			15	10		1	11	40		2	42
	Femmine ad.	36			36	11			11	32		1	33	16			16	95		1	96
	Maschi adulti	18	1	2	21	6			6	19			19	13			13	56	1	2	59
	Totale	68	1	3	72	18			18	67			67	39		1	40	191	1	5	197

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari


DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Mufone	Totale complessivo
ANGROGNA	3	6			9
BOBBIO PELLICE	45	12		5	62
BRICHERASIO		2			2
INVERSO PINASCA	2	3	1		6
LUSERNA S. GIOVANNI		2			2
LUSERNETTA		1			1
MASSELLO	7				7
PEROSA ARGENTINA	10	6	5		21
PERRERO	13	26	4		43
PINASCA	7	10			17
POMARETTO		5			5
PRAGELATO	16	18	14		48
PRALI	36	7	2		45
PRAMOLLO	2	23	3		28
RORA'		10			10
ROURE	11	17	14		42
S. GERMANO CHISONE		4	5		9
S. PIETRO VAL LEMINA		1			1
SALZA DI PINEROLO	11	2			13
TORRE PELLICE	5	14			19
VILLAR PELLICE	27	25			52
VILLAR PEROSA		3			3
Totale complessivo	195	197	48	5	445


CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



CERVO E MUFLONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



Note: ● Cervo; ● Muflone

**RISULTATI
CACCIÀ AL CINGHIALE**

CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 5	26 settembre 2010 26 dicembre 2010	MERCOLEDI' DOMENICA

AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
VAL PELLICE	71	56	127
VAL CHISONE, GERM. E PIN.	165	171	336
Totale CATO1	236	227	463

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	71	56	127
Pinerolese pedemontano	27	34	61
Val Chisone	114	118	232
Val Germanasca	24	19	43
Totale complessivo	236	227	463

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ

Classe di età	Val Pellice				Valli Chisone, Germ. e Pin.				Totale CATO1			
	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%
0-12 mesi	33	25	58	45,7	77	77	154	45,8	110	102	212	45,8
13-24 mesi	20	18	38	29,9	50	56	106	31,5	70	74	144	31,1
25-36 mesi	16	10	26	20,5	31	29	60	17,9	47	39	86	18,6
oltre 36 mesi	2	3	5	3,9	7	9	16	4,8	9	12	21	4,5
Totale complessivo	71	56	127	100,0	165	171	336	100,0	236	227	463	100,0

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE


Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20100926	DOM	6	4	10	9	19	28	38
20100929	MER	1	2	3	5	7	12	15
20101003	DOM	2	2	4	6	1	7	11
20101006	MER	1		1	6	10	16	17
20101010	DOM	5	3	8	10	7	17	25
20101013	MER	2	2	4	4	3	7	11
20101017	DOM	1	1	2	4	3	7	9
20101020	MER	5	3	8	3		3	11
20101024	DOM	3	3	6	8	9	17	23
20101027	MER	1	1	2	8	8	16	18
20101031	DOM	2		2	3	3	6	8
20101103	MER	2		2	2	9	11	13
20101107	DOM	5	4	9	8	3	11	20
20101110	MER	2	1	3	5	5	10	13
20101114	DOM	2	1	3	8	6	14	17
20101117	MER	4	2	6	9	2	11	17
20101121	DOM	7	7	14	3	4	7	21
20101124	MER	2	2	4	10	12	22	26
20101128	DOM		1	1	4	2	6	7
20101201	MER	2	1	3	5	13	18	21
20101205	DOM	3	1	4	15	14	29	33
20101208	MER	4	4	8	9	9	18	26
20101212	DOM	1		1	8	9	17	18
20101215	MER	2	5	7	4	3	7	14
20101219	DOM	2	3	5	4	4	8	13
20101222	MER	2	2	4	5	3	8	12
20101226	DOM	2	1	3		3	3	6
Totale complessivo		71	56	127	165	171	336	463

Legenda: F=femmine; M=maschi

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	20
BIBIANA	7
BOBBIO PELLICE	26
BRICHERASIO	19
CANTALUPA	28
FROSSASCO	4
INVERSO PINASCA	7
LUSERNA S. GIOVANNI	4
PEROSA ARGENTINA	31
PERRERO	32
PINASCA	58
PINEROLO	4
POMARETTO	9
PORTE	9
PRAMOLLO	20
PRAROSTINO	5
ROLETTO	3
RORA'	7
ROURE	66
S. GERMANO CHISONE	20
S. PIETRO VAL LEMINA	17
SALZA DI PINEROLO	2
TORRE PELLICE	20
VILLAR PELLICE	24
VILLAR PEROSA	21
Totale complessivo	463

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'




L'età è espressa in mesi.


TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE CACCIATA NEGLI ANNI



LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE



**RISULTATI
CACCIA ALLE SPECIE DELLA
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2010/2011
(DD.G.R. n. 126-9450 del 1.8.2008 e n. 67-702 del 27.9.2010)

SPECIE	SETTORE	CAPI PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	8	3 ottobre 2010 3 novembre 2010	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	14		
COTURNICE	VAL PELLICE	9		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	6*		
PERNICE BIANCA	VAL PELLICE CHISONE E GERM.	11		
LEPRE VARIABILE	VAL PELLICE CHISONE E GERM.	5		

Note: è vietata la caccia alla coturnice nel comune di Prigelato.

Il Comitato di gestione del CA, in base alla verifica dei capi abbattuti al termine della quinta giornata (17 ottobre 2010), su indicazione del Coordinatore faunistico regionale, deve immediatamente procedere alla chiusura dell'attività venatoria alle specie di cui sopra, nel caso in cui il numero di capi presentati sia inferiore o uguale al 50% del piano autorizzato. Nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato. Nel caso in cui si verificano una o più giornate con condizioni climatiche che impediscano l'uscita prima della data stabilita per la verifica, è data facoltà al coordinatore incaricato di valutare la possibilità di procrastinare il periodo utile.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Prigelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
FAGIANO DI MONTE	8	8	100%	14	12	86%	22	20	91%
PERNICE BIANCA							11	11	100%
COTURNICE	9	10	111%	6	4	67%	15	14	93%
LEPRE VARIABILE							5	1	20%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	AB_SPECIE	SESSO	AD	JUV	IND	Totale	
Val Pellice	FAGIANO DI MONTE	M	4	4		8	
	COTURNICE	M	6			6	
		F					
		IND			3	1	4
	TOT		6	3	1	10	
Valli Chisone e Germanasca	FAGIANO DI MONTE	M	6	6		12	
	COTURNICE	M	1			1	
		F	1				1
		IND			2		2
	TOT		2	2		4	
Totale CATO1	FAGIANO DI MONTE	M	10	10		20	
	COTURNICE	M	7			7	
		F	1				1
		IND			5	1	6
		TOT		8	5	1	14
	PERNICE BIANCA	M	7	1		8	
		F	2	1		3	
		TOT	9	2		11	
	LEPRE VARIABILE	M			1		1
		F					
TOT				1		1	

Legenda:

M = maschio

F = femmina

IND = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno

CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER
COMPLETAMENTO DEL PIANO





Specie	Distretto	Data completamento piano
Pernice bianca	Tutto il CA	10-ott
Lepre variabile	Tutto il CA *	20-ott
Fagiano di monte	Val Pellice	24-ott
Coturnice	Val Pellice	24-ott

* secondo le disposizioni regionali





DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Pernice bianca	Coturnice	Lapre variabile	Totale
ANGROGNA	2		4		6
BOBBIO PELLICE	2		3		5
MASSELLO			1		1
PERRERO	3				3
PINASCA			2		2
PRAGELATO	2	5			7
PRALI	7	6		1	14
PRAMOLLO			1		1
RORA'	1				1
TORRE PELLICE			1		1
VILLAR PELLICE	3		2		5
Totale complessivo	20	11	14	1	46

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA




CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			PERNICE BIANCA	LEPRE VARIABLE	Totale CA
		VC	VP	Totale	VC	VP	Totale			
20101003	DOM	3	2	5	1	1	2	3		10
20101006	MER							3	1	4
20101010	DOM	3		3		1	1	5		9
20101013	MER	2		2	1	1	2			4
20101017	DOM	2	1	3		2	2			5
20101020	MER		4	4		2	2			6
20101024	DOM	1	1	2		3	3			5
20101027	MER	1		1						1
20101031	DOM									
20101103	MER				2		2			2
Totale complessivo		12	8	20	4	10	14	11	1	46

VP = Distretto Val Pellice





VC = Distretto Val Chisone e Germanasca




= caccia chiusa per completamento del piano

= caccia chiusa per disposizioni regionali

TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI FAGIANO DI MONTE, PERNICE BIANCA, COTURNICE E LEPRE VARIABILE



Note: ● fagiano di monte; ● pernice bianca; ● coturnice; ● lepre variabile

**RISULTATI
CACCIÀ ALLA VOLPE**

PIANO DI PRELIEVO E CALENDARIO 2010/2011

DISTRETTO	PIANO COMPLESSIVO (NUMERO CAPI)	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	200	26 settembre 2010 26 dicembre 2010	MERCOLEDI' DOMENICA

RISULTATI PRELIEVO VOLPE

Valle	classe	F	M	TOT
Val Pellice	AD	3	2	5
	JUV		1	1
	TOT	3	3	6
Valli Chisone, Germanasca e Pinerolese	AD	12	14	26
	JUV	8	10	18
	IND	1		1
	TOT	21	24	45
Totale CATO1	AD	15	16	31
	JUV	8	11	19
	IND	1		1
	TOT	24	27	51


Legenda:

F= femmina; M = maschio


JUV = giovane dell'anno; AD = adulto di 1 o più anni

IND = animale di sesso e/o età indeterminata

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DELLA VOLPE



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI VOLPE



CASI DI ROGNA

Anno	N. casi	Capi visitati	%
2001	17	101	16,8
2002	8	79	10,1
2003	2	101	2,0
2004	5	100	5,0
2005	5	78	6,4
2006	5	71	7,0
2007	2	94	2,1
2008	5	63	7,9
2009	3	37	8,1
2010	1	51	2,0

CALENDARIO PRELIEVO VOLPE

Data	Giorno	VAL CHISONE, GERM. E PIN.			VAL PELLICE			TOTALE
		M	F	TOT	M	F	TOT	CATO1
20100926	DOM	1	4	5				5
20100929	MER	1		1				1
20101003	DOM		1	1				1
20101006	MER							
20101010	DOM		1	1				1
20101013	MER	3		3				3
20101017	DOM	2	1	3				3
20101020	MER	1	1	2				2
20101024	DOM	5	4	9				9
20101027	MER							
20101031	DOM	1	1	2	1		1	3
20101103	MER							
20101107	DOM		1	1		1	1	2
20101110	MER							
20101114	DOM				1	1	2	2
20101117	MER	1	2	3				3
20101121	DOM							
20101124	MER							
20101128	DOM	1		1				1
20101201	MER							
20101205	DOM	3	1	4	1		1	5
20101208	MER		1	1				1
20101212	DOM		1	1				1
20101215	MER		2	2		1	1	3
20101219	DOM	3		3				3
20101222	MER	1		1				1
20101226	DOM	1		1				1
Totale complessivo		24	21	45	3	3	6	51

M = maschio; F = femmina

DISTRIBUZIONE PRELIEVI DI VOLPE NEI COMUNI

COMUNE	N. VOLPI
ANGROGNA	3
CANTALUPA	1
FROSSASCO	1
INVERSO PINASCA	4
LUSERNETTA	1
PEROSA ARGENTINA	5
PERRERO	5
PINASCA	2
PINEROLO	1
POMARETTO	2
PORTE	1
PRAGELATO	1
PRAROSTINO	1
ROURE	6
S. GERMANO CHISONE	5
S. PIETRO VAL LEMINA	5
SALZA DI PINEROLO	1
VILLAR PELLICE	2
VILLAR PEROSA	4
Totale complessivo	51

CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2010/2011

Numero giornate per tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	MUFLONE	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA	VOLPE
Meteo							
sereno	12	12	13	12	10	5	10
variabile	1	1	2	1	3	2	3
nuvoloso	5	5	1	5	8	1	8
pioggia/neve			2		6	2	6
TOTALE	18	18	18	18	27	10	27

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia, su pendici esposte a S:

