



**Comprensorio Alpino TO1  
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

**Stagione venatoria 2016/2017**

**RISULTATI E STATISTICHE  
PRELIEVI  
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI  
CINGHIALE  
TIPICA FAUNA ALPINA**

**A cura di  
Marco Giovo,  
Responsabile tecnico CATO1**

**Bricherasio, 20 gennaio 2017**

**RISULTATI  
CACCIA DI SELEZIONE  
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	SETTORI	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	UNICO	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	A, B, C, D	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
		BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

**CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI**  
 DD.G.R. n. 21-3140 del 11.4.2016 e n. 33-3694 del 25.7.2016 e 97-3835 del 4.8.2016

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	21 (7) 21 28	70	Maschi ad. 1 settembre 2016 12 novembre 2016	GIOVEDI' SABATO
	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	0 0 0	0		
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	19 (6) 20 26	65	Femmine ad. e Giovani 15 settembre 2016 15 dicembre 2016	
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	15 (5) 15 20	50		
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 5 13 3 11	36	15 ottobre 2016 22 dicembre 2016	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	3 3 11 3 10	30	15 ottobre 2016 22 dicembre 2016	GIOVEDI' SABATO
		VAL GERMANASCA	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	2 2 5 1 4	14		
		BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	1 1 4 1 3	10		
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling maschi Agnelli	2 3 1 2	8	15 settembre 2016 19 novembre 2016	GIOVEDI' SABATO
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	25 25 31 2	83	15 settembre 2016 19 novembre 2016	GIOVEDI' SABATO
	VAL CHISONE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	13 13 15 1	42		
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	22 23 28 2	75		

Note: nel piano dei Cervi maschi adulti è non è più previsto un tetto massimo di cervi maschi adulti coronati; i cervi maschi adulti coronati del distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca sono 2 complessivi e non suddivisi per settore (\*). Nel piano dei caprioli è indicato la quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno).

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI**

### *2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni*

2.3.1 Entro il mese di giugno 2016 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 8.7.2016 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2016/2017 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, mufone maschio adulto, mufone yearling maschio, capriolo maschio adulto, cervo daguet, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo giovane, mufone femmina adulta o mufone agnello, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesto di dare la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti degli Ungulati, di cui uno della specie che verrà richiesta per il prelievo. A costoro viene riconosciuto un punteggio sia in sede di assegnazione del distretto che in sede di assegnazione della classe richiesta, come previsto ai punti successivi. I punti si maturano con l'offerta di disponibilità, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a partecipare ai censimenti indicati. In caso di chiamata e di mancata conferma della disponibilità offerta, anche solo ad uno dei due censimenti, verranno persi tutti i punti. E' però ammesso, in questo caso, offrire una disponibilità alternativa.

2.3.3 In caso di richieste per una specie in un distretto in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4a. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Agli esclusi da un distretto verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.4 L'assegnazione dei capi maschi adulti viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi assegnabili per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4b. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Per tutte le altre classi non accorpate (camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, cervo daguet, mufone yearling maschio), l'assegnazione si effettuerà secondo l'ordine di cui alla tabella 4c. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

A chi non ottiene il capo richiesto sarà comunque assegnato un capo della stessa specie nel distretto assegnato inizialmente, in base alla disponibilità residua dopo le assegnazioni delle altre classi. Nell'assegnazione della classe in sostituzione del maschio adulto si terrà conto del punteggio di priorità acquisito. Ai primi esclusi verrà assegnata una femmina adulta (se disponibile), quindi uno yearling (se disponibile), quindi un giovane.

L'assegnazione dei capi secondo i criteri sopra indicati verrà effettuata d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

Per le classi accorpate (capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane), in caso di richieste superiori al numero di autorizzazioni disponibili per un distretto, si procederà sempre seguendo i criteri di priorità di cui alla tabella 4b; agli esclusi verrà assegnata un altro capo della stessa specie sempre nel medesimo distretto.

In caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto, eventuali variazioni potranno essere valutate tenendo conto delle disponibilità residue dopo tutte le assegnazioni.

Per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale (ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente), in sede di calcolo dei punteggi per le priorità, non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2016/2017, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, uno yearling maschio di muflone o di cervo o di capriolo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2016/2017 il Comitato di Gestione ha previsto un carniere stagionale individuale fino a cinque capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nei sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 90% o per completamente del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, cervo daguet, muflone maschio adulto, muflone yearling, capriolo maschio adulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituita la

differenza fra la quota versata e il minimo per quella specie. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi, verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della quart'ultima giornata.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 90% o per completamento del piano per entrambe le classi, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituita la quota versata, corrispondente al minimo per quella specie, ma solo in caso di interruzione del prelievo prima della quart'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione.

I sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 90% sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito internet e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In questo manifesto sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto 2-5 anni non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Non è previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso. L'abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo o cervo con il latte fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti o adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Anche per la stagione venatoria 2016/2017 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sfioramento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso.

2.3.13 Per il Cervo, per il distretto di Pragelato, verrà eseguita una rotazione dei cacciatori autorizzati sul territorio del distretto, che viene suddiviso in 4 settori omogenei dai confini naturali facilmente individuabili e riportati su una cartina che verrà distribuita ai cacciatori autorizzati alla caccia in quel distretto. Il numero di autorizzazioni rilasciabili, in funzione del piano e con il tetto massimo di 1,3 volte il numero di capi prelevabili, sarà definito come multiplo esatto di 4. Per ogni autorizzazione (rilasciata e non) verrà assegnato, per ogni giornata di caccia, un settore diverso, con rotazione secondo un calendario prestabilito a inizio stagione per ogni autorizzazione e che verrà consegnato ai soci. Si cercherà di garantire la possibilità di cacciare insieme nello stesso settore ai cacciatori che ne faranno richiesta. Il fine di questa regolamentazione è quello di evitare concentrazioni di cacciatori in poche zone, con disturbo eccessivo per gli animali che conseguentemente si spostano fuori distretto verso zone a minor disturbo (Azienda Albergian, Parco Alpi Cozie). L'obiettivo è diminuire il disturbo per gli animali e favorirne il prelievo, oltre a ridurre il disturbo reciproco dei cacciatori durante l'azione di caccia. Per la stagione venatoria 2016/2017, solamente per il distretto di Pragelato, è ammessa la caccia al Cervo anche nella giornata del Lunedì, in

modo da garantire una turnazione più rapida dei soci sui 4 settori. Per parità di condizione con gli altri distretti, in ogni caso è ammesso cacciare il Cervo a Prigelato solamente due giornate alla settimana, a scelta fra le tre così consentite (lunedì, giovedì e sabato). Nella giornata del lunedì, inoltre, chi caccia il Cervo a Prigelato non potrà esercitare nessun'altra forma di caccia (cinghiale, migratoria) sul territorio di questo distretto.

**Tabella 4a – Ordine di assegnazione del distretto**

Criterio di priorità	Punti
Residenza in uno dei Comuni componenti il distretto o il settore	20
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al distretto o al settore	10
Residenza fuori Regione Piemonte	5
Non aver ottenuto il distretto o il settore richiesto per la stessa specie nello stesso distretto nella stagione 2015/2016	20
Aver dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2016	10
Essere ammesso al CATO1 in forma esclusiva	5

**Tabella 4b – Ordine di assegnazione del maschio**

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2015/2016	20
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2015/2016	5
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2014/2015	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2015/2016	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2016	5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2015/2016	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2015/2016	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2015/2016	-10

**Tabella 4c – Ordine di assegnazione del altre classi**

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2015/2016	20
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2015/2016	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2016	5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2015/2016	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2015/2016	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2015/2016	-10



## ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	83	107	98	9	107
	Val Chisone	42	54	54	0	54
	Val Germanasca	75	98	98	0	98
	<b>TOTALE</b>	<b>200</b>	<b>259</b>	<b>250</b>	<b>9</b>	<b>259</b>
Capriolo	Val Pellice	70	91	60	30	90
	Bassa val Chisone	65	85	80	5	85
	Val Germanasca	50	65	31	34	65
	<b>TOTALE</b>	<b>185</b>	<b>241</b>	<b>171</b>	<b>69</b>	<b>240</b>
Cervo	Pragelato	36	47	29	15	44
	Bassa val Chisone1	30	39	27	10	37
	Bassa val Chisone2	10	13	13	0	13
	Val Germanasca	14	18	14	1	15
	<b>TOTALE</b>	<b>90</b>	<b>117</b>	<b>83</b>	<b>26</b>	<b>109</b>
Mufone	Val Pellice	8	10	8	2	10

## DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autoriz.		2° autoriz.		3° autoriz.		4° autoriz.	
		Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb
Camoscio	Val Pellice	98	61	7	2	2	1		
	Val Chisone	54	35						
	Val Germanasca	98	60						
Capriolo	Val Pellice	60	31	21	13	7	4	2	
	Bassa Val Chisone	80	39	5	2				
	Val Germanasca	31	18	26	12	6	3	2	1
Cervo	Pragelato	29	14	14	1	1			
	Bassa Val Chisone1	27	17	10	3				
	Bassa Val Chisone2	13	7						
	Val Germanasca	14	5	1					
Mufone	Val Pellice	8	2	2					
<b>Totale complessivo</b>		<b>512</b>	<b>289</b>	<b>86</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Aut = autorizzazioni rilasciate; Abb = capi abbattuti

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: -

CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO 15.9-19.11	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	25	26	112%	22	21	100%	13	13	100%	60	60	105%
FEMMINE AD.	25	19	84%	23	21	100%	13	12	92%	61	52	92%
YEARLING	31	13 (8;5)	42%	28	14 (5;9)	50%	15	10 (6;4)	67%	74	37 (19;18)	50%
CAPRETTI	2	2 (0;2)	100%	2	1 (1;0)	50%	1		0%	5	3 (1;2)	60%
<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>64</b>	<b>77%</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>80%</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>83%</b>	<b>200</b>	<b>159</b>	<b>80%</b>
Di cui tiri non conf.		3			1			1			5	
Di cui sanitari		4			3						7	

CAPRIOLO MA: 1.9-12.11 FA/GIO: 15.9-15.12	Val Pellice			Pragelato			Bassa Val Chisone e Pin.			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	21	18	90%	0			19	13	74%	15	14	93%	55	45	85%
FEMMINE AD.	21	20	95%	0			20	19	100%	15	14	93%	56	53	96%
GIOVANI	28	9 (5;4)	32%	0			26	7 (2;5)	27%	20	6 (4;2)	30%	74	22 (11;11)	30%
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	<b>69%</b>	<b>0</b>			<b>65</b>	<b>41</b>	<b>63%</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>68%</b>	<b>185</b>	<b>123</b>	<b>66%</b>
Di cui tiri non conf.											1			1	
Di cui sanitari		1						2						3	

CERVO 15.10-22-12	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	4	6	175%	3	1	33%	1		0%	2	2	100%	10	9	100%
MASCHI SUBAD.	5	5	100%	3		0%	1	2	200%	2	2	100%	11	9	82%
FEMMINE AD.	13	3	23%	11	11	100%	4	3	75%	5		0%	33	17	52%
DAGUET	3		0%	3		0%	1	1	100%	1	1	100%	8	2	25%
GIOVANI	11		0%	10	8 (6;2)	80%	3	1 (1;0)	33%	4		0%	28	9 (7;2)	32%
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>42%</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>67%</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>70%</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>36%</b>	<b>90</b>	<b>47</b>	<b>52%</b>
Di cui tiri non conf.		2						2						4	
Di cui sanitari		1												1	

MUFLONE 15.9-19.11	Val Pellice		
	PRE	REA	%
MASCHI AD.	2	2	100%
FEMMINE AD.	3		0%
FUSONI	1		0%
AGNELLI	2		0%
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>25%</b>
Di cui tiri non conf.			
Di cui sanitari			

Legenda  
PRE=Piano Previsto  
REA=Piano Realizzato

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	25	26	2	112%	22	21	1	100%	13	13		100%	60	60	3	105%
FEMMINE AD.	25	19	2	84%	23	21	2	100%	13	12		92%	61	52	4	92%
YEARLING	31	13		42%	28	14		50%	15	10		67%	74	37	0	50%
CAPRETTI	2	2		100%	2	1		50%	1			0%	5	3	0	60%
<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>64</b>		<b>77%</b>	<b>75</b>	<b>60</b>		<b>80%</b>	<b>42</b>	<b>35</b>		<b>83%</b>	<b>200</b>	<b>159</b>		<b>80%</b>

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone e Pin.				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	21	18	1	90%	0				19	13	1	74%	15	14		93%	55	45	2	85%
FEMMINE AD.	21	20		95%	0				20	19	1	100%	15	14		93%	56	53	1	96%
GIOVANI	28	9		32%	0				26	7		27%	20	6		30%	74	22	0	30%
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>48</b>		<b>69%</b>	<b>0</b>				<b>65</b>	<b>41</b>		<b>63%</b>	<b>50</b>	<b>34</b>		<b>68%</b>	<b>185</b>	<b>123</b>		<b>66%</b>

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	4	6	1	175%	3	1		33%	1			0%	2	2		100%	10	9	1	100%
MASCHI SUBAD.	5	5		100%	3			0%	1	2		200%	2	2		100%	11	9	0	82%
FEMMINE AD.	13	3		23%	11	11		100%	4	3		75%	5			0%	33	17	0	52%
DAGUET	3			0%	3			0%	1	1		100%	1	1		100%	8	2	0	25%
GIOVANI	11			0%	10	8		80%	3	1		33%	4			0%	28	9	0	32%
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>15</b>		<b>42%</b>	<b>30</b>	<b>20</b>		<b>67%</b>	<b>10</b>	<b>7</b>		<b>70%</b>	<b>14</b>	<b>5</b>		<b>36%</b>	<b>90</b>	<b>47</b>		<b>52%</b>

MUFLONE	Val Pellice			
	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	2	2		100%
FEMMINE AD.	3			0%
FUSONI	1			0%
AGNELLI	2			0%
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>25%</b>

Legenda:

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI RISPETTO AL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

CAMOSCIO	Val Pellice					Val Germanasca					Val Chisone					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	25	32	26	81%	112%	22	29	21	72%	100%	13	17	13	76%	100%	<b>60</b>	<b>78</b>	<b>60</b>	<b>77%</b>	<b>105%</b>
FEMMINE AD.	25	32	19	59%	84%	23	30	21	70%	100%	13	17	12	71%	92%	<b>61</b>	<b>79</b>	<b>52</b>	<b>66%</b>	<b>92%</b>
YEARLING	31	40	13	33%	42%	28	36	14	39%	50%	15	19	10	53%	67%	<b>74</b>	<b>95</b>	<b>37</b>	<b>39%</b>	<b>50%</b>
CAPRETTI	2	3	2	67%	100%	2	3	1	33%	50%	1	1		0%	0%	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>43%</b>	<b>60%</b>
<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>60%</b>	<b>77%</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>60</b>	<b>61%</b>	<b>80%</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>65%</b>	<b>83%</b>	<b>200</b>	<b>259</b>	<b>159</b>	<b>61%</b>	<b>80%</b>

CAPRIOLO	Val Pellice					Pragelato					Resto Chisone					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	21	26	18	69%	90%	0					19	25	13	52%	74%	15	19	14	74%	93%	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>64%</b>	<b>85%</b>
FEMMINE AD.	21		20		95%	0					20		19		100%	15		14		93%	<b>56</b>		<b>53</b>		<b>96%</b>
GIOVANI	28	64	9	45%	32%	0					26	60	7	43%	27%	20	46	6	43%	30%	<b>74</b>	<b>170</b>	<b>22</b>	<b>44%</b>	<b>30%</b>
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>48</b>	<b>53%</b>	<b>69%</b>	<b>0</b>					<b>65</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>48%</b>	<b>63%</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>52%</b>	<b>68%</b>	<b>185</b>	<b>240</b>	<b>123</b>	<b>51%</b>	<b>66%</b>

CERVO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	4		6		175%	3		1		33%	1				0%	2	5	2	80%	100%	<b>10</b>		<b>9</b>		<b>100%</b>
MASCHI SUBAD.	5	12	5	92%	100%	3	6	1	17%	0%	1	3	2	67%	200%	2	5	2	80%	100%	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>69%</b>	<b>82%</b>
DAGUET	3	1		0%	0%	3	4		0%	0%	1	1	1	100%	100%	1	1	1	100%	100%	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>29%</b>	<b>25%</b>
FEMMINE AD.	13		3	10%	23%	11		11		100%	4		3		75%	5				0%	<b>33</b>		<b>27</b>		<b>52%</b>
GIOVANI	11	31		0%	0%	10	27	8	70%	80%	3	9	1	44%	33%	4	9		0%	0%	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>9</b>	<b>47%</b>	<b>32%</b>
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>34%</b>	<b>42%</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>54%</b>	<b>67%</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>54%</b>	<b>70%</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>33%</b>	<b>36%</b>	<b>90</b>	<b>109</b>	<b>47</b>	<b>43%</b>	<b>52%</b>





MUFLONE	Val Pellice				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	2	3	2	67%	100%
FUSONI	1	1		0%	0%
FEMMINE AD.	3	6		0%	0%
AGNELLI	2				0%
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>

PRE= Piano previsto  
 REA= Piano realizzato  
 ASS= capi assegnati






CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%

<b>Specie</b>	<b>Classe</b>	<b>Distretto/Settore</b>	<b>Data raggiungimento soglia 90%</b>	<b>Data completamento piano</b>
Camoscio	MA	Val Chisone		08/10/2016
Capriolo	FA	Val Pellice	20/10/2016	
Cervo	DAG	Val Germanasca		20/10/2016
Capriolo	MA sottoclasse II-III	Bassa Val Chisone e Pinerolese		22/10/2016
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone 2		22/10/2016
Cervo	MA subadulto	Bassa Val Chisone 2		31/10/2016
Camoscio	MA	Val Pellice		10/11/2016
Capriolo	MA	Val Germanasca	10/11/2016	
Camoscio	MA	Val Germanasca	12/11/2016	
Cervo	MA adulto	Val Germanasca		12/11/2016
Camoscio	CAP	Val Pellice		17/11/2016
Cervo	MA adulto	Pragelato		19/11/2016
Capriolo	FA	Bassa Val Chisone e Pinerolese	09/12/2016	
Capriolo	FA	Val Germanasca	10/12/2016	






## CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



# CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




# CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO





MUFLONE: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



**CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI**

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2012/13	Val Pellice	89%	1,00	0,68	39,8%	31,1%	7,3	8,5
	Val Chisone	68%	1,00	1,04	40%	36,2%	6,0	5,7
	Val Germanasca	94%	1,00	0,79	40,3%	19,2%	6,2	7,1
	Totale	82%	1,00	0,80	40%	28,9%	6,6	7,3
2013/14	Val Pellice	83%	1,00	0,97	39,8%	29,9%	6,8	6,9
	Val Chisone	83%	1,00	0,76	38,1%	34,3%	5,8	4,0
	Val Germanasca	64%	1,00	1,06	40%	17,2%	5,5	8,5
	Totale	76%	1,00	0,91	39,6%	26,5%	6,1	7,0
2014/15	Val Pellice	76%	1,00	0,74	40,0%	27,9%	6,0	6,7
	Val Chisone	90%	1,00	0,80	40,0%	27,7%	5,8	6,2
	Val Germanasca	76%	1,00	1,03	41,1%	26,2%	5,0	7,8
	Totale	79%	1,00	0,86	40,5%	27,2%	5,6	7,1
2015/16	Val Pellice	86%	1,03	1,00	40,0%	25,0%	5,7	8,1
	Val Chisone	98%	1,04	0,96	39,6%	34,0%	5,5	5,4
	Val Germanasca	88%	1,00	0,87	40,7%	32,4%	6,4	8,6
	Totale	90%	1,02	0,93	40,2%	30,5%	5,9	7,6
2016/17	Val Pellice	76%	1,00	0,77	39,8%	23,4%	7,5	8,3
	Val Chisone	80%	1,02	1,14	38,1%	28,6%	5,5	6,8
	Val Germanasca	83%	1,00	0,84	40,0%	25,0%	5,7	10,6
	Totale	79%	1,02	0,92	39,5%	25,2%	6,5	8,9

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

**CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI**

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2012/13	Pragelato	43%	1,16	1,83	32,5%	11,8%	4,5	4,7
	Bassa Val Chisone 1	77%	1,14	1,55	33,3%	17,4%	4,8	4,2
	Bassa Val Chisone 2	80%	1,22	1,67	30,0%	37,5%	8,0	3,7
	Val Germanasca	60%	1,22	2,00	30,0%	33,3%		2,3
	Totale	54%	1,17	1,56	32,2%	20,4%	5,3	4,1
2013/14	Pragelato	33%	1,16	1,16	32,5%	23,1%	5,0	3,0
	Bassa Val Chisone 1	83%	1,14	1,27	33,3%	24,0%	3,7	4,6
	Bassa Val Chisone 2	81%	1,13	3,33	31,2%	12,5%	4,0	3,6
	Val Germanasca	50%	1,22	4,00	30,0%	20,0%		4,3
	Totale	58%	1,16	1,54	32,3%	21,4%	4,2	4,0
2014/15	Pragelato	32%	1,17	1,00	32,0%	25,0%	4,3	4,2
	Bassa Val Chisone 1	54%	1,00	2,50	30,8%	21,4%	3,0	6,3
	Bassa Val Chisone 2	42%	1,40	0,67	33,3%	20,0%	4,0	3,5
	Val Germanasca	25%	1,40	0,50	33,3%	0,0%	2,0	2,0
	Totale	38%	1,17	1,24	32,0%	21,1%	3,7	4,9
2015/16	Pragelato	28%	1,06	0,43	27,8%	20,0%	5,8	6,5
	Bassa Val Chisone 1	88%	1,13	1,00	31,2%	21,4%	4,3	5,3
	Bassa Val Chisone 2	92%	1,00	0,57	33,3%	36,4%	4,0	3,3
	Val Germanasca	42%	0,85	0,25	25,0%	20,0%	5,7	1,0
	Totale	59%	1,04	0,69	30,4%	24,1%	4,8	4,7
2016/17	Pragelato	42%	1,06	0,25	30,6%	0,0%	5,7	7,3
	Bassa Val Chisone 1	67%	1,14	1,87	33,3%	40,0%	6	4,0
	Bassa Val Chisone 2	70%	1,22	0,43	30,0%	14,3%	2,5	6,0
	Val Germanasca	36%	1,00	N.D.	28,6%	0,0%	4,5	
	Totale	52%	1,09	0,68	31,1%	19,1%	5,1	4,9

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0. Le femmine di 1 anno sono comprese nelle FA.

MUFLONE: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2012/13	54%	1,00	0,75	38,5%	57,1%	3,0	3,0
2013/14	38%	1,00	1,50	38,5%	20,0%	4,5	4,7
2014/15	70%	1,00	0,75	40,0%	14,2%	3,5	1,7
2015/16	70%	1,00	0,75	40,0%	28,6%	5,0	4,0
2016/17	25%	1,00	N.R.	50,0%	0,0%	5,0	N.R.





Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani. Età delle femmine non sempre determinabile.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2012/13	Val Pellice	71%	1,00	1,1	39,4%	23,6%	4,1	3,0
	Pragelato	67%	1,00	1,3	40,7%	16,6%	3,3	2,6
	Bassa Val Chisone	66%	1,00	1,5	39,0%	21,7%	3,1	3,2
	Val Germanasca	51%	1,00	1,6	39,7%	8,1%	3,1	4,3
	Totale CATO1	65%	1,00	1,3	39,4%	20,1%	3,6	3,3
2013/14	Val Pellice	72%	1,00	1,2	40,0%	25,9%	3,6	3,6
	Pragelato	47%	1,00	0,8	40,0%	14,3%	2,6	2,8
	Bassa Val Chisone	72%	1,00	1,2	40,0%	22,5%	3,8	3,8
	Val Germanasca	60%	1,00	1,2	40,0%	11,1%	3,5	4,0
	Totale CATO1	67%	1,00	1,2	40,0%	21,1%	3,6	3,7
2014/15	Val Pellice	81%	1,02	0,9	40,0%	32,3%	2,9	3,0
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	60%	1,02	1,3	40,0%	11,1%	3,6	2,9
	Val Germanasca	59%	1,00	1,3	40,0%	14,6%	3,8	2,5
	Totale CATO1	68%	1,01	1,1	40,0%	21,8%	3,3	2,8
2015/16	Val Pellice	72%	1,02	1,3	40,0%	24,3%	4,0	3,8
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	50%	1,02	1,1	40,0%	11,5%	4,0	3,4
	Val Germanasca	58%	1,04	1,1	40,0%	12,5%	2,8	3,1
	Totale CATO1	60%	1,02	1,2	40,0%	17,5%	3,7	3,5
2016/17	Val Pellice	69%	1,00	1,0	40,0%	18,8%	2,7	2,9
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	63%	1,03	1,6	40,0%	17,1%	3,6	4,0
	Val Germanasca	68%	1,00	0,9	40,0%	17,6%	3,0	2,7
	Totale CATO1	66%	1,02	1,1	40,0%	17,9%	3,0	3,3

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI







Legenda: MM=maschi; FF=femmine

# CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Val Pellice				TOT	Val Chisone				TOT	Val Germanasca				TOT	Totale CATO1
		MA	FA	GIO	TOT		MA	FA	GIO	TOT		MA	FA	GIO	TOT		
20160901	GIO	3			3	1			1	1	1			1	5		
20160903	SAB	1			1	4			4	2				2	7		
20160908	GIO	3			3	3			3					3	6		
20160910	SAB	4			4					1				1	5		
20160915	GIO	2	4		6		2	2	4	1	1			2	12		
20160917	SAB	3	3		6		6	1	7	2	1			3	16		
20160922	GIO	2	2		4	3	1		4	1	2			3	11		
20160924	SAB	1	1	1	3	1	1		2					2	5		
20160929	GIO		1		1		2		2			1		1	4		
20161001	SAB		1	1	2	1			1	2		3		5	8		
20161006	GIO		1		1		1		1		1			1	3		
20161008	SAB		2		2										2		
20161013	GIO																
20161015	SAB		2	1	3		1		1		1	1	2	6			
20161020	GIO		3	1	4					1			1	5			
20161022	SAB					1		1	2	1			1	3			
20161027	GIO																
20161029	SAB						1		1	1		1	2	3			
20161103	GIO							1	1				1	1			
20161105	SAB										1		1	1			
20161110	GIO									1	1		2	2			
20161112	SAB						2	1	3		1		1	4			
20161117	GIO										1		1	1			
20161119	SAB			1	1									1			
20161124	GIO																
20161126	SAB							1	1					1			
20161201	GIO			1	1		1		1		1		1	3			
20161203	SAB										1		1	1			
20161208	GIO			1	1		1		1		1		1	3			
20161210	SAB			2	2		1		1		1		1	4			
20161215	GIO																
Totale complessivo		24	29	17	70	21	25	6	52	12	16	4	32	154			

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

GIO = giovane  
TOT = totale distretto



-  = superamento del 90% del piano
-  = piano completato
-  = raggiungimento soglia sottoclasse II-III
-  = caccia chiusa

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Pellice				TOT	Val Chisone				TOT	Val Germanasca				TOT	Totale CATO1
		MA	FA	BIN	GIO		MA	FA	BIN	GIO		MA	FA	BIN	GIO		
20160915	GIO	2	2			4	1	1	1		3	1				1	8
20160917	SAB	3	2	2		7	6	3	3		12	1		3		4	23
20160922	GIO	2			1	3		1			1		1	2		3	7
20160924	SAB			1		1	1	2			3	2				2	6
20160929	GIO		1			1	2				2		1			1	4
20161001	SAB	1	2	1		4			1		1	1	1			2	7
20161006	GIO							1			1						1
20161008	SAB	1	1	1		3	3				3	3	4			7	13
20161013	GIO																
20161015	SAB	1		1		2								1		1	3
20161020	GIO	3	1	1		5						2				2	7
20161022	SAB	2	1			3		1			1	1	2	1		4	8
20161027	GIO		1			1		1			1		1	1		2	4
20161029	SAB	4	1	1		6		1			1	2	2		1	5	12
20161103	GIO	3				3						2	1	1		4	7
20161105	SAB	1				1								1		1	2
20161110	GIO	4	3	4		11						2	2	1		5	16
20161112	SAB			1		1			2		2	5	4			9	12
20161117	GIO		4		1	5			2		2		1	1		2	9
20161119	SAB	1	2			3		1	1		2		3	2		5	10
Totale complessivo		28	21	13	2	64	13	12	10		35	22	23	14	1	60	159

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

BIN = yearling  
GIO = giovane



 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato

## CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO

DATA	GIORNO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CATO1						
		GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS		MA	TOT				
20161015	SAB			1	2		3	2		1		3			1				1	1	8			
20161017	LUN																							
20161020	GIO							1				1								1	2			
20161022	SAB																				2			
20161024	LUN						1														1			
20161027	GIO							1		1		2									3			
20161029	SAB																				1			
20161031	LUN																							
20161103	GIO																							
20161105	SAB																				1			
20161107	LUN																							
20161110	GIO						1			1		1									2			
20161112	SAB							1		3		4									5			
20161114	LUN																							
20161117	GIO																				2			
20161119	SAB			1			2	3		1		2									5			
20161121	LUN																							
20161124	GIO																							
20161126	SAB				1		1														2			
20161128	LUN																							
20161201	GIO				1		1			1		1									2			
20161203	SAB						1			1		2									3			
20161205	LUN																							
20161208	GIO																							
20161210	SAB						1														1			
20161212	LUN																							
20161215	GIO			1			1														1			
20161217	SAB																							
20161219	LUN																							
20161222	GIO				1		1			2		3									6			
Totale complessivo				3	5	7	15	8		11	1	20	1	1	3	2			7	1	2	2	5	47



MA = maschio adulto  
MS = maschio subadulto  
FA = femmina adulta

DAG = daguet  
GIO = giovane  
TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato

# CALENDARIO ABBATTIMENTI MUFLONE

Data	Giorno	AGN	FUS	FA	MA	Totale
20160915	GIO					
20160917	SAB					
20160922	GIO					
20160924	SAB					
20160929	GIO					
20161001	SAB					
20161006	GIO					
20161008	SAB					
20161013	GIO					
20161015	SAB					
20161020	GIO					
20161022	SAB					
20161027	GIO					
20161029	SAB					
20161103	GIO					
20161105	SAB					
20161110	GIO				1	1
20161112	SAB					
20161117	GIO					
20161119	SAB				1	1
Totale					2	2

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato





Legenda:

MA = maschi adulto  
 FA = femmina adulta




FUS = yearling maschio  
 GIO = giovane







## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI







## CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



## CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



## CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2012	Giovane	1	3,0		1	2,0		1	13,0		3	6,0	6,1
	Yearling	22	3,7	3,1	16	2,5	1,5	9	3,4	3,4	47	3,3	2,7
	Femmina adulta	23	4,3	3,6	15	3,6	2,8	16	3,3	3,0	54	3,8	3,2
	Maschio adulto	28	3,8	2,8	15	2,7	1,3	26	3,0	2,2	69	3,2	2,3
	Totale	74	3,9	3,1	47	2,9	2,0	52	3,3	3,0	173	3,5	2,8
2013	Giovane	3	2,3	1,5	1	1,0	-				4	2,0	1,4
	Yearling	20	2,9	1,8	11	5,5	3,1	10	3,4	2,2	41	3,7	2,5
	Femmina adulta	27	3,4	3,0	10	3,6	3,3	22	2,6	1,7	59	3,1	2,6
	Maschio adulto	27	3,3	2,5	13	2,8	1,7	26	3,4	2,8	66	3,2	2,5
	Totale	77	3,2	2,5	35	3,8	2,9	58	3,1	2,3	170	3,3	2,5
2014	Giovane	2	5,0	5,7	1	1,0	-	2	5,0	2,8	5	4,2	3,6
	Yearling	15	3,4	2,3	9	4,3	2,5	15	4,7	3,1	39	4,1	2,7
	Femmina adulta	18	3,9	2,2	12	5,9	4,0	24	5,5	4,0	54	5,0	3,5
	Maschio adulto	26	3,6	2,9	14	4,1	1,6	24	3,3	2,2	64	3,6	2,4
	Totale	61	3,7	2,6	36	4,7	2,9	65	4,5	3,3	162	4,2	3,0
2015	Giovane	1	1,0	-	1	2,0	-	2	1,0	0,0	4	1,3	0,5
	Yearling	13	2,2	1,1	15	3,5	2,4	21	3,2	2,2	49	3,1	2,1
	Femmina adulta	21	3,2	2,9	16	4,1	3,0	25	4,0	3,2	62	3,7	3,0
	Maschio adulto	21	2,1	1,3	14	3,4	2,3	23	3,0	2,6	58	2,8	2,2
	Totale	56	2,5	2,1	46	3,6	2,5	71	3,4	2,7	173	3,2	2,5
2016	Giovane	2	4,5	3,5				1	1,0	N.D.	3	3,3	3,2
	Yearling	13	1,8	0,9	10	3,5	3,5	14	2,4	1,3	37	2,5	2,1
	Femmina adulta	21	3,0	2,1	12	4,6	4,0	23	4,0	2,9	56	3,8	2,9
	Maschio adulto	28	2,6	1,8	13	2,4	1,7	22	3,7	3,6	63	2,9	2,6
	Totale	64	2,7	1,8	35	3,5	3,2	60	3,5	2,9	159	3,1	2,6

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2012	Giovane	3	6,0	4,4	15	5,2	3,6	3	2,7	2,1	26	2,5	1,9	47	3,6	3,0
	Femmina adulta	8	1,4	0,7	31	2,5	1,5	21	2,5	2,2	45	2,8	2,0	105	2,5	1,9
	Maschio adulto	7	4,6	4,3	23	5,0	3,7	13	2,6	2,0	39	3,3	2,4	82	3,8	3,0
	Totale	18	3,4	3,6	69	3,9	3,1	37	2,6	2,1	110	2,9	2,1	234	3,2	2,6
2013	Giovane	2	1,5	0,7	28	3,8	3,3	20	5,1	3,9	6	5,8	4,2	56	4,4	3,6
	Femmina adulta	5	6,0	1,6	44	3,5	3,7	39	3,2	2,6	26	4,5	3,7	114	3,8	3,3
	Maschio adulto	7	3,3	2,5	35	4,3	4,1	32	5,5	4,3	22	2,9	2,2	96	4,3	3,8
	Totale	14	4,0	2,5	107	3,9	3,7	91	4,4	3,7	54	4,0	3,3	266	4,1	3,6
2014	Giovane				30	4,3	3,8	7	3,7	2,9	6	2,8	1,8	43	4,0	3,5
	Femmina adulta				34	2,7	2,0	30	2,7	1,6	20	5,0	3,2	84	3,2	2,4
	Maschio adulto				29	2,7	2,1	26	3,5	1,8	15	3,7	4,3	70	3,2	2,6
	Totale				93	3,2	2,8	63	3,1	1,9	41	4,2	3,5	197	3,4	2,8
2015	Giovane				17	3,9	3,0	6	3,7	2,1	4	7,0	2,8	27	4,3	2,9
	Femmina adulta				29	4,1	3,2	25	5,7	5,3	16	4,3	3,6	70	4,7	4,2
	Maschio adulto				24	3,0	2,6	21	5,5	3,0	12	3,2	2,6	57	4,0	2,9
	Totale				70	3,7	3,0	52	5,4	4,2	32	4,2	3,3	154	4,4	3,5
2016	Giovane				9	4,9	4,6	7	5,3	4,2	6	1,3	0,8	22	4,0	4,0
	Femmina adulta				20	2,9	2,0	20	4,5	4,2	14	6,0	6,4	54	4,3	4,4
	Maschio adulto				19	2,8	1,3	14	3,6	2,1	14	3,8	3,3	47	3,3	2,3
	Totale				48	3,2	2,5	41	4,3	3,6	34	4,3	4,8	123	3,9	3,6

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

MUFLONE: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	n	x	ds	Stagione	Classe	n	x	ds
2012	Agnello	1	1,0		2015	Agnello	2	2,0	1,4
	Yearling maschio	1	5,0			Yearling maschio			
	Femmina adulta	3	3,7	2,1		Femmina adulta			
	Maschio adulto	2	6,0	4,2		Maschio adulto	3	6,3	4,0
	Totale	7	4,1	2,7		Totale	5	3,0	2,8
2013	Agnello				2016	Agnello			
	Yearling maschio					Yearling maschio			
	Femmina adulta	3	5	1,7		Femmina adulta			
	Maschio adulto	2	3	2,8		Maschio adulto	2	6,5	6,3
Totale	5	4,2	2,2	Totale	2	6,5	6,3		
2014	Agnello								
	Yearling maschio								
	Femmina adulta	3	3,3	2,5					
	Maschio adulto	4	7,5	5,2					
Totale	7	5,7	4,5						

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Totale		
		N	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2012	Giovane	2	4,5	2,1	4	5,3	3,3	3	2,0	1,7	2	1,0	0,0	11	3,5	2,8
	Daguet	1	4,0	-	2	5,5	3,5				1	7,0	-	4	5,5	2,4
	Femmina adulta	10	2,7	1,3	12	4,4	3,3	3	4,7	3,5	3	2,3	1,5	28	3,6	2,6
	Miaschio subad.	2	3,0	1,4	2	4,0	4,2	1	13,0	-				5	5,4	4,8
	Maschio adulto	2	2,5	2,1	3	3,3	1,5	1	5,0	-				6	3,3	1,6
	Totale	17	3,0	1,5	23	4,5	3,0	8	4,8	4,2	6	2,7	2,4	54	3,9	2,8
2013	Giovane	3	2,0	1,0	6	7,3	4,3	2	9,5	3,5	1	9	-	12	6,5	4,2
	Daguet				2	2,5	0,7	1	7,0	-				3	4,0	2,6
	Femmina adulta	5	1,4	0,5	11	3,5	1,9	8	5,9	2,2	4	3,2	2,6	28	3,8	2,4
	Miaschio subad.	4	2,5	1,3	4	8	7	2	7	4,2				10	5,6	5,1
	Maschio adulto	1	5	N.D.	2	5,5	3,5							3	5,3	2,5
	Totale	13	2,2	1,3	25	5,2	4,1	13	6,7	2,7	5	4,4	3,4	56	4,8	3,5
2014	Giovane	4	3,8	2,1	3	5,3	3,5	1	3,0	-				8	4,3	2,5
	Daguet							1	1,0	-	1	14,0	-	2	7,5	9,2
	Femmina adulta	6	2,0	1,1	8	3,9	2,9	2	7,0	5,7	1	3,0	-	17	3,5	2,9
	Miaschio subad.	4	4,3	3,9	3	6,3	1,5	1	6,0	-	1	3,0	-	9	5,0	2,8
	Maschio adulto	2	2,0	1,4										2	2,0	1,4
	Totale	16	3,0	2,4	14	4,7	2,8	5	4,8	3,9	3	6,7	6,4	38	4,2	3,2
2015	Giovane	2	1,5	0,7	6	3,2	3,4	4	5,8	5,9	1	1,0	-	13	3,5	4,1
	Daguet	1	8,0	-	2	6,0	4,2							3	6,7	3,2
	Femmina adulta	2	2,5	0,7	12	3,3	2,5	4	5,0	2,4	1	1,0	-	19	3,5	2,4
	Miaschio subad.	3	4,3	2,5	6	4,2	3,4	2	4,0	4,2	2	8,0	9,9	13	4,8	4,2
	Maschio adulto	2	4,5	2,1	2	3,0	1,4	1	2,0	-	1	2,0	-	6	3,2	1,6
	Totale	10	3,8	2,4	28	3,6	2,9	11	4,8	3,9	5	4,0	6,2	54	3,9	3,3
2016	Giovane				8	4,8	3,8	1	9,0	N.D.				9	5,2	3,8
	Daguet							1	3,0	N.D.	1	2,0	N.D.	2	2,5	0,7
	Femmina adulta	3	3,7	4,6	11	5,6	5,1	3	2,0	1,0				17	4,6	4,6
	Miaschio subad.	5	4,4	4,2				2	5,0	2,8	2	13,0	5,7	9	6,4	5,3
	Maschio adulto	7	5,3	4,0	1	3,0	N.D.				2	3,0	2,8	10	4,6	3,6
	Totale	15	4,7	3,9	20	5,2	4,4	7	4,0	2,9	5	6,8	6,5	47	5,0	4,2

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

## ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### NUMERO PRELIEVI SANITARI

#### CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO				
BIN				
FA	2		2	4
MA	2		1	3
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>7</b>

### TIPI DI ANOMALIE

#### CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI				3	2
LESIONE DIVERSE			1	1	2
PESO					
<b>Totale complessivo</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

#### CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA				1	1
MA			1	1	2
<b>Totale</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

#### CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI			1	1
PALCO IN VELLUTO				
LESIONI DIVERSE			1	1
PESO				
<b>Totale complessivo</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

#### MUFLONE

Classe	VP	Totale
AGN		
BIN		
FA		
MA		
<b>Totale</b>		<b>0</b>

#### MUFLONE

Cause	AGN	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI					
LESIONE DIVERSE					
PESO					
<b>Totale complessivo</b>					<b>0</b>

#### CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA					
MS					
MA		1			1
<b>Totale</b>		<b>1</b>			<b>1</b>

#### CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MS	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI					1	1
LESIONE DIVERSE						
PESO						
<b>Totale complessivo</b>					<b>1</b>	<b>1</b>

#### Legenda:

GIO = giovane	PR = Prigelato
BIN = yearling	VC = Bassa Val Chisone e Pinerolese
DAG = daguet	VG = Val Germanasca
FA = femmina adulta	VC1 = Bassa Val Chisone 1
MS = maschio subadulto	VC2 = Bassa Val Chisone 2
MA = maschio adulto	

## ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP			1	1
BIN				
FA	1	1		2
MA	2			2
Totale complessivo	3	1	1	5

#### Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP x BIN			1	1
FA x BIN		1		1
FA x MA	1			1
MA x FA	2			2
Totale complessivo	3	1	1	5

### Legenda:

GIO = giovane  
 BIN = yearling  
 DAG = daguet  
 FA = femmina adulta  
 MA = maschio adulto  
 MS = maschio subadulto  
 AGN = giovane  
 YRM = yearling maschio  
 MACOR = maschio adulto coronato

PR = Prigelato  
 VC = Val Chisone  
 VG = Val Germanasca  
 VP = Val Pellice  
 VC1 = Bassa Val Chisone 1  
 VC2 = Bassa Val Chisone 2

### CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
FA					
MA				1	1
Totale complessivo				1	1

#### Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO				1	1
FA x GIO					
MA x GIO					
Totale complessivo				1	1

### CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
DAG			1		1
FA					
MS	1		1		2
MA	1				1
Totale complessivo	2		2		4

#### Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
FAxGIO					
DAGxFA o GIO					
DAGxMA o MS			1		1
MAxFA o GIO	1				1
MAxMS	1				1
MSxMA			1		1
Totale complessivo	2		2		4

### MUFLONE

Classe	VP	Totale
AGN		
YRM		
FA		
MA		
Totale complessivo	1	1

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza (indicati come non conformi): -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -



ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI  
UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

**Camoscio**

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2012	Capretti	1			1	1			1		1			2	1		3
	Yearling	19		3	22	15	1		16	9			9	43	1	3	47
	Femmine ad.	22	1		23	14		1	15	16			16	52	1	1	54
	Maschi adulti	25		3	28	15			15	22	1	3	26	62	1	6	69
	Totale	67	1	6	74	45	1	1	47	47	2	3	52	159	4	10	173
2013	Capretti	3			3				0	1			1	4		0	4
	Yearling	20			20	10			10	10		1	11	40		1	41
	Femmine ad.	23	3	1	27	22			22	9	1		10	54	4	1	59
	Maschi adulti	27			27	26			26	13			13	66		0	66
	Totale	73	3	1	77	58			58	33	1	1	35	164	4	2	170
2014	Capretti	2			2	1			1		1	2		4		1	5
	Yearling	14	1		15	9			9	15			15	38	1		39
	Femmine ad.	16	2		18	12			12	23	1		24	51	3		54
	Maschi adulti	23		3	26	13		1	14	23		1	24	59		5	64
	Totale	55	3	3	61	35		1	36	62	1	2	65	152	4	6	162
2015	Capretti			1	1				1	2			2	2		2	4
	Yearling	10		3	13	15			15	19		2	21	44		5	49
	Femmine ad.	17		4	21	15		1	16	22	1	2	25	54	1	7	62
	Maschi adulti	19		2	21	13	1	1	15	23			23	55	1	3	59
	Totale	46		10	56	43	1	3	47	66	1	4	71	155	2	17	174
2016	Capretti	2			2						1		1	2	1	0	3
	Yearling	13			13	10			10	14			14	37	0	0	37
	Femmine ad.	18	1	2	21	11	1		12	21		2	23	50	2	4	56
	Maschi adulti	24	2	2	28	13			13	21		1	22	58	2	3	63
	Totale	57	3	4	64	34	1		35	56	1	3	60	147	5	7	159

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

## Muflore

Stagione	Classe	CONF	ET	SAN	TOT
2012	Agnelli	1			1
	Yearling maschi	1			1
	Femmine adulte	3			3
	Maschi adulti	2			2
	Totale	7			7
2013	Agnelli				
	Yearling maschi				
	Femmine adulte	3			3
	Maschi adulti	2			2
	Totale	5			5
2014	Agnelli				
	Yearling maschi				
	Femmine adulte	3			3
	Maschi adulti	2		2	4
	Totale	5		2	7
2015	Agnelli		1	1	2
	Yearling maschi				
	Femmine adulte	2		1	3
	Maschi adulti	2			2
	Totale	4	1	2	7
2016	Agnelli				
	Yearling maschi				
	Femmine adulte				
	Maschi adulti	2			2
	Totale	2			2

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi, SAN=abbattimenti sanitari

## Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa V. Chisone 1				Bassa V. Chisone 2				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2012	Giovani	2			2	4			4	3			3	2			2	11			11
	Daguet		1		1	1	1		2					1			1	2	2		4
	Femmine ad.	10			10	11	1		12	3			3	3			3	27	1		28
	Maschi sub.	2			2	1		1	2		1		1					3	1	1	5
	Maschi adulti	2			2	1	2		3		1		1					3	3		6
	Totale	16	1		17	18	4	1	23	6	2		8	6			6	46	7	1	54
2013	Giovani	3			3	6			6	2			2	1	1			12			12
	Daguet				0	2			2	0	1		1			0		2	1		3
	Femmine ad.	5			5	11			11	6	2		8	4		4		26	2		28
	Maschi sub.	4			4	4			4	1		1	2			0		9		1	10
	Maschi adulti	1			1	2			2				0			0		3			3
	Totale	13			13	25			25	9	3	1	13	5		5		52	3	1	56
2014	Giovani	4			4	3			3	1			1			0		8			8
	Daguet	0			0	0			0	1			1	1		1		2			2
	Femmine ad.	6			6	8			8	1		1	2	1		1		16		1	17
	Maschi sub.	4			4	3			3	1			1	1		1		9			9
	Maschi adulti	2			2				0				0			0		2			2
	Totale	16			16	14			14	4		1	5	3		3		37		1	38
2015	Giovani	2			2	6			6	4			4	1		1		13			13
	Daguet		1		1	1	1		2									1	2		3
	Femmine ad.	2			2	12			12	4			4	1		1		19			19
	Maschi sub.	3			3	4	2		6	2			2	2		2		11	2		13
	Maschi adulti	2			2	1		1	2	1			1	1		1		5		1	6
	Totale	9	1		10	24	3	1	28	11			11	5		5		49	4	1	54
2016	Giovani					8			8	1			1					9			9
	Daguet										1		1	1		1		1	1		2
	Femmine ad.	3			3	11			11	3			3					17			17
	Maschi sub.	4	1		5					1	1		2	2		2		7	2		9
	Maschi adulti	5	1	1	7	1			1					2		2		8	1	1	10
	Totale	12	2	1	15	20			20	5	2		7	5		5		42	4	1	47

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

## Capriolo


Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2012	Giovani	3			3	26			26	15			15	3			3	47			47
	Femmine ad.	8			8	44	1		45	31			31	20	1		21	103	2		105
	Maschi adulti	6	1		7	38	1		39	22	1		23	13			13	79	3		82
	Totale	17	1		18	108	2		110	68	1		69	36	1		37	229	5		234
2013	Giovani	2			2	27		1	28	18		3	21	6			6	53		4	57
	Femmine ad.	5			5	43		1	44	38	2		40	26			26	112	2	1	115
	Maschi adulti	6	1		7	32	3	1	36	32			32	22			22	92	4	1	97
	Totale	13	1		14	102	3	3	108	88	2	3	93	54			54	257	6	6	269
2014	Giovani					26		4	30	4		3	7	6			6	36		7	43
	Femmine ad.					34			34	30			30	19	1		20	83	1		84
	Maschi adulti					27	1	1	29	25		1	26	15			15	67	1	2	70
	Totale					87	1	5	93	59		4	63	40	1		41	186	2	9	197
2015	Giovani					17			17	5		1	6	4			4	26		1	27
	Femmine ad.					28		1	29	25			25	16			16	69		1	70
	Maschi adulti					23		1	24	19	2		21	11	1		12	53	3	1	57
	Totale					68		2	70	49	2	1	52	31	1		32	148	3	3	154
2016	Giovani					9			9	7			7	6			6	22	0	0	22
	Femmine ad.					20			20	19		1	20	14			14	53	0	1	54
	Maschi adulti					18		1	19	13		1	14	13	1		14	44	1	2	47
	Totale					47		1	48	39		2	41	33	1		34	119	1	3	123

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari


DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Mufione	Totale complessivo
ANGROGNA	8	5			13
BIBIANA		5			5
BOBBIO PELLICE	42	5		2	49
BRICHERASIO		2			2
CANTALUPA		2			2
INVERSO PINASCA			1		1
LUSERNA S. GIOVANNI		4			4
LUSERNETTA		7			7
MASSELLO	4				4
PEROSA ARGENTINA	9	7	7		23
PERRERO	8	24	4		36
PINASCA	6	10			16
PINEROLO		1			1
POMARETTO	3				3
PORTE		2			2
PRAGELATO	10		15		25
PRALI	31	8	1		40
PRAMOLLO	3	7	3		13
PRAROSTINO		1			1
RORA'		4			4
ROURE	7	4	13		24
S. GERMANO CHISONE		2	3		5
SALZA DI PINEROLO	14	2			16
TORRE PELLICE	1	4			5
VILLAR PELLICE	13	12			25
VILLAR PEROSA		5			5
Totale complessivo	159	123	47	2	331


# CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# CERVO E MUFLONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



Note: ● Cervo; ● Muflone



**RISULTATI**  
**CACCIA AL CINGHIALE**

## CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 25	25 settembre 2016 25 dicembre 2016	LUNEDI' MERCOLEDI' DOMENICA

## AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
Val Pellice	73	80	153
Val Chisone, Germ. e Pinerolese	168	180	348
Totale CATO1	241	260	501

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	73	80	153
Pinerolese pedemontano	23	17	40
Val Chisone	110	113	223
Val Germanasca	35	50	85
Totale complessivo	241	260	501

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

Classe di età	Val Pellice				Valli Chisone, Germ. e Pin.				Totale CATO1			
	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%
0-12 mesi	27	33	60	39,2	67	87	154	44,3	94	120	214	42,7
13-24 mesi	22	31	53	34,6	59	41	100	28,7	81	72	153	30,5
25-36 mesi	5	8	13	8,5	29	32	61	17,5	34	40	74	14,8
oltre 36 mesi	19	8	27	17,6	13	20	33	9,5	32	28	60	12,0
Totale complessivo	73	80	153	100,0	168	180	348	100,0	241	260	501	100,0

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE


Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20160925	DOM	7	2	9	19	19	38	47
20160926	LUN							
20160928	MER	1	4	5	8	8	16	21
20161002	DOM	2	3	5	12	9	21	26
20161003	LUN							
20161005	MER	1		1	7	7	14	15
20161009	DOM		2	2	3	5	8	10
20161010	LUN				1		1	1
20161012	MER		2	2	2	1	3	5
20161016	DOM	4	3	7	8	16	24	31
20161017	LUN							
20161019	MER	4		4		6	6	10
20161023	DOM	2		2	6	2	8	10
20161024	LUN							
20161026	MER	3		3	2	5	7	10
20161030	DOM	1	6	7	12	5	17	24
20161031	LUN							
20161102	MER		1	1	5	2	7	8
20161106	DOM	5	7	12	9	9	18	30
20161107	LUN					1	1	1
20161109	MER	2	2	4	1	7	8	12
20161113	DOM	3	9	12	5	7	12	24
20161114	LUN				1		1	1
20161116	MER	3	3	6	4	7	11	17
20161120	DOM	3	5	8	2	9	11	19
20161121	LUN							
20161123	MER				1	1	2	2
20161127	DOM	5	7	12	6	9	15	27
20161128	LUN							
20161130	MER	5	6	11	5	4	9	20
20161204	DOM	3	3	6	7	3	10	16
20161205	LUN	1		1	1		1	2
20161207	MER	4	5	9	5	8	13	22
20161211	DOM	10	4	14	10	7	17	31
20161212	LUN	1	1	2				2
20161214	MER	1		1	4	5	9	10
20161218	DOM		2	2	9	8	17	19
20161219	LUN				1	1	2	2
20161221	MER	2	2	4	11	9	20	24
20161225	DOM		1	1	1		1	2
<b>Totale complessivo</b>		<b>73</b>	<b>80</b>	<b>153</b>	<b>168</b>	<b>180</b>	<b>348</b>	<b>501</b>

Legenda: F=femmine; M=maschi

## DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	48
BIBIANA	6
BOBBIO PELLICE	17
BRICHERASIO	11
CANTALUPA	5
INVERSO PINASCA	9
LUSERNA S. GIOVANNI	10
LUSERNETTA	7
PEROSA ARGENTINA	28
PERRERO	74
PINASCA	42
PINEROLO	3
POMARETTO	6
PORTE	12
PRAGELATO	5
PRALI	4
PRAMOLLO	38
PRAROSTINO	5
ROLETTO	23
RORA'	10
ROURE	68
S. GERMANO CHISONE	12
S. PIETRO VAL LEMINA	4
SALZA DI PINEROLO	1
TORRE PELLICE	12
VILLAR PELLICE	32
VILLAR PEROSA	9
<b>Totale complessivo</b>	<b>501</b>

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'




L'età è espressa in mesi.


## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI










# COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE CACCIATA NEGLI ANNI



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE



0 6 12 Kilometers

-  Corsi d'acqua principali
-  Paesi
-  Confini CATO1
-  Aree di caccia specifica
-  Oasi/ZRC
-  Aziende faunistico-venatorie
-  Parchi naturali

**RISULTATI  
CACCIA ALLE SPECIE DELLA  
TIPICA FAUNA ALPINA**



TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2016/2017  
 (DD.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, n. 21-3140 del 11.4.2016 e s.m.i. e n. 32-3977 del 26.9.2016)

SPECIE	SETTORE	CAPI PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	12	2 ottobre 2016 30 novembre 2016	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	24		
COTURNICE	VAL PELLICE	10		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	8		

E' vietata la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant, in quanto non sono stati effettuati censimenti specifici per queste specie in queste aree.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
<b>FAGIANO DI MONTE</b>	12	7	58%	24	18	75%	<b>36</b>	<b>25</b>	69%
<b>COTURNICE</b>	10	10	100%	8	9	113%	<b>18</b>	<b>19</b>	106%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

Il piano realizzato del Fagiano di monte comprende anche due esemplari (1 adulto e 1 giovane) abbattuti illegalmente il 29.9.2016 nel Comune di Perrero.

## TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	SPECIE	SESSO	ADULTO	GIOVANE	INDET	Totale
Val Pellice	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	6	1		7
	COTURNICE	MASCHIO	3			3
		FEMMINA	4	1		5
		INDET		1	1	2
		TOT	7	2	1	10
Valli Chisone e Germanasca	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	5	13		18
	COTURNICE	MASCHIO	2			2
		FEMMINA	2			2
		INDET		5		5
		TOT	4	5		9
Totale CATO1	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	11	14		25
	COTURNICE	MASCHIO	5			5
		FEMMINA	6	1		7
		INDET		6	1	7
		TOT	11	7	1	19





CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER  
COMPLETAMENTO DEL PIANO

<b>Specie</b>	<b>Distretto</b>	<b>Data completamento piano</b>
Coturnice	Val Pellice	12-ott
Coturnice	Valli Chisone e Germanasca	12-ott





DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Coturnice	Totale
ANGROGNA	4	4	8
BOBBIO PELLICE	1	6	7
MASSELLO		1	1
PERRERO	7	2	9
PINASCA	1	1	2
PRAGELATO	2	3	5
PRALI	3	2	5
PRAMOLLO	5		5
RORA'	1		1
VILLAR PELLICE	1		1
<b>Totale complessivo</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>44</b>

# TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA



CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			Totale CA
		VP	VC	Totale	VP	VC	Totale	
20161002	DOM		3	3	1	2	3	6
20161005	MER	1	1	2	4	3	7	9
20161009	DOM		1	1	2	3	5	6
20161012	MER		3	3	3	1	4	7
20161016	DOM		1	1				1
20161019	MER		1	1				1
20161023	DOM							
20161026	MER							
20161030	DOM	2	3	5				5
20161102	MER		2	2				2
20161006	DOM							
20161009	MER							
20161013	DOM							
20161116	MER	2	1	3				3
20161120	DOM	1		1				1
20161123	MER							
20161127	DOM	1		1				1
20161130	MER							
Totale complessivo		7	16	23	10	9	19	42

VP = Distretto Val Pellice





VC = Distretto Val Chisone e Germanasca




= caccia chiusa per completamento del piano








= caccia chiusa per disposizioni regionali

## TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE



-  Corsi d'acqua principali
-  Paesi
-  Confini CATO1
-  Aree di caccia specifica
-  Oasi/ZRC
-  Aziende faunistico-venatorie
-  Parchi naturali

0 6 12 Kilometers

Note: ● fagiano di monte; ● coturnice



## CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2016/2017

Numero giornate e tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	MUFLONE	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA
<b>Meteo</b>						
Sereno	9	18	15 (19)	9	24	11
Variabile	4	4	2 (4)	4	6	3
Nuvoloso	4	5	1 (3)	4	6	2
Pioggia/Neve	3	4	2 (4)	3	4	2
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>20 (30)</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>18</b>

Fra parentesi i dati per il settore Prigelato.

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia, su pendici esposte a S:

