



**Comprensorio Alpino TO1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

Stagione venatoria 2017/2018

**RISULTATI E STATISTICHE
PRELIEVI
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
CINGHIALE
TIPICA FAUNA ALPINA**

**A cura di
Marco Giovo,
Responsabile tecnico CATO1**

Bricherasio, 16 gennaio 2018

**RISULTATI
CACCIA DI SELEZIONE
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	SETTORI	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	UNICO	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	A, B, C, D	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
		BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI
 DD.G.R. n. 14-4867 del 10.4.2017 e n. 23-5409 del 24.7.2017

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	30 (10) 30 40	100	Maschi ad. 2 settembre 2017 13 novembre 2017	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	0 0 0	0		
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	20 (7) 20 27	67	Femmine ad. e Giovani 16 settembre 2017 14 dicembre 2017	
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	16 (5) 16 21	53		
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 6 14 4 12	40	16 ottobre 2017 21 dicembre 2017	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	2 4 8 2 8	24		
		VAL GERMANASCA	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	2 3 6 2 5	18		
		BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	1 1 3 1 2	8		
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling maschi Agnelli	2 3 1 2	8	16 settembre 2017 20 novembre 2017	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	19 20 24 2	65	16 settembre 2017 20 novembre 2017	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	VAL CHISONE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	12 12 15 1	40		
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	19 20 24 2	65		

Note: nel piano dei Cervi maschi adulti è non è più previsto un tetto massimo di cervi maschi adulti coronati; nel piano dei caprioli è indicato la quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno).

La caccia è stata sospesa per incendi dal 3 al 17 novembre.

La caccia al cervo è stata prolungata fino al 30.12.

La caccia al capriolo è stata prolungata dal 4 al 14.12.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni

2.3.1 Entro il mese di giugno 2017 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 7.7.2017 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2017/2018 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, muflone maschio adulto, muflone yearling maschio, capriolo maschio adulto, cervo daguet, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo giovane, muflone femmina adulta o muflone agnello, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesto di dare la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti degli Ungulati, di cui uno della specie che verrà richiesta per il prelievo. A costoro viene riconosciuto un punteggio sia in sede di assegnazione del distretto che in sede di assegnazione della classe richiesta, come previsto ai punti successivi. I punti si maturano con l'offerta di disponibilità, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a partecipare ai censimenti indicati. In caso di chiamata e di mancata conferma della disponibilità offerta, anche solo ad uno dei due censimenti, verranno persi tutti i punti. E' però ammesso, in questo caso, offrire una disponibilità alternativa.

2.3.3 In caso di richieste per una specie in un distretto in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4a. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Agli esclusi da un distretto verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.4 L'assegnazione dei capi maschi adulti viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi assegnabili per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4b. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Per tutte le altre classi non accorpate (camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, cervo daguet, muflone yearling maschio), l'assegnazione si effettuerà secondo l'ordine di cui alla tabella 4c. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

A chi non ottiene il capo richiesto sarà comunque assegnato un capo della stessa specie nel distretto assegnato inizialmente, in base alla disponibilità residua dopo le assegnazioni delle altre classi. Nell'assegnazione della classe in

sostituzione del maschio adulto si terrà conto del punteggio di priorità acquisito. Ai primi esclusi verrà assegnata una femmina adulta (se disponibile), quindi uno yearling (se disponibile), quindi un giovane.

L'assegnazione dei capi secondo i criteri sopra indicati verrà effettuata d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

Per le classi accorpate (capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane), in caso di richieste superiori al numero di autorizzazioni disponibili per un distretto, si procederà sempre seguendo i criteri di priorità di cui alla tabella 4b; agli esclusi verrà assegnata un altro capo della stessa specie sempre nel medesimo distretto.

In caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto, eventuali variazioni potranno essere valutate tenendo conto delle disponibilità residue dopo tutte le assegnazioni.

Per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale (ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente), in sede di calcolo dei punteggi per le priorità, non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2017/2018, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, uno yearling maschio di muflone o di cervo o di capriolo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2017/2018 il Comitato di Gestione ha previsto un carniere stagionale individuale fino a cinque capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
 - il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano.
- Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 90% o per completamente del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, cervo daguet, muflone maschio adulto, muflone yearling, capriolo maschio adulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In

caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituita la differenza fra la quota versata e il minimo per quella specie. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi, verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della quart'ultima giornata.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 90% o per completamento del piano per entrambe le classi, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituita la quota versata, corrispondente al minimo per quella specie, ma solo in caso di interruzione del prelievo prima della quart'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione.

I sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 90% sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito internet e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In questo manifesto sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto 2-5 anni non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Non è previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso. L'abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo o cervo con il latte fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti o adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Anche per la stagione venatoria 2017/2018 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sfioramento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso.

2.3.13 Per il Cervo, per il distretto di Pragalato, verrà eseguita una rotazione dei cacciatori autorizzati sul territorio del distretto, che viene suddiviso in 4 settori omogenei dai confini naturali facilmente individuabili e riportati su una cartina che verrà distribuita ai cacciatori autorizzati alla caccia in quel distretto. Il numero di autorizzazioni rilasciabili, in funzione del piano e con il tetto massimo di 1,3 volte il numero di capi prelevabili, sarà definito come multiplo esatto di 4. Per ogni autorizzazione (rilasciata e non) verrà assegnato, per ogni giornata di caccia, un settore diverso, con rotazione secondo un calendario prestabilito a inizio stagione per ogni autorizzazione e che verrà consegnato ai soci. Si cercherà di garantire la possibilità di cacciare insieme nello stesso settore ai cacciatori che ne faranno richiesta. Il fine di questa regolamentazione è quello di evitare concentrazioni di cacciatori in poche zone, con disturbo eccessivo per gli animali

che conseguentemente si spostano fuori distretto verso zone a minor disturbo (Azienda Albergian, Parco Alpi Cozie). L'obiettivo è diminuire il disturbo per gli animali e favorirne il prelievo, oltre a ridurre il disturbo reciproco dei cacciatori durante l'azione di caccia.

Tabella 4a – Ordine di assegnazione del distretto

Criterio di priorità	Punti
Residenza in uno dei Comuni componenti il distretto o il settore	20
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al distretto o al settore	10
Residenza fuori Regione Piemonte	5
Non aver ottenuto il distretto o il settore richiesto per la stessa specie nello stesso distretto nella stagione 2016/2017	20
Aver dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2017	10
Essere ammesso al CATO1 in forma esclusiva	5

Tabella 4b – Ordine di assegnazione del maschio

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2015/2016	20
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2015/2016	5
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2014/2015	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2016/2017	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2017	5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2016/2017	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2016/2017	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2016/2017	-10

Tabella 4c – Ordine di assegnazione del altre classi

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2016/2017	20
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2016/2017	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2017	5
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2016/2017	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2016/2017	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2016/2017	-10

ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	65	85	84	0	84
	Val Chisone	40	52	52	0	52
	Val Germanasca	65	85	83	0	83
	TOTALE	170	222	219	0	219
Capriolo	Val Pellice	100	130	62	46	108
	Bassa val Chisone	67	87	79	8	87
	Val Germanasca	53	69	37	30	67
	TOTALE	220	286	178	84	262
Cervo	Pragelato	40	52	24	24	48
	Bassa val Chisone1	24	31	28	1	29
	Bassa val Chisone2	8	10	10	0	10
	Val Germanasca	18	23	17	2	19
	TOTALE	90	116	79	27	106
Mufone	Val Pellice	8	10	8	1	9

DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autoriz.		2° autoriz.		3° autoriz.		4° autoriz.	
		Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb
Camoscio	Val Pellice	84	55						
	Val Chisone	52	31						
	Val Germanasca	83	43						
Capriolo	Val Pellice	62	29	37	22	8	2	1	1
	Bassa Val Chisone	79	37	8	3				
	Val Germanasca	37	22	25	10	4	2	1	1
Cervo	Pragelato	24	10	22	2				
	Bassa Val Chisone1	28	16	1	1				
	Bassa Val Chisone2	10	7						
	Val Germanasca	17	4	2					
Mufone	Val Pellice	8	2	1					
Totale complessivo		484	256	96	38	12	4	2	2

Aut = autorizzazioni rilasciate; Abb = capi abbattuti

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: 3 caprioli in Val Pellice (2 femmine adulte e 1 giovane).

I capi assegnati in sostituzione di altri capi (per chiusura anticipata del prelievo in quel distretto per quella specie) sono stati qui considerati come ulteriori capi.

CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO 16.9-20.12	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	19	23	121%	19	20	105%	12	11	92%	50	54	108%
FEMMINE AD.	20	20	100%	20	13	65%	12	11	92%	52	44	85%
YEARLING	24	11 (5;6)	46%	24	9 (3;6)	38%	15	9 (6;3)	60%	63	29 (14;15)	46%
CAPRETTI	2	1 (0;1)	50%	2	1 (1;0)	50%	1		0%	5	2 (1;1)	40%
Totale	65	55	85%	65	43	66%	40	31	78%	170	129	76%
Di cui tiri non conf.												
Di cui sanitari		5			1			2			8	

CAPRIOLO MA: 2.9-13.11 FA/GIO: 16.9-14.12	Val Pellice			Pragelato			Bassa Val Chisone e Pin.			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	30	20	67%	0			20	17	85%	16	10	63%	66	47	71%
FEMMINE AD.	30	21	70%	0			20	19	90%	16	15	94%	66	54	82%
GIOVANI	40	16 (8;8)	40%	0			27	5 (1,4)	19%	21	10 (3;7)	48%	88	31 (12;19)	35%
Totale	100	57	57%	0			67	40	60%	53	35	66%	220	132	60%
Di cui tiri non conf.								1			1			2	
Di cui sanitari		3												3	

CERVO 16.10-21.12	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	4	6	150%	2	2	100%	1		0%	2	1	50%	9	9	100%
MASCHI SUBAD.	6	3	50%	4	2	50%	1		0%	3	1	33%	14	6	43%
FEMMINE AD.	14	2	14%	8	8	100%	3	3	100%	6	2	33%	31	15	48%
DAGUET	4		0%	2	1	50%	1	2	200%	2		0%	9	3	33%
GIOVANI	12	1 (1;0)	8%	8	4 (2;2)	50%	2	2 (1;1)	100%	5		0%	27	7 (4;3)	26%
Totale	40	12	30%	24	17	71%	8	7	88%	18	4	22%	90	40	44%
Di cui tiri non conf.								1						1	
Di cui sanitari															

MUFLONE 16.9-20.11	Val Pellice		
	PRE	REA	%
MASCHI AD.	2	1	50%
FEMMINE AD.	3		75%
FUSONI	1		0%
AGNELLI	2	1 (1;0)	50%
Totale	8	2	25%
Di cui tiri non conf.			
Di cui sanitari			

Legenda:
PRE= Piano previsto
REA=Piano realizzato

La caccia su tutto il territorio del CATO1 è stata sospesa per incendi dal 3.11 al 17.11
La caccia al camoscio è stata prolungata dal 2.12 al 14.12
La caccia al cervo è stata prolungata fino al 30.12

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	19	21	2	121%	19	19	1	105%	12	11		92%	50	51	3	108%
FEMMINE AD.	20	17	3	100%	20	13		65%	12	10	1	92%	52	40	4	85%
YEARLING	24	11		46%	24	9		38%	15	8	1	60%	63	28	1	46%
CAPRETTI	2	1		50%	2	1		50%	1			0%	5	2		40%
Totale	65	55		85%	65	43		66%	40	31		78%	170	129		76%

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone e Pin.				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	30	20		67%	0				20	17		85%	16	10		63%	66	47		71%
FEMMINE AD.	30	21		70%	0				20	18		90%	16	15		94%	66	54		82%
GIOVANI	40	13	3	40%	0				27	5		19%	21	10		48%	88	28	3	35%
Totale	100	57		57%	0				67	40		60%	53	35		66%	220	132		60%

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	4	6		150%	2	2		100%	1			0%	2	1		50%	9	9		100%
MASCHI SUBAD.	6	3		50%	4	2		50%	1			0%	3	1		33%	14	6		43%
FEMMINE AD.	14	2		14%	8	8		100%	3	3		100%	6	2		33%	31	15		48%
DAGUET	4			0%	2	1		50%	1	2		200%	2			0%	9	3		33%
GIOVANI	12	1		8%	8	4		50%	2	2		100%	5			0%	27	7		26%
Totale	40	12		30%	24	17		71%	8	7		88%	18	4		22%	90	40		44%

MUFLONE	Val Pellice			
	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	2	1		50%
FEMMINE AD.	3			0%
FUSONI	1			0%
AGNELLI	2	1		50%
Totale	8	2		25%

Legenda:

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI RISPETTO AL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

CAMOSCIO	Val Pellice					Val Germanasca					Val Chisone					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	19	25	23	92%	121%	19	25	20	80%	105%	12	16	11	69%	92%	50	66	54	82%	108%
FEMMINE AD.	20	26	20	77%	100%	20	26	13	50%	65%	12	16	11	69%	92%	52	68	44	65%	85%
YEARLING	24	31	11	35%	46%	24	31	9	29%	38%	15	19	9	47%	60%	63	81	29	36%	46%
CAPRETTI	2	2	1	50%	50%	2	1	1	100%	50%	1	1		0%	0%	5	4	2	50%	40%
Totale	65	84	55	65%	85%	65	83	43	52%	66%	40	52	31	60%	78%	170	219	129	59%	76%

CAPRIOLO	Val Pellice					Pragelato					Resto Chisone					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	30	30	20	67%	67%	0					20	26	17	65%	85%	16	21	10	48%	63%	66	77	47	61%	71%
FEMMINE AD.	30		21		70%	0					20		18		90%	16		15		94%	66		54		82%
GIOVANI	40	79	16	47%	40%	0					27	61	5	38%	19%	21	46	10	54%	48%	88	186	31	46%	35%
Totale	100	109	57	52%	57%	0					67	87	40	46%	60%	53	67	35	52%	66%	220	263	132	50%	60%

CERVO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	4		6		175%	2		2		33%	1				0%	2		1		100%	9		9		100%
MASCHI SUBAD.	6	13	3	69%	100%	4	6	2	67%	0%	1	3			200%	3	6	1	33%	100%	14	28	6	54%	43%
DAGUET	4	3		0%	0%	8	10	1	10%	0%	1	1	2	200%	100%	2	3		0%	100%	15	17	3	18%	20%
FEMMINE AD.	14		2		23%	8		8		100%	3		3		75%	6		2		0%	31		15		48%
GIOVANI	12	32	1	9%	0%	2	13	4	92%	80%	2	6	2	83%	33%	5	10		20%	0%	21	61	7	36%	33%
Totale	40	48	12	25%	42%	24	29	17	59%	67%	8	10	7	70%	70%	18	19	4	21%	36%	90	106	40	38%	44%

MUFLONE	Val Pellice				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	2	3	1	33%	100%
FUSONI	1	1		0%	0%
FEMMINE AD.	3			0%	0%
AGNELLI	2	5	1	0%	0%
Totale	8	9	2	22%	25%





PRE= Piano previsto
 REA= Piano realizzato
 ASS= capi assegnati

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%






Specie	Classe	Distretto/Settore	Data raggiungimento soglia 90%	Data completamento piano
Camoscio	MA	Val Chisone		14/10/2017
Capriolo	MA sottoclasse II-III	Bassa Val Chisone e Pinerolese		16/10/2017
Camoscio	MA	Val Pellice		02/11/2017
Camoscio	MA	Val Germanasca	18/11/2017	09/12/2017
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 2		04/12/2017
Cervo	GIO	Bassa Val Chisone 2		04/12/2017
Capriolo	FA	Val Germanasca	04/12/2017	
Cervo	FA	Bassa Val Chisone 1	04/12/2017	16/12/2017
Capriolo	FA	Bassa Val Chisone e Pinerolese	07/12/2017	
Cervo	MA adulto	Bassa Val Chisone 1		09/12/2017
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone 2		09/12/2017
Cervo	MA adulto	Pragelato		14/12/2017

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio






CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



MUFLONE: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2013/14	Val Pellice	83%	1,00	0,97	39,8%	29,9%	6,8	6,9
	Val Chisone	83%	1,00	0,76	38,1%	34,3%	5,8	4,0
	Val Germanasca	64%	1,00	1,06	40%	17,2%	5,5	8,5
	Totale	76%	1,00	0,91	39,6%	26,5%	6,1	7,0
2014/15	Val Pellice	76%	1,00	0,74	40,0%	27,9%	6,0	6,7
	Val Chisone	90%	1,00	0,80	40,0%	27,7%	5,8	6,2
	Val Germanasca	76%	1,00	1,03	41,1%	26,2%	5,0	7,8
	Totale	79%	1,00	0,86	40,5%	27,2%	5,6	7,1
2015/16	Val Pellice	86%	1,03	1,00	40,0%	25,0%	5,7	8,1
	Val Chisone	98%	1,04	0,96	39,6%	34,0%	5,5	5,4
	Val Germanasca	88%	1,00	0,87	40,7%	32,4%	6,4	8,6
	Totale	90%	1,02	0,93	40,2%	30,5%	5,9	7,6
2016/17	Val Pellice	76%	1,00	0,77	39,8%	23,4%	7,5	8,3
	Val Chisone	80%	1,02	1,14	38,1%	28,6%	5,5	6,8
	Val Germanasca	83%	1,00	0,84	40,0%	25,0%	5,7	10,6
	Totale	79%	1,02	0,92	39,5%	25,2%	6,5	8,9
2017/18	Val Pellice	85%	1,03	0,83	40,0%	21,8%	6,0	8,0
	Val Chisone	78%	1,00	1,21	40,0%	29,0%	7,0	6,5
	Val Germanasca	66%	1,03	0,59	40,0%	23,3%	5,7	8,9
	Totale	76%	1,02	0,87	40,0%	24,0%	6,1	7,9

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2013/14	Pragelato	33%	1,16	1,16	32,5%	23,1%	5,0	3,0
	Bassa Val Chisone 1	83%	1,14	1,27	33,3%	24,0%	3,7	4,6
	Bassa Val Chisone 2	81%	1,13	3,33	31,2%	12,5%	4,0	3,6
	Val Germanasca	50%	1,22	4,00	30,0%	20,0%		4,3
	Totale	58%	1,16	1,54	32,3%	21,4%	4,2	4,0
2014/15	Pragelato	32%	1,17	1,00	32,0%	25,0%	4,3	4,2
	Bassa Val Chisone 1	54%	1,00	2,50	30,8%	21,4%	3,0	6,3
	Bassa Val Chisone 2	42%	1,40	0,67	33,3%	20,0%	4,0	3,5
	Val Germanasca	25%	1,40	0,50	33,3%	0,0%	2,0	2,0
	Totale	38%	1,17	1,24	32,0%	21,1%	3,7	4,9
2015/16	Pragelato	28%	1,06	0,43	27,8%	20,0%	5,8	6,5
	Bassa Val Chisone 1	88%	1,13	1,00	31,2%	21,4%	4,3	5,3
	Bassa Val Chisone 2	92%	1,00	0,57	33,3%	36,4%	4,0	3,3
	Val Germanasca	42%	0,85	0,25	25,0%	20,0%	5,7	1,0
	Totale	59%	1,04	0,69	30,4%	24,1%	4,8	4,7
2016/17	Pragelato	42%	1,06	0,25	30,6%	0,0%	5,7	7,3
	Bassa Val Chisone 1	67%	1,14	1,87	33,3%	40,0%	6	4,0
	Bassa Val Chisone 2	70%	1,22	0,43	30,0%	14,3%	2,5	6,0
	Val Germanasca	36%	1,00	N.D.	28,6%	0,0%	4,5	
	Totale	52%	1,09	0,68	31,1%	19,1%	5,1	4,9
2017/18	Pragelato	30%	1,00	0,20	30,0%	8,3%	6,2	11,0
	Bassa Val Chisone 1	71%	1,00	1,43	33,3%	23,5%	5,5	5,5
	Bassa Val Chisone 2	88%	1,00	1,33	25,0%	28,6%		4,7
	Val Germanasca	22%	0,89	1,00	27,8%	0,0%	5,5	5,0
	Totale	44%	0,98	0,90	30,0%	17,5%	5,9	6,0

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0. Le femmine di 1 anno sono comprese nelle FA.

MUFLONE: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2013/14	38%	1,00	1,50	38,5%	20,0%	4,5	4,7
2014/15	70%	1,00	0,75	40,0%	14,2%	3,5	1,7
2015/16	70%	1,00	0,75	40,0%	28,6%	5,0	4,0
2016/17	25%	1,00	N.R.	50,0%	0,0%	5,0	N.R.
2017/18	25%	1,00	N.R.	50%	50%	6,0	N.R.





Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani. Età delle femmine non sempre determinabile.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2013/14	Val Pellice	72%	1,00	1,2	40,0%	25,9%	3,6	3,6
	Pragelato	47%	1,00	0,8	40,0%	14,3%	2,6	2,8
	Bassa Val Chisone	72%	1,00	1,2	40,0%	22,5%	3,8	3,8
	Val Germanasca	60%	1,00	1,2	40,0%	11,1%	3,5	4,0
	Totale CATO1	67%	1,00	1,2	40,0%	21,1%	3,6	3,7
2014/15	Val Pellice	81%	1,02	0,9	40,0%	32,3%	2,9	3,0
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	60%	1,02	1,3	40,0%	11,1%	3,6	2,9
	Val Germanasca	59%	1,00	1,3	40,0%	14,6%	3,8	2,5
2015/16	Totale CATO1	68%	1,01	1,1	40,0%	21,8%	3,3	2,8
	Val Pellice	72%	1,02	1,3	40,0%	24,3%	4,0	3,8
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	50%	1,02	1,1	40,0%	11,5%	4,0	3,4
2016/17	Val Germanasca	58%	1,04	1,1	40,0%	12,5%	2,8	3,1
	Totale CATO1	60%	1,02	1,2	40,0%	17,5%	3,7	3,5
	Val Pellice	69%	1,00	1,0	40,0%	18,8%	2,7	2,9
	Pragelato							
2017/18	Bassa Val Chisone	63%	1,03	1,6	40,0%	17,1%	3,6	4,0
	Val Germanasca	68%	1,00	0,9	40,0%	17,6%	3,0	2,7
	Totale CATO1	66%	1,02	1,1	40,0%	17,9%	3,0	3,3
	Val Pellice	57,0%	1,00	1,03	40,0%	28,1%	3,2	2,7
	Pragelato						4,1	4,2
2017/18	Bassa Val Chisone	59,7%	1,00	1,22	40,3%	12,5%	2,9	3,4
	Val Germanasca	66,0%	1,00	1,69	39,6%	28,6%		
	Totale CATO1	60,0%	1,00	1,24	40,0%	23,5%	3,4	3,4

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI



Legenda: MM=maschi; FF=femmine

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale CATO1
		MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	
20170902	SAB	3			3	4			4	3			3	10
20170904	LUN	7			7	1			1	2			2	10
20170907	GIO	1			1	4			4					5
20170909	SAB					1			1					1
20170911	LUN	1			1	1			1					2
20170914	GIO	2			2					1			1	3
20170916	SAB	3	2	1	6		4		4		2	1	3	13
20170918	LUN		1	1	2	1			1		1		1	4
20170921	GIO		2	2	4	1	3	1	5	2	1		3	12
20170923	SAB	1			1							1	1	2
20170925	LUN		1		1	1			1			2	2	4
20170928	GIO			1	1						1		1	2
20170930	SAB	1		2	3						1		1	4
20171002	LUN		2	1	3		1		1		1		1	5
20171005	GIO			1	1									1
20171007	SAB			1	1	1			1					2
20171009	LUN						2		2					2
20171012	GIO													
20171014	SAB		2		2						1		1	3
20171016	LUN					1			1	1	1		2	3
20171019	GIO		1		1		1		1	1			1	3
20171021	SAB											1	1	1
20171023	LUN													
20171026	GIO						1	1	2		1		1	3
20171028	SAB		1		1							1	1	2
20171030	LUN													
20171102	GIO	1			1		1		1		1		1	3
20171104	SAB													
20171106	LUN													
20171109	GIO													
20171111	SAB													
20171113	LUN													
20171116	GIO													
20171118	SAB			1	1						1		1	2
20171120	LUN		2		2		2		2					4
20171123	GIO		1	2	3		1		1					4
20171125	SAB													
20171127	LUN		1		1									1
20171130	GIO													
20171202	SAB													
20171204	LUN					1	1	2	4		3		3	7
20171207	GIO		1		1		1		1			1	1	3
20171209	SAB		2	2	4			1	1			1	1	6
20171211	LUN											1	1	1
20171214	GIO											1	1	1
Totale complessivo		20	19	15	54	17	18	5	40	10	15	10	35	129

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta

GIO = giovane
TOT = totale distretto


- = superamento del 90% del piano
- = piano completato
- = raggiungimento soglia sottoclasse II-III
- = caccia chiusa
- = caccia sospesa per incendi

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Pellice					TOT	Val Chisone					TOT	Val Germanasca					TOT	Totale CATO1
		MA	FA	BIN	GIO			MA	FA	BIN	GIO			MA	FA	BIN	GIO			
20170916	SAB	3	2				5	1					1	1	1	1	3	9		
20170918	LUN		1	2			3		2	1			3	1			1	7		
20170921	GIO							2	1	1			4			1	1	5		
20170923	SAB			1			1	1	2	2			5	1	1		2	8		
20170925	LUN	1	1				2	1					1	2			2	5		
20170928	GIO							1					1					1		
20170930	SAB	2	1				3	1					1	1	1	1	3	7		
20171002	LUN							1					1					1		
20171005	GIO	1					1						1	1	1		3	4		
20171007	SAB	3	1	1			5	1		2			3	1	3		4	12		
20171009	LUN																			
20171012	GIO							1					1			1	1	2		
20171014	SAB	1					1	1	1	1			3	1			1	5		
20171016	LUN		2				2											2		
20171019	GIO	1					1											1		
20171021	SAB		3				3		1				1	2			2	6		
20171023	LUN	2	1		1		4											4		
20171026	GIO	2		1			3			1			1		1		2	6		
20171028	SAB	2	3	1			6								1		1	7		
20171030	LUN	1	2				3							1	1		2	5		
20171102	GIO	4	1				5							4	2	2	8	13		
20171104	SAB																			
20171106	LUN																			
20171109	GIO																			
20171111	SAB																			
20171113	LUN																			
20171116	GIO																			
20171118	SAB			1			1		3	1			4	3			3	8		
20171120	LUN		1	1			2		1				1	1			1	4		
20171123	GIO																			
20171125	SAB																			
20171127	LUN																			
20171130	GIO																			
20171202	SAB																			
20171204	LUN																			
20171207	GIO																			
20171209	SAB		1	2			3						1				1	4		
20171211	LUN																			
20171214	GIO			1			1								2		2	3		
Totale complessivo		23	20	11	1		55	11	11	9		31	20	13	9	1	43	129		

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta

BIN = yearling
GIO = giovane


 = superamento del 90% del piano
 = piano completato
 = caccia sospesa per incendi
 = caccia chiusa

CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO

DATA	GIORNO	Pragelato					TOT	Bassa Val Chisone 1					TOT	Bassa Val Chisone 2					TOT	Val Germanasca					TOT	CATO1					
		GIO	DAG	FA	MS	MA		GIO	DAG	FA	MS	MA		GIO	DAG	FA	MS	MA		GIO	DAG	FA	MS	MA							
20171016	LUN							1		1				2																	3
20171019	GIO															1	1														2
20171021	SAB							1	1	1				3			1														4
20171023	LUN									1				1																	1
20171026	GIO																1														1
20171028	SAB				1																										1
20171030	LUN																														1
20171102	GIO		1																												1
20171104	SAB	Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi											
20171106	LUN	Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi											
20171109	GIO	Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi											
20171111	SAB	Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi											
20171113	LUN	Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi											
20171116	GIO	Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi						Caccia sospesa per incendi											
20171118	SAB					1																									1
20171120	LUN																														1
20171123	GIO																														1
20171125	SAB					1					2																				3
20171127	LUN																														1
20171130	GIO																														1
20171202	SAB																														1
20171204	LUN										2			1			1														5
20171207	GIO					1																									1
20171209	SAB																														3
20171211	LUN																														1
20171214	GIO										1																				4
20171216	SAB					3					1																				2
20171218	LUN										1																				1
20171221	GIO																														1
20171223	SAB																														1
20171225	LUN																														1
20171228	GIO							2																							3
20171230	SAB	1		1	2																										4
Totale complessivo		1		2	3	6		4	1	8	2	2	17	2	2	3								7			2	1	1	4	40

MA = maschio adulto
MS = maschio subadulto
FA = femmina adulta

DAG = daguet
GIO = giovane
TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato
 = caccia sospesa per incendi

CALENDARIO ABBATTIMENTI MUFLONE

Data	Giorno	AGN	FUS	FA	MA	Totale
20170916	SAB				1	1
20170918	LUN					
20170921	GIO					
20170923	SAB					
20170925	LUN					
20170928	GIO					
20170930	SAB					
20171002	LUN					
20171005	GIO					
20171007	SAB					
20171009	LUN					
20171012	GIO					
20171014	SAB					
20171016	LUN					
20171019	GIO	1				1
20171021	SAB					
20171023	LUN					
20171026	GIO					
20171028	SAB					
20171030	LUN					
20171102	GIO					
20171104	SAB					
20171106	LUN					
20171109	GIO					
20171111	SAB					
20171113	LUN					
20171116	GIO					
20171118	SAB					
20171120	LUN					
Totale		1			1	2





-  = superamento del 90% del piano
-  = piano completato
-  = caccia sospesa per incendi

Legenda:




MA = maschi adulto
FA = femmina adulta

FUS = yearling maschio
GIO = giovane





TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI







CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2013	Giovane	3	2,3	1,5	1	1,0	-				4	2,0	1,4
	Yearling	20	2,9	1,8	11	5,5	3,1	10	3,4	2,2	41	3,7	2,5
	Femmina adulta	27	3,4	3,0	10	3,6	3,3	22	2,6	1,7	59	3,1	2,6
	Maschio adulto	27	3,3	2,5	13	2,8	1,7	26	3,4	2,8	66	3,2	2,5
	Totale	77	3,2	2,5	35	3,8	2,9	58	3,1	2,3	170	3,3	2,5
2014	Giovane	2	5,0	5,7	1	1,0	-	2	5,0	2,8	5	4,2	3,6
	Yearling	15	3,4	2,3	9	4,3	2,5	15	4,7	3,1	39	4,1	2,7
	Femmina adulta	18	3,9	2,2	12	5,9	4,0	24	5,5	4,0	54	5,0	3,5
	Maschio adulto	26	3,6	2,9	14	4,1	1,6	24	3,3	2,2	64	3,6	2,4
	Totale	61	3,7	2,6	36	4,7	2,9	65	4,5	3,3	162	4,2	3,0
2015	Giovane	1	1,0	-	1	2,0	-	2	1,0	0,0	4	1,3	0,5
	Yearling	13	2,2	1,1	15	3,5	2,4	21	3,2	2,2	49	3,1	2,1
	Femmina adulta	21	3,2	2,9	16	4,1	3,0	25	4,0	3,2	62	3,7	3,0
	Maschio adulto	21	2,1	1,3	14	3,4	2,3	23	3,0	2,6	58	2,8	2,2
	Totale	56	2,5	2,1	46	3,6	2,5	71	3,4	2,7	173	3,2	2,5
2016	Giovane	2	4,5	3,5				1	1,0	-	3	3,3	3,2
	Yearling	13	1,8	0,9	10	3,5	3,5	14	2,4	1,3	37	2,5	2,1
	Femmina adulta	21	3,0	2,1	12	4,6	4,0	23	4,0	2,9	56	3,8	2,9
	Maschio adulto	28	2,6	1,8	13	2,4	1,7	22	3,7	3,6	63	2,9	2,6
	Totale	64	2,7	1,8	35	3,5	3,2	60	3,5	2,9	159	3,1	2,6
2017	Giovane	1	1,0	-				1	7,0	-	2	4,0	4,2
	Yearling	11	2,3	2,1	9	2,6	1,5	9	5,1	3,8	29	3,2	2,8
	Femmina adulta	20	2,7	1,5	11	3,5	2,5	13	4,0	2,9	44	3,3	2,3
	Maschio adulto	23	2,7	1,8	11	3,6	2,0	20	2,5	1,5	54	2,8	1,8
	Totale	55	2,6	1,8	31	3,3	2,1	43	3,6	2,7	129	3,1	2,2

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2013	Giovane	2	1,5	0,7	28	3,8	3,3	20	5,1	3,9	6	5,8	4,2	56	4,4	3,6
	Femmina adulta	5	6,0	1,6	44	3,5	3,7	39	3,2	2,6	26	4,5	3,7	114	3,8	3,3
	Maschio adulto	7	3,3	2,5	35	4,3	4,1	32	5,5	4,3	22	2,9	2,2	96	4,3	3,8
	Totale	14	4,0	2,5	107	3,9	3,7	91	4,4	3,7	54	4,0	3,3	266	4,1	3,6
2014	Giovane				30	4,3	3,8	7	3,7	2,9	6	2,8	1,8	43	4,0	3,5
	Femmina adulta				34	2,7	2,0	30	2,7	1,6	20	5,0	3,2	84	3,2	2,4
	Maschio adulto				29	2,7	2,1	26	3,5	1,8	15	3,7	4,3	70	3,2	2,6
	Totale				93	3,2	2,8	63	3,1	1,9	41	4,2	3,5	197	3,4	2,8
2015	Giovane				17	3,9	3,0	6	3,7	2,1	4	7,0	2,8	27	4,3	2,9
	Femmina adulta				29	4,1	3,2	25	5,7	5,3	16	4,3	3,6	70	4,7	4,2
	Maschio adulto				24	3,0	2,6	21	5,5	3,0	12	3,2	2,6	57	4,0	2,9
	Totale				70	3,7	3,0	52	5,4	4,2	32	4,2	3,3	154	4,4	3,5
2016	Giovane				9	4,9	4,6	7	5,3	4,2	6	1,3	0,8	22	4,0	4,0
	Femmina adulta				20	2,9	2,0	20	4,5	4,2	14	6,0	6,4	54	4,3	4,4
	Maschio adulto				19	2,8	1,3	14	3,6	2,1	14	3,8	3,3	47	3,3	2,3
	Totale				48	3,2	2,5	41	4,3	3,6	34	4,3	4,8	123	3,9	3,6
2017	Giovane				14	2,8	2,4	5	4,6	3,2	10	5,7	3,4	29	4,1	3,1
	Femmina adulta				18	3,1	3,2	18	3,7	2,8	15	3,6	2,4	51	3,5	2,8
	Maschio adulto				20	2,7	1,8	17	3,9	3,7	10	3,4	2,6	47	3,3	2,8
	Totale				52	2,8	2,5	40	3,9	3,2	35	4,1	2,9	127	3,5	2,9

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

MUFLONE: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	n	x	ds	Stagione	Classe	n	x	ds
2013	Agnello				2016	Agnello			
	Yearling maschio					Yearling maschio			
	Femmina adulta	3	5	1,7		Femmina adulta			
	Maschio adulto	2	3	2,8		Maschio adulto	2	6,5	6,3
	Totale	5	4,2	2,2		Totale	2	6,5	6,3
2014	Agnello				2017	Agnello	1	6	N.D.
	Yearling maschio					Yearling maschio			
	Femmina adulta	3	3,3	2,5		Femmina adulta			
	Maschio adulto	4	7,5	5,2		Maschio adulto	1	1	N.D.
	Totale	7	5,7	4,5		Totale	2	3,5	3,5
2015	Agnello	2	2,0	1,4					
	Yearling maschio								
	Femmina adulta								
	Maschio adulto	3	6,3	4,0					
	Totale	5	3,0	2,8					

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Totale		
		N	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2013	Giovane	3	2,0	1,0	6	7,3	4,3	2	9,5	3,5	1	9	-	12	6,5	4,2
	Daguet				2	2,5	0,7	1	7,0	-				3	4,0	2,6
	Femmina adulta	5	1,4	0,5	11	3,5	1,9	8	5,9	2,2	4	3,2	2,6	28	3,8	2,4
	Miaschio subad.	4	2,5	1,3	4	8	7	2	7	4,2				10	5,6	5,1
	Maschio adulto	1	5	-	2	5,5	3,5							3	5,3	2,5
	Totale	13	2,2	1,3	25	5,2	4,1	13	6,7	2,7	5	4,4	3,4	56	4,8	3,5
2014	Giovane	4	3,8	2,1	3	5,3	3,5	1	3,0	-				8	4,3	2,5
	Daguet							1	1,0	-	1	14,0	-	2	7,5	9,2
	Femmina adulta	6	2,0	1,1	8	3,9	2,9	2	7,0	5,7	1	3,0	-	17	3,5	2,9
	Miaschio subad.	4	4,3	3,9	3	6,3	1,5	1	6,0	-	1	3,0	-	9	5,0	2,8
	Maschio adulto	2	2,0	1,4										2	2,0	1,4
	Totale	16	3,0	2,4	14	4,7	2,8	5	4,8	3,9	3	6,7	6,4	38	4,2	3,2
2015	Giovane	2	1,5	0,7	6	3,2	3,4	4	5,8	5,9	1	1,0	-	13	3,5	4,1
	Daguet	1	8,0	-	2	6,0	4,2							3	6,7	3,2
	Femmina adulta	2	2,5	0,7	12	3,3	2,5	4	5,0	2,4	1	1,0	-	19	3,5	2,4
	Miaschio subad.	3	4,3	2,5	6	4,2	3,4	2	4,0	4,2	2	8,0	9,9	13	4,8	4,2
	Maschio adulto	2	4,5	2,1	2	3,0	1,4	1	2,0	-	1	2,0	-	6	3,2	1,6
	Totale	10	3,8	2,4	28	3,6	2,9	11	4,8	3,9	5	4,0	6,2	54	3,9	3,3
2016	Giovane				8	4,8	3,8	1	9,0	-				9	5,2	3,8
	Daguet							1	3,0	-	1	2,0	-	2	2,5	0,7
	Femmina adulta	3	3,7	4,6	11	5,6	5,1	3	2,0	1,0				17	4,6	4,6
	Miaschio subad.	5	4,4	4,2				2	5,0	2,8	2	13,0	5,7	9	6,4	5,3
	Maschio adulto	7	5,3	4,0	1	3,0	-				2	3,0	2,8	10	4,6	3,6
	Totale	15	4,7	3,9	20	5,2	4,4	7	4,0	2,9	5	6,8	6,5	47	5,0	4,2
2017	Giovane	1	5,0	-		5,8	5,5	2	3,0	2,8				7	4,9	4,3
	Daguet				1	1,0	-	2	4,5	4,9				3	3,3	4,0
	Femmina adulta	2	4,5	2,1	8	2,9	2,0	3	1,7	1,2	2	4,0	4,2	15	3,0	2,2
	Miaschio subad.	3	9,0	5,6	2	7,0	1,4				1	12,0	-	6	8,8	4,0
	Maschio adulto	6	4,5	3,1	2	7,0	2,8				1	2,0	-	9	4,8	3,0
	Totale	12	5,7	3,8	17	4,4	3,5	7	2,9	2,7	4	5,5	5,1	40	4,6	3,6

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NUMERO PRELIEVI SANITARI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO				
BIN			1	1
FA	3		1	4
MA	2		1	3
Totale	5	2	1	8

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO			3		3
FA					
MA					
Totale			3		3

MUFLONE

Classe	VP	Totale
AGN		
BIN		
FA		
MA		
Totale		0

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA					
MS					
MA					
Totale					0

TIPI DI ANOMALIE

CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI				3	2
LESIONE DIVERSE				1	1
PESO			1		1
Totale complessivo			1	4	3

CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI				
PALCO IN VELLUTO				
LESIONI DIVERSE				
PESO		3		3
Totale complessivo		3		3

MUFLONE

Cause	AGN	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE					
FRATTURE/AMPUTAZIONI					
LESIONE DIVERSE					
PESO					
Totale complessivo					0

CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MS	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI						
LESIONE DIVERSE						
PESO						
Totale complessivo						0

Legenda:

GIO = giovane	PR = Prigelato
BIN = yearling	VC = Bassa Val Chisone e Pinerolese
DAG = daguet	VG = Val Germanasca
FA = femmina adulta	VC1 = Bassa Val Chisone 1
MS = maschio subadulto	VC2 = Bassa Val Chisone 2
MA = maschio adulto	

ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP				
BIN				
FA				
MA				
Totale complessivo				

Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP x BIN				
FA x BIN				
FA x MA				
MA x FA				
Totale complessivo				

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
FA				1	1
MA			1		1
Totale complessivo			1	1	2

Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO			1	1	1
FA x GIO					
FA x MA				1	1
MA x GIO					
Totale complessivo			1	1	2

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
DAG			1		1
FA					
MS					
MA					
Totale complessivo			1		1

Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
FAxGIO					
DAGxFA o GIO					
DAGxMA o MS			1		1
MAxFA o GIO					
MAxMS					
MSxMA					
Totale complessivo			1		1

MUFLONE

Classe	VP	Totale
AGN		
YRM		
FA		
MA		
Totale complessivo	0	0

Legenda:

GIO = giovane
 BIN = yearling
 DAG = daguet
 FA = femmina adulta
 MA = maschio adulto
 MS = maschio subadulto
 AGN = giovane
 YRM = yearling maschio
 MACOR = maschio adulto coronato

PR = Prigelato
 VC = Val Chisone
 VG = Val Germanasca
 VP = Val Pellice
 VC1 = Bassa Val Chisone 1
 VC2 = Bassa Val Chisone 2

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza (indicati come non conformi): 1 capriolo femmina adulta in Val Pellice

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: 3 (2 femmine adulte e in giovane) in Val Pellice

ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

Camoscio

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale				
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	
2013	Capretti	3			3				0	1			1	4		0		4
	Yearling	20			20	10			10	10		1	11	40		1		41
	Femmine ad.	23	3	1	27	22			22	9	1		10	54	4	1		59
	Maschi adulti	27			27	26			26	13			13	66		0		66
	Totale	73	3	1	77	58			58	33	1	1	35	164	4	2		170
2014	Capretti	2			2	1			1	1		1	2	4		1		5
	Yearling	14	1		15	9			9	15			15	38	1			39
	Femmine ad.	16	2		18	12			12	23	1		24	51	3			54
	Maschi adulti	23		3	26	13		1	14	23		1	24	59		5		64
	Totale	55	3	3	61	35		1	36	62	1	2	65	152	4	6		162
2015	Capretti			1	1			1	1	2			2	2		2		4
	Yearling	10		3	13	15			15	19		2	21	44		5		49
	Femmine ad.	17		4	21	15		1	16	22	1	2	25	54	1	7		62
	Maschi adulti	19		2	21	13	1	1	15	23			23	55	1	3		59
	Totale	46		10	56	43	1	3	47	66	1	4	71	155	2	17		174
2016	Capretti	2			2						1		1	2	1	0		3
	Yearling	13			13	10			10	14			14	37	0	0		37
	Femmine ad.	18	1	2	21	11	1		12	21		2	23	50	2	4		56
	Maschi adulti	24	2	2	28	13			13	21		1	22	58	2	3		63
	Totale	57	3	4	64	34	1		35	56	1	3	60	147	5	7		159
2017	Capretti	1			1					1			1	2	0	0		2
	Yearling	11			11	8		1	9	9			9	28	0	1		29
	Femmine ad.	21		2	23	11			11	19		1	20	51	0	3		54
	Maschi adulti	17		3	20	10		1	11	13			13	40	0	4		44
	Totale	50		5	55	29		2	31	42		1	43	121	0	8		129

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

Muflone

Stagione	Classe	CONF	ET	SAN	TOT
2013	Agnelli				
	Yearling maschi				
	Femmine adulte	3			3
	Maschi adulti	2			2
	Totale	5			5
2014	Agnelli				
	Yearling maschi				
	Femmine adulte	3			3
	Maschi adulti	2		2	4
	Totale	5		2	7
2015	Agnelli		1	1	2
	Yearling maschi				
	Femmine adulte	2		1	3
	Maschi adulti	2			2
	Totale	4	1	2	7
2016	Agnelli				
	Yearling maschi				
	Femmine adulte				
	Maschi adulti	2			2
	Totale	2			2
2017	Agnelli	1			1
	Yearling maschi				
	Femmine adulte				
	Maschi adulti	1			1
	Totale	2			2

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi, SAN=abbattimenti sanitari

Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa V. Chisone 1				Bassa V. Chisone 2				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2013	Giovani	3			3	6			6	2			2	1		1		12			12
	Daguet				0	2			2	0	1		1			0		2	1		3
	Femmine ad.	5			5	11			11	6	2		8	4		4		26	2		28
	Maschi sub.	4			4	4			4	1		1	2			0		9		1	10
	Maschi adulti	1			1	2			2				0			0		3			3
	Totale	13			13	25			25	9	3	1	13	5		5		52	3	1	56
2014	Giovani	4			4	3			3	1			1			0		8			8
	Daguet	0			0				0	1			1	1		1		2			2
	Femmine ad.	6			6	8			8	1		1	2	1		1		16		1	17
	Maschi sub.	4			4	3			3	1			1	1		1		9			9
	Maschi adulti	2			2				0				0			0		2			2
	Totale	16			16	14			14	4		1	5	3		3		37		1	38
2015	Giovani	2			2	6			6	4			4	1		1		13			13
	Daguet		1		1	1	1		2									1	2		3
	Femmine ad.	2			2	12			12	4			4	1		1		19			19
	Maschi sub.	3			3	4	2		6	2			2	2		2		11	2		13
	Maschi adulti	2			2	1		1	2	1			1	1		1		5		1	6
	Totale	9	1		10	24	3	1	28	11			11	5		5		49	4	1	54
2016	Giovani					8			8	1			1					9			9
	Daguet										1		1	1		1		1	1		2
	Femmine ad.	3			3	11			11	3			3					17			17
	Maschi sub.	4	1		5					1	1		2	2		2		7	2		9
	Maschi adulti	5	1	1	7	1			1					2		2		8	1	1	10
	Totale	12	2	1	15	20			20	5	2		7	5		5		42	4	1	47
2017	Giovani	1			1	4			4	2			2					7			7
	Daguet					1			1	1	1		2					2	1		3
	Femmine ad.	2			2	8			8	3			3	2				15			15
	Maschi sub.	3			3	4			4					1				6			6
	Maschi adulti	6			6	2			2					1				9			9
	Totale	12			12	17			17	6	1		7	4				90			90

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

Capriolo


Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2013	Giovani	2			2	27		1	28	18		3	21	6			6	53		4	57
	Femmine ad.	5			5	43		1	44	38	2		40	26		26	112	2	1	115	
	Maschi adulti	6	1		7	32	3	1	36	32			32	22		22	92	4	1	97	
	Totale	13	1		14	102	3	3	108	88	2	3	93	54		54	257	6	6	269	
2014	Giovani					26		4	30	4		3	7	6		6	36		7	43	
	Femmine ad.					34			34	30			30	19	1	20	83	1		84	
	Maschi adulti					27	1	1	29	25		1	26	15		15	67	1	2	70	
	Totale					87	1	5	93	59		4	63	40	1	41	186	2	9	197	
2015	Giovani					17			17	5		1	6	4		4	26		1	27	
	Femmine ad.					28		1	29	25			25	16		16	69		1	70	
	Maschi adulti					23		1	24	19	2		21	11	1	12	53	3	1	57	
	Totale					68		2	70	49	2	1	52	31	1	32	148	3	3	154	
2016	Giovani					9			9	7			7	6		6	22	0	0	22	
	Femmine ad.					20			20	19		1	20	14		14	53	0	1	54	
	Maschi adulti					18		1	19	13		1	14	13	1	14	44	1	2	47	
	Totale					47		1	48	39		2	41	33	1	34	119	1	3	123	
2017	Giovani					12		3	15	5			5	10			27		3	30	
	Femmine ad.					19			20	18			18	14	1		51	1		52	
	Maschi adulti					20			20	16	1		17	10			46	1		47	
	Totale					54			55	39	1		40	34	1		124	2	3	129	

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI


Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Mufione	Totale complessivo
ANGROGNA	8	5			13
BIBIANA		3			3
BOBBIO PELLICE	38	9		2	49
CANTALUPA		1			1
INVERSO PINASCA		1			1
LUSERNA S. GIOVANNI		2			2
LUSERNETTA		5			5
MASSELLO	2				2
PEROSA ARGENTINA	9	7	7		23
PERRERO	4	24	4		32
PINASCA	8	7			15
PINEROLO		1			1
POMARETTO	1	1			2
PORTE		3			3
PRAGELATO	12		12		24
PRALI	28	8			36
PRAMOLLO		9	3		12
PRAROSTINO		2			2
RORA'		2			2
ROURE	2	4	10		16
S. GERMANO CHISONE		1	4		5
S. PIETRO VAL LEMINA		1			1
SALZA DI PINEROLO	8	2			10
TORRE PELLICE		9			9
VILLAR PELLICE	9	22			31
VILLAR PEROSA		3			3
Totale complessivo	129	132	40	2	303

CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



-  Corsi d'acqua principali
-  Paesi
-  Confini CATO1
-  Aree di caccia specifica
-  Oasi/ZRC
-  Aziende faunistico-venatorie
-  Parchi naturali


CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



0 6 12 Kilometers

-  Corsi d'acqua principali
-  Paesi
-  Confini CATO1
-  Aree di caccia specifica
-  Oasi/ZRC
-  Aziende faunistico-venatorie
-  Parchi naturali

CERVO E MUFLONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



0 6 12 Kilometers

- Corsi d'acqua principali
- Paesi
- Confini CATO1
- Aree di caccia specifica
- Oasi/ZRC
- Aziende faunistico-venatorie
- Parchi naturali

Note: ● Cervu; ● Muflone

**RISULTATI
CACCIA AL CINGHIALE**

CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 25	24 settembre 2017 24 dicembre 2017	LUNEDI' MERCOLEDI' DOMENICA

AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
Val Pellice	87	86	173
Val Chisone, Germ. e Pinerolese	189	156	345
Totale CATO1	276	242	518

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	87	86	173
Pinerolese pedemontano	31	18	49
Val Chisone	107	105	212
Val Germanasca	51	33	84
Totale complessivo	276	242	518

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

Classe di età	Val Pellice				Valli Chisone, Germ. e Pin.				Totale CATO1			
	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%	M	F	Totale	%
0-12 mesi	40	42	82	47,4	72	73	145	42,0	112	115	227	43,8
13-24 mesi	33	33	66	38,2	72	45	117	33,9	105	78	183	35,3
25-36 mesi	4	5	9	5,2	27	22	49	14,2	31	27	58	11,2
oltre 36 mesi	10	6	16	9,2	18	16	34	9,9	28	22	50	9,7
Totale complessivo	87	86	173	100,0	189	156	345	100,0	276	242	518	100,0

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE

Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20170924	DOM	7	5	12	17	16	33	45
20170925	LUN				2	2	4	4
20170927	MER	5	3	8	5	7	12	20
20171001	DOM	5	4	9	9	6	15	24
20171002	LUN							
20171004	MER	4	3	7	6	8	14	21
20171008	DOM	4	3	7	8	4	12	19
20171009	LUN							
20171011	MER		1	1	3	1	4	5
20171015	DOM	1	4	5	9		9	14
20171016	LUN				2	1	3	3
20171018	MER	2	5	7	3	2	5	12
20171022	DOM	1	3	4	8	11	19	23
20171023	LUN							
20171025	MER	6	4	10	5	3	8	18
20171029	DOM	4	2	6	6	4	10	16
20171030	LUN							
20171101	MER	1	4	5	5	4	9	14
20171105	DOM							
20171106	LUN							
20171108	MER							
20171112	DOM							
20171113	LUN							
20171115	MER							
20171119	DOM	4	2	6	9	11	20	26
20171120	LUN				2		2	2
20171122	MER	7	5	12	10	5	15	27
20171126	DOM	2	2	4	4	4	8	12
20171127	LUN	1	1	2	1		1	3
20171129	MER	3	4	7	3		3	10
20171203	DOM	4	2	6	6	1	7	13
20171204	LUN	2		2	8	6	14	16
20171206	MER	11	11	22	14	13	27	49
20171210	DOM	2	2	4	15	16	31	35
20171211	LUN				1		1	1
20171213	MER	4	4	8	6	9	15	23
20171217	DOM				10	10	20	20
20171218	LUN				2	1	3	3
20171220	MER		8	8	5	5	10	18
20171224	DOM	7	4	11	5	6	11	22
Totale complessivo		87	86	173	189	156	345	518

Legenda: F=femmine; M=maschi




= caccia sospesa per incendi

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	31
BIBIANA	10
BOBBIO PELLICE	23
BRICHERASIO	19
CANTALUPA	4
INVERSO PINASCA	3
LUSERNA S. GIOVANNI	17
LUSERNETTA	5
PEROSA ARGENTINA	21
PERRERO	61
PINASCA	37
PINEROLO	10
POMARETTO	13
PORTE	19
PRAGELATO	4
PRALI	9
PRAMOLLO	36
PRAROSTINO	20
ROLETTO	2
RORA'	17
ROURE	55
S. GERMANO CHISONE	17
S. PIETRO VAL LEMINA	11
S. SECONDO DI PINEROLO	2
SALZA DI PINEROLO	1
TORRE PELLICE	24
VILLAR PELLICE	27
VILLAR PEROSA	20
Totale complessivo	518

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'




L'età è espressa in mesi.


TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE CACCIATA NEGLI ANNI



LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE



**RISULTATI
CACCIA ALLE SPECIE DELLA
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2017/2018
(DD.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, n. 14-4867 del 10.4.2017 e n. 33-5669 del 25.9.2017)

SPECIE	SETTORE	CAP PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	12	1 ottobre 2017 29 novembre 2017	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	24		
COTURNICE	VAL PELLICE	12		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	10		

E' vietata la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant, in quanto non sono stati effettuati censimenti specifici per queste specie in queste aree.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
FAGIANO DI MONTE	12	6	50%	24	17	71%	36	23	64%
COTURNICE	12	14	117%	10	8	80%	22	22	100%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	SPECIE	SESSO	ADULTO	GIOVANE	INDET	Totale	
Val Pellice	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	6			6	
	COTURNICE	MASCHIO	6			3	
		FEMMINA	4			1	
		INDET			3	1	2
		TOT		10	3	1	14
Valli Chisone e Germanasca	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	11	6		17	
	COTURNICE	MASCHIO					
		FEMMINA	2			2	
		INDET			6	6	
		TOT	2		6	8	
Totale CATO1	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	17	6		23	
	COTURNICE	MASCHIO	6			3	
		FEMMINA	6	1		7	
		INDET			6	1	7
		TOT	12		9	1	22

Legenda:

M = maschio

F = femmina

IND = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno





CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER
COMPLETAMENTO DEL PIANO

Specie	Distretto	Data completamento piano
Coturnice	Val Pellice	11-ott
Coturnice	Valli Chisone e Germanasca	15-ott





DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Coturnice	Totale
ANGROGNA	3	2	5
BOBBIO PELLICE	1	9	10
MASSELLO		2	2
PEROSA ARGENTINA		1	1
PERRERO	4		4
PINASCA	1	1	2
PRAGELATO	3	4	7
PRALI	7		7
PRAMOLLO	1		1
SALZA DI PINEROLO	1		1
VILLAR PELLICE	2	3	5
Totale complessivo	23	22	45

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA



CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA





DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			Totale CA
		VP	VC	Totale	VP	VC	Totale	
20171001	DOM	1		1	2	3	5	6
20171004	MER	1	4	5	5		5	10
20171008	DOM		3	3	3	2	5	8
20171011	MER		1	1	4	1	5	6
20171015	DOM		3	3	2	2	2	5
20171018	MER	1		1	1	1	1	1
20171022	DOM		1	1	1	1	1	1
20171025	MER	1	1	2	1	1	1	2
20171029	DOM		1	1	1	1	1	1
20171101	MER	1	2	3	1	1	1	3
20171005	DOM							
20171008	MER							
20171012	DOM							
20171115	MER							
20171119	DOM							
20171122	MER		1	1	1	1	1	1
20171126	DOM	1		1	1	1	1	1
20171129	MER				1	1	1	
Totale complessivo		6	17	23	14	8	22	45

VP = Distretto Val Pellice


VC = Distretto Val Chisone e Germanasca

- = caccia chiusa per completamento del piano
- = caccia chiusa per disposizioni regionali
- = caccia chiusa per incendi

TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE



0 6 12 Kilometers

-  Corsi d'acqua principali
-  Paesi
-  Confini CATO1
-  Aree di caccia specifica
-  Oasi/ZRC
-  Aziende faunistico-venatorie
-  Parchi naturali

Note: ● fagiano di monte; ● coturnice

CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2017/2018

Numero giornate e tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	MUFLONE	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA
Meteo						
Sereno	25	32	24	19	26	13
Variabile		1	1		2	
Nuvoloso	3	4	1	3	5	1
Pioggia/Neve	2	2	2		1	
TOTALE	30	39	28	22	34	14

Le giornate conteggiate sono quelle effettive di apertura della caccia alle specie, tenendo conto della sospensiva temporanea per gli incendi e dei prolungamenti per camoscio e cervo.

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia, su pendici esposte a S:

