



**Comprensorio Alpino TO1  
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

**Stagione venatoria 2005/2006**

**RISULTATI E STATISTICHE  
PRELIEVI  
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI  
CINGHIALE  
TIPICA FAUNA ALPINA  
VOLPE**

**A cura di  
Marco Giovo,  
Responsabile tecnico CATO1**

**Bricherasio, 21 febbraio 2006**

**RISULTATI  
CACCIA DI SELEZIONE  
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE	Roure, Perosa Argentina
	VAL GERMANASCA	Perrero (solo sinistra orografica), Massello, Salza di Pinerolo, Prali
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI

SPECIE	DISTRETTO	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	TOTALE GENERALE	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Maschi adulti	31	105	350	8 settembre 2005 5 novembre 2005	GIOVEDI' SABATO
		Femmine adulte	37				
	Giovani dell'anno	37					
	PRAGELATO	Maschi adulti	18	60			
Femmine adulte		21					
BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Maschi adulti	29	95				
	Femmine adulte	33					
VAL GERMANASCA	Maschi adulti	28	90				
	Femmine adulte	31					
CERVO	PRAGELATO	Maschi adulti	11	50	83	20 ottobre 2005 17 dicembre 2005	GIOVEDI' SABATO
		Femmine adulte	19				
	Daguet	5					
BASSA VAL CHISONE	Maschi adulti	6	28				
	Femmine adulte	10					
VAL GERMANASCA	Maschi adulti	1	5				
	Femmine adulte	2					
Daguet	Maschi adulti	1	5				
	Femmine adulte	2					
Giovani dell'anno	Maschi adulti	1	5				
	Femmine adulte	2					
MUFLONE	VAL PELLICE	Maschi adulti	3	10	10	15 settembre 2005 12 novembre 2005	GIOVEDI' SABATO
		Femmine adulte	4				
		Yearling maschi	1				
		Agnelli	2				
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Maschi adulti	23	80	235	15 settembre 2005 12 novembre 2005	GIOVEDI' SABATO
		Femmine adulte	25				
		Yearling	26				
		Capretti dell'anno	6				
	VAL CHISONE	Maschi adulti	14	50			
		Femmine adulte	15				
Yearling		17					
VAL GERMANASCA	Maschi adulti	30	105				
	Femmine adulte	33					
	Yearling	35					
Capretti dell'anno	Maschi adulti	30	105				
	Femmine adulte	33					
Yearling	Maschi adulti	35	105				
	Femmine adulte	33					
Capretti dell'anno	Maschi adulti	7	105				
	Femmine adulte	7					

## **ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI**

Il CA garantisce l'assegnazione di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto.

I criteri per le assegnazioni per la stagione 2005/2006 sono, per le specie Camoscio, Cervo e Muflone i seguenti:

1) assegnazione dei capi maschi adulti individualmente nel numero degli animali nel piano autorizzato dalla Giunta regionale, suddivisi per distretto;

2) assegnazione dei capi delle altre classi, in forma accorpata (per il camoscio "camoscio femmina adulta o yearling o giovane", per il cervo "cervo femmina adulta o daguet o giovane", per il muflone "muflone femmina adulta o yearling maschio o agnello"), fino ad un numero di autorizzazioni pari a 1,5 volte il numero di capi di queste classi nel piano, per ogni distretto, indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi. Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, sorteggio dei capi residui per quella classe ed assegnazione individuale.

Per la specie capriolo viene assegnata la specie con le tutte le classi in forma accorpata "capriolo maschio adulto o femmina adulta o giovane" fino ad un numero di autorizzazioni pari a 1,5 volte il numero di capi nel piano, per ogni distretto, indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra tutte le classi. Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, sorteggio dei capi residui per quella classe ed assegnazione individuale.

Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone per ogni distretto (esclusi i capi maschi assegnati nel numero esatto), in caso di richieste superiori a 1,5 volte del totale delle restanti classi, assegnazione di un numero di capi non maschi pari al numero delle richieste fino al massimo di 2 volte il numero dei capi di queste nel piano di quel distretto. Le assegnazioni per distretto sono fatte secondo la richiesta fino al raggiungimento della soglia stabilita; in caso di un numero di richieste superiore, verrà data priorità ai residenti nei Comuni componenti il distretto; agli eccedenti, individuati per sorteggio, verrà assegnato un altro distretto d'ufficio, oppure un capo di un'altra specie.

Per la specie Capriolo in caso di richieste superiori a 1,5 volte il totale dei capi in un distretto, assegnazione di un numero di capi pari al numero delle richieste fino al massimo di 2 volte il numero dei capi nel piano di quel distretto. Le assegnazioni per distretto sono fatte secondo la richiesta fino al raggiungimento della soglia stabilita; in caso di un numero di richieste superiore, verrà data priorità ai residenti nei Comuni componenti il distretto; agli eccedenti, individuati per sorteggio, verrà assegnato un altro distretto d'ufficio, oppure un capo di un'altra specie.

Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone l'assegnazione del maschio viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi per un distretto, si procede secondo il seguente schema:

1) assegnazione dei maschi a chi nella passata stagione venatoria ha abbattuto un capo sanitario, di qualunque specie, e non ha richiesto o ottenuto un ulteriore capo;

2) assegnazione dei restanti maschi disponibili con precedenza a chi, nella stagione precedente, non ha avuto un maschio adulto assegnato della stessa specie pur avendolo richiesto (in caso di aventi questo diritto in numero superiore al numero di capi maschi ancora disponibili, si procederà per sorteggio);

3) in caso di ulteriori rimanenze, queste si assegneranno a sorteggio;

Solamente in caso di ulteriori rimanenze, potrà essere assegnato un capo maschio a chi, nella passata stagione venatoria, ha eseguito un abbattimento non conforme.

I capi non maschi adulti non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni pari a 1,5 volte il totale di questi capi autorizzati, verranno assegnati successivamente come secondo o terzo capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, ai sensi dell'art. 46 comma 3 della LR 70/96. Per gli assegnatari di un primo capo Camoscio, Capriolo o Muflone, i cui calendari sono

pressoché contemporanei, è ammessa la possibilità di richiedere un secondo o un terzo capo anche di un'altra specie (non Cervo). Per gli assegnatari di un Cervo, il cui calendario di caccia è molto differenziato dalle altre specie, non è ammessa la possibilità di richiedere un ulteriore capo di un'altra specie. Per gli assegnatari di un Cervo in Val Germanasca, distretto il cui calendario di caccia di questo prevede un'apertura anticipata rispetto agli altri settori, l'eventuale richiesta immediata di un secondo capo potrà essere limitata solamente ad un altro Cervo in quel distretto. E' però ammessa la possibilità di richiedere un secondo capo cervo in un altro distretto al momento di concomitanza dei calendari.

L'assegnazione del secondo capo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capriolo giovane, un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del primo capo al Centro di controllo, un secondo capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un secondo capo di altra specie, è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un secondo capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come primo capo, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, un yearling maschio di muflone o di cervo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo.

Il raggiungimento del 90% del prelievo in un distretto per una classe qualunque del Capriolo o per una classe diversa dal maschio adulto nelle altre specie comporta quindi:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati alla caccia a quella specie in quel distretto che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati alla caccia a quella specie in quel distretto che non hanno ancora realizzato il proprio piano.

I primi esclusi nei sorteggi sono gli assegnatari di un secondo capo.

I sorteggi per le assegnazioni individuali sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sulla segreteria telefonica e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In queste comunicazioni sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

In caso di interruzione della caccia ad una specie in un distretto per completamento del piano di prelievo, a coloro che non potranno godere per intero della stagione di caccia alla specie assegnata, nel distretto assegnato, verrà restituito l'anticipo della quota economica già versato per la caccia di selezione (105,00 Euro per il Cervo e 55,00 Euro per tutte le altre specie). Tale rimborso verrà effettuato solo ai possessori di una prima autorizzazione e solamente in caso di interruzione del prelievo prima della quartultima giornata.

L'assegnazione dei capi viene eseguita in locale aperto al pubblico, non appena la Regione comunica l'avvenuta approvazione del Piano di prelievo proposto. Successivamente i risultati delle assegnazioni ed i tempi ed i modi per il ritiro delle autorizzazioni saranno disponibili presso gli uffici del CA.

ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	80	109	99	9	108
	Val Chisone	50	76	76	0	76
	Val Germanasca	105	143	122	21	143
	<b>TOTALE</b>	<b>235</b>	<b>328</b>	<b>297</b>	<b>30</b>	<b>327</b>
Capriolo	Val Pellice	105	158	104	27	131
	Pragelato	60	90	48	21	69
	Bassa val Chisone	95	143	100	26	126
	Val Germanasca	90	135	67	20	87
	<b>TOTALE</b>	<b>350</b>	<b>526</b>	<b>319</b>	<b>94</b>	<b>413</b>
Cervo	Pragelato	50	70	33	2	35
	Bassa val Chisone	28	39	28	2	30
	Val Germanasca	5	9	9	0	9
	<b>TOTALE</b>	<b>83</b>	<b>118</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>74</b>
Mufione	Val Pellice	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

DISTRIBUZIONE DEI SECONDI CAPI ASSEGNATI SECONDO IL TIPO DI PRIMO CAPO CACCIATO

		Il specie assegnata				
		Camoscio	Capriolo	Cervo	Mufione	TOTALI
I specie	Camoscio	27	44		5	76
	Capriolo	3	50		2	55
	Cervo			4		4
	Mufione					
	<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>94</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>135</b>

## CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO 15.9-12.11	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	23	15	65%	30	29	97%	14	11	79%	67	55	82%
FEMMINE AD.	25	27	108%	33	38	115%	15	15	100%	73	80	110%
YEARLING	26	22 (12;10)	85%	35	24 (15;9)	69%	17	17 (10;7)	100%	78	63 (37;26)	81%
CAPRETTI	6	5 (2;3)	83%	7	7 (4;3)	100%	4	2 (1;1)	50%	17	14 (7;7)	82%
<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>69</b>	<b>86%</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>93%</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>90%</b>	<b>235</b>	<b>212</b>	<b>90%</b>
Di cui tiri non conf.		1			1			1			3	
Di cui sanitari		8			7			2			17	

CAPRIOLO 8/9-5/11	Val Pellice			Pragelato			Resto Chisone			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	31	32	103%	18	17	94%	29	29	100%	28	27	96%	106	105	99%
FEMMINE AD.	37	34	92%	21	19	90%	33	30	91%	31	29	94%	122	112	92%
GIOVANI	37	15 (8;7)	41%	21	12 (6;6)	57%	33	9 (6;3)	27%	31	8 (5;3)	26%	122	44 (25;19)	36%
<b>Totale</b>	<b>105</b>	<b>81</b>	<b>77%</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>80%</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	<b>72%</b>	<b>90</b>	<b>64</b>	<b>71%</b>	<b>350</b>	<b>261</b>	<b>75%</b>
Di cui tiri non conf.		1			1									2	
Di cui sanitari		1			0			2			2			5	

CERVO	Pragelato 20.10-17.12			Resto Val Chisone 20.10-17.12			Val Germanasca 10.9-15.10; 26.11-17.12			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	11	4	36%	6	3	50%	1	1	100%	18	8	44%
FEMMINE AD.	19	8	42%	10	4	40%	2	2	100%	31	14	45%
DAGUET	5	2	40%	3	3	100%	1	2	200%	9	7	78%
GIOVANI	15	3 (1;2)	20%	9	3 (3;0)	33%	1	1 (0;1)	100%	25	7 (4;3)	28%
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>34%</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>46%</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>120%</b>	<b>83</b>	<b>36</b>	<b>43%</b>
Di cui tiri non conf.		1			0			0			1	
Di cui sanitari		0			1			0			1	

MUFLONE 15.9-12.11	Val Pellice		
	PRE	REA	%
MASCHI AD.	3	3	100%
FEMMINE AD.	4	2	50%
FUSONI	1	0	0%
AGNELLI	2	3 (3;0)	150%
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80%</b>
Di cui tiri non conf.		0	
Di cui sanitari		0	

Legenda:

PRE=Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue:  $(REA+SAN)/PRE$



CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	23	15	4	65%	30	29	2	97%	14	11	1	79%	67	55	7	82%
FEMMINE AD.	25	27	2	108%	33	38	4	115%	15	15		100%	73	80	6	110%
YEARLING	26	22	2	85%	35	24	1	69%	17	17	1	100%	78	63	4	81%
CAPRETTI	6	5		83%	7	7		100%	4	2		50%	17	14	0	82%
<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>69</b>		<b>86%</b>	<b>105</b>	<b>98</b>		<b>93%</b>	<b>50</b>	<b>45</b>		<b>90%</b>	<b>235</b>	<b>212</b>		<b>90%</b>

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Resto Chisone				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	31	32	1	103%	18	17		94%	29	29	2	100%	28	27	2	96%	106	105	5	99%
FEMMINE AD.	37	34		92%	21	19		90%	33	30		91%	31	29		94%	122	112	0	92%
GIOVANI	37	15		41%	21	12		57%	33	9		27%	31	8		26%	122	44	0	36%
<b>Totale</b>	<b>105</b>	<b>81</b>		<b>77%</b>	<b>60</b>	<b>48</b>		<b>80%</b>	<b>95</b>	<b>68</b>		<b>72%</b>	<b>90</b>	<b>64</b>		<b>71%</b>	<b>350</b>	<b>261</b>		<b>75%</b>

CERVO	Pragelato				Resto Val Chisone				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	11	4		36%	6	3		50%	1	1		100%	18	8	0	44%
FEMMINE AD.	19	8		42%	10	4		40%	2	2		100%	31	14	0	45%
DAGUET	5	2		40%	3	3		100%	1	2		200%	9	7	0	78%
GIOVANI	15	3		20%	9	3	1	33%	1	1		100%	25	7	1	28%
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>17</b>		<b>34%</b>	<b>28</b>	<b>13</b>		<b>46%</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>120%</b>	<b>83</b>	<b>36</b>		<b>43%</b>

MUFLONE	Val Pellice			
	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	3	3		100%
FEMMINE AD.	4	2		50%
FUSONI	1	0		0%
AGNELLI	2	3		150%
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		<b>80%</b>

Legenda:

PRE=Piano previsto  
 REA=Piano realizzato  
 SAN=Capi sanitari

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE





CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%

<b>Specie</b>	<b>Classe</b>	<b>Distretto</b>	<b>Data raggiungimento soglia 90%</b>	<b>Data completamento piano</b>
Camoscio	FA	Val Chisone	29-set	01-ott
Camoscio	CAP	Val Chisone	10-nov	
Camoscio	BIN	Val Chisone	10-nov	
Camoscio	CAP	Val Germanasca		22-ott
Camoscio	FA	Val Germanasca		05-nov
Camoscio	CAP	Val Pellice		17-set
Camoscio	FA	Val Pellice		01-ott
Capriolo	MA	Bassa Val Chisone	27-ott	
Capriolo	FA	Bassa Val Chisone	27-ott	
Capriolo	MA	Pragelato	17-set	
Capriolo	FA	Pragelato	22-ott	
Capriolo	MA	Val Germanasca	13-ott	
Capriolo	FA	Val Germanasca	29-ott	
Capriolo	MA	Val Pellice	08-ott	13-ott
Capriolo	FA	Val Pellice	20-ott	
Cervo	DAG	Bassa Val Chisone		01-dic
Cervo	FA	Val Germanasca		17-set
Cervo	GIO	Val Germanasca		22-set
Cervo	DAG	Val Germanasca		01-dic
Cervo	MA	Val Germanasca		10-dic
Mufione	AGN	Val Pellice		15-ott
Mufione	FUS	Val Pellice		15-ott
Mufione	MA	Val Pellice		27-ott






Legenda:

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio





## CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




## CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO







## CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO







MUFLONE: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAMOSCIO: AGE-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO







CAMOSCIO: SEX-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO







NB: nel piano previsto si ipotizza un prelievo paritario dei sessi nelle classi di yearling e capretti.

## CAMOSCIO AGE-RATIO: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI








## CAMOSCIO SEX-RATIO: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI



NB: nel piano previsto si ipotizza un prelievo paritario dei sessi nelle classi di yearling e capretti.








CAPRIOLO: SEX-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO








NB: nel piano previsto si ipotizza un prelievo paritario dei sessi nella classe dei giovani.

CAPRIOLO: AGE-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO








CAPRIOLO: SEX-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




NB: nel piano previsto si ipotizza un prelievo paritario dei sessi nella classe dei giovani.

CAPRIOLO: AGE-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




MUFLONE: AGE-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




Note: nel piano previsto si ipotizza un numero di yearling femmine pari a quelli di yearling maschi.

MUFLONE: SEX-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




Note: nel piano previsto si ipotizza un rapporto paritario dei sessi negli agnelli.

MUFLONE: SEX-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




Note: nel piano previsto si ipotizza un rapporto paritario dei sessi negli agnelli.

MUFLONE: AGE-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI




Note: nel piano previsto si ipotizza un numero di yearling femmine pari a quelli di yearling maschi.

## CERVO: SEX-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




Note: nel piano previsto si ipotizza un rapporto paritario dei sessi nei giovani.

## CERVO: AGE-RATIO. DIFFERENZA FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO




Note: nel piano previsto si ipotizza un numero di yearling femmine pari a quelli di yearling maschi.

## CERVO: AGE-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI



Note: nel piano previsto si ipotizza un numero di yearling femmine pari a quelli di yearling maschi.





## CERVO: SEX-RATIO. CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI



Note: nel piano previsto si ipotizza un rapporto paritario dei sessi nei giovani.



PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI





Legenda: MM=maschi; FF=femmine

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Pragelato				Val Chisone				Val Germanasca				Val Pellice				Totale CATO1
		GIO	FA	MA	TOT	GIO	FA	MA	TOT	GIO	FA	MA	TOT	GIO	FA	MA	TOT	
20050908	GIO	4	4	4	12	1	9	6	16	1	1	7	9	4	8	8	20	57
20050910	SAB	3	2	6	11		3	5	8	1	5	8	14	1	4	6	11	44
20050915	GIO	1	2	4	7			3	3		4	3	7	1	4	4	9	26
20050917	SAB	1	1	1	3		5	3	8		2		2		2	5	7	20
20050922	GIO						1	2	3	2	5	2	9	1	2	2	5	17
20050924	SAB		1	2	3			3	3	1			1	3	2		5	12
20050929	GIO						1	2	3			2	2		2	1	3	8
20051001	SAB		1		1		2		2			1	1	1	3		4	8
20051006	GIO					1	1		2					1			1	3
20051008	SAB	2	2		4	3	2	2	7	1	4	2	7	1	4	5	10	28
20051013	GIO	1	3		4	1			1	1	1	2	4		1	1	2	11
20051015	SAB		2		2		2		2		4		4		1		1	9
20051020	GIO						2	1	3						1		1	4
20051022	SAB		1		1		1		1		1		1	1			1	4
20051027	GIO					2	1	2	5	1			1					6
20051029	SAB										2		2					2
20051103	GIO					1			1					1				2
20051105	SAB													1				2
Totale complessivo		12	19	17	48	9	30	29	68	8	29	27	64	15	34	32	81	261

MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

GIO = giovane  
TOT = totale distretto



 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Chisone					Val Germanasca					Val Pellice					Totale CATO1	
		GIO	BIN	FA	MA	TOT	GIO	BIN	FA	MA	TOT	GIO	BIN	FA	MA	TOT		
20050915	GIO			7	3	2	12	1	4	6	5	16	3	2	7	2	14	42
20050917	SAB				3	1	4	1		2	2	5	2	4	3	1	10	19
20050922	GIO			1	2		3	1		1		2			4		4	9
20050924	SAB				4	3	7	1		1	3	5		2	6		8	20
20050929	GIO			1	1	1	3		3	1	2	6			1	2	3	12
20051001	SAB			1	2		3		2	2	2	6		1	6		7	16
20051006	GIO					1	1	1	1	4		6					7	7
20051008	SAB	1					1			4	1	5		2		1	3	9
20051013	GIO								2	1		3		1			1	4
20051015	SAB			2			2			1	2	3		2			2	7
20051020	GIO	1	1				2	1	2			3				1	1	6
20051022	SAB							1	2	3		6		1		2	3	9
20051027	GIO								2	1	1	4		4			4	8
20051029	SAB			3		1	4		1	3		4					4	8
20051103	GIO								2	3	1	6		1		2	3	9
20051105	SAB					1	1			5	2	7					8	8
20051110	GIO			1			1		2		4	6					7	7
20051112	SAB					1	1	1	1		4	5		2		4	6	12
Totale complessivo		2	17	15	11	45	7	24	38	29	98	5	22	27	15	69	212	


MA = maschio adulto  
FA = femmina adulta

BIN = yearling  
GIO = giovane

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato

CALENDARIO ABBATTIMENTI MUFLONE

Data	Giorno	AGN	FA	FUS	MA	Totale
20050915	GIO					
20050917	SAB					
20050922	GIO					
20050924	SAB					
20050929	GIO					
20051001	SAB					
20051006	GIO					
20051008	SAB					
20051013	GIO					
20051015	SAB	3		1	1	5
20051020	GIO					
20051022	SAB				1	1
20051027	GIO				1	1
20051029	SAB					
20051103	GIO					
20051105	SAB			1		1
20051110	GIO					
20051112	SAB					
Totale complessivo		3		2	3	8


 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato

Legenda:

MA = maschi adulto  
FA = femmina adulta




FUS = yearling maschio  
GIO = giovane

# CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO





DATA	GIORNO	Pragelato					Val Chisone					Val Germanasca					Totale CATO1
		GIO	DAG	FA	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MA	TOT	
20050910	SAB														1		1
20050915	GIO																
20050917	SAB														1		1
20050922	GIO											1			1		1
20050924	SAB																
20050929	GIO																
20051001	SAB																
20051006	GIO																
20051008	SAB																
20051013	GIO																
20051015	SAB																
20051020	GIO							1			1						1
20051022	SAB																
20051027	GIO	1	1		2	4			2		2						6
20051029	SAB						1				2						3
20051103	GIO																
20051105	SAB				5	5											5
20051110	GIO						1				1						1
20051112	SAB																
20051117	GIO				2	2											2
20051119	SAB																
20051124	GIO						1	1	1		3						3
20051126	SAB				1	1					1						3
20051201	GIO							1			1		2			2	3
20051203	SAB					1			1		1						2
20051208	GIO	1				1											1
20051210	SAB														1	1	1
20051215	GIO	1	1			2											2
20051217	SAB																
Totale complessivo		3	2	8	4	17	3	3	4	3	13	1	2	2	1	6	36

MA = maschio adulto  
 FA = femmina adulta  
 DAG = daguet




GIO = giovane  
 TOT = totale distretto

 = superamento del 90% del piano  
 = piano completato  
 = caccia chiusa





## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI



## CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO






CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO





## CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



GIORNATE IMPIEGATE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

CAMOSCIO

Classe	Parametro	VC	VG	VP	Totale
GIO	N	2	7	5	14
	Media	4,5	2,4	1,2	2,3
	D.S.	4,9	2,5	0,4	2,5
BIN	N	17	24	22	63
	Media	3,1	3,8	3,2	3,4
	D.S.	2,4	2,4	1,9	2,2
FA	N	15	38	27	80
	Media	1,8	3,3	1,9	2,5
	D.S.	0,9	2,1	1,1	1,7
MA	N	11	29	15	55
	Media	3,1	3,2	3,8	3,4
	D.S.	3,4	2,3	2,7	2,6
Conteggio generale		45	98	69	212
Media generale		2,7	3,3	2,7	3,0
D.S. generale		2,5	2,2	1,9	2,2

MUFLONE

Classe	Parametro	VP
AGN	N	3
	Media	1
	D.S.	0,0
FA	N	0
	Media	
	D.S.	
FUS	N	2
	Media	3,5
	D.S.	3,5
MA	N	3
	Media	5,7
	D.S.	3,8
Conteggio generale		8
Media generale		3,4
D.S. generale		3,2

CAPRIOLO

Classe	Parametro	PR	VC	VG	VP	Totale
GIO	N	12	9	8	15	44
	Media	1,8	3,8	2,9	2,2	2,5
	D.S.	1,0	1,7	1,4	1,2	1,5
FA	N	19	30	29	34	112
	Media	2,0	2,8	3,1	2,6	2,7
	D.S.	1,3	1,8	1,6	1,7	1,7
MA	N	17	29	27	32	105
	Media	2,1	2,9	2,4	2,3	2,4
	D.S.	1,1	2,0	1,5	1,8	1,7
Conteggio generale		48	68	64	81	261
Media generale		2,0	2,9	2,8	2,4	2,6
D.S. generale		1,1	1,9	1,5	1,7	1,6

CERVO





Classe	Parametro	PR	BVC	VG	Totale
GIO	N	3	3	1	7
	Media	8,0	4,3	3,0	5,7
	D.S.	4,4	2,1		3,5
DAG	N	2	3	2	7
	Media	5,0	3,0	4,5	4,0
	D.S.	4,2	2,0	2,1	2,4
FA	N	8	4	2	14
	Media	4,3	4,8	2,0	4,1
	D.S.	2,5	3,4	1,4	2,7
MA	N	4	3	1	8
	Media	4,5	4,7	12,0	5,5
	D.S.	2,4	3,8		3,7
Conteggio generale		17	13	6	36
Media generale		5,1	4,2	4,7	4,7
D.S. generale		3,1	2,7	3,9	3,0

Note:





PR=Pragelato  
 VC=Val Chisone  
 VP=Val Pellice  
 VG=Val Germanasca  
 BVC=Bassa Val Chisone

GIO=giovane  
 BIN=yearling  
 FA=femmina adulta  
 MA=maschio adulto  
 DAG=daguet  
 FUS=yearling maschio  
 AGN=agnello

TRENDS DEL NUMERO DI GIORNATE NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO SECONDO IL DISTRETTO



TRENDS DEL NUMERO DI GIORNATE NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO SECONDO LA CLASSE



Note: MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; BIN=yearling; DAG=daguet; FUS=yearling maschio; AGN=agnello; GIO=giovane

## ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

### NUMERO PRELIEVI SANITARI

#### CAMOSCIO

Classe	VC	VG	VP	Totale
GIO				0
BIN	1	1	2	4
FA		4	2	6
MA	1	2	4	7
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

### TIPI DI ANOMALIE

#### CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale	
CONGIUNTIVITE			1	3	1	5
FRATTURE/AMPUTAZIONI				2	4	6
LESIONE DIVERSE				2	2	2
PESO			3	1		4
<b>Totale complessivo</b>			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>17</b>

#### CAPRIOLO

Classe	VC	VG	VP	Totale
GIO				0
FA				0
MA	2	2	1	5
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

#### CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI			4	4
LESIONI DIVERSE				
PESO			1	1
<b>Totale complessivo</b>			<b>5</b>	<b>5</b>

#### CERVO

Classe	PR	VC	VG	Totale
GIO			1	1
DAG				
FA				
MA				
<b>Totale</b>			<b>1</b>	<b>1</b>

#### CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MA	Totale
PESO	1				1
<b>Totale complessivo</b>	<b>1</b>				<b>1</b>

#### Legenda:

GIO = giovane  
 BIN = yearling  
 DAG = daguet  
 FA = femmina adulta  
 MA = maschio adulto

PR = Prigelato  
 VC = Val Chisone  
 VG = Val Germanasca  
 VP = Val Pellice

ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

**CAMOSCIO**

Classe	VC	VG	VP	Totale
CAP				
BIN				
FA		1		1
MA		1	1	3
Totale complessivo		2	1	4

**Legenda:**

GIO = giovane  
 BIN = yearling  
 DAG = daguet  
 FA = femmina adulta  
 MA = maschio adulto

**Tipi di errore**

Classe	VC	VG	VP	Totale
MAxNOMA		1	1	3
FAxYRoCAP		1		1
BIN X FA				
FA X BIN				
CAPO NON AUT.				
Totale complessivo		2	1	4

PR = Prigelato  
 VC = Val Chisone  
 VG = Val Germanasca  
 VP = Val Pellice

**CAPRIOLO**

Classe	PR	VC	VG	VP	Totale
GIO					
FA					
MA		1			2
Totale complessivo		1			2

**Tipi di errore**

Classe	PR	VC	VG	VP	Totale
MAxNOMA		1			2
FA X GIO					
Totale complessivo		1			2

**CERVO**

Classe	VC	VG	PR	Totale
GIO				
DAG				
FA			1	1
MA				
Totale complessivo			1	1





**Tipi di errore**

Classe	VC	VG	PR	Totale
FAxMA			1	1
Totale complessivo			1	1





Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza: -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI SANITARI NEGLI ANNI



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NEGLI ANNI







DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Mufione	Totale complessivo
ANGROGNA	3	9			12
BOBBIO PELLICE	45	24		8	77
BRICHERASIO		3			3
INVERSO PINASCA	3	2			5
LUSERNA S. GIOVANNI		2			2
LUSERNETTA		1			1
MASSELLO	8				8
PEROSA ARGENTINA	10	3	1		14
PERRERO	15	27			42
PINASCA	4	5			9
PRAGELATO	14	48	17		79
PRALI	61	30	5		96
PRAMOLLO		17			17
PRAROSTINO		4			4
ROLETTO		1			1
RORA'		1			1
ROURE	14	28	12		54
S. GERMANO CHISONE		2			2
S. PIETRO VAL LEMINA		4			4
S. SECONDO DI PINEROLO		1			1
SALZA DI PINEROLO	14	7	1		22
TORRE PELLICE	3	16			19
VILLAR PELLICE	18	25			43
VILLAR PEROSA		1			1
<b>Totale complessivo</b>	<b>212</b>	<b>261</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>517</b>


# CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI




# CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# CERVO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



# MUFLONE: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



**RISULTATI  
CACCIÀ AL CINGHIALE**

## CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 5	18 settembre 2005 18 dicembre 2005	MERCOLEDI' DOMENICA

## AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	F	M	Totale
VAL PELLICE	73	71	144
VAL CHISONE, GERM. E PIN.	129	117	246
Totale CATO1	202	188	390

## RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	F	M	Totale
Val Pellice	73	71	144
Pinerolese pedemontano	18	18	36
Val Chisone	87	73	160
Val Germanasca	24	26	50
Totale complessivo	202	188	390

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

Classe di età	Valli Chisone e Germ.				Val Pellice				Totale CATO1			
	F	M	Totale	%	F	M	Totale	%	F	M	Totale	%
0-12 mesi	36	22	58	40,3	52	44	96	39,0	88	66	154	39,5
13-24 mesi	22	29	51	35,4	50	57	107	43,5	72	86	158	40,5
25-36 mesi	8	15	23	16,0	18	8	26	10,6	26	23	49	12,6
oltre 36 mesi	7	5	12	8,3	9	8	17	6,9	16	13	29	7,4
Totale complessivo	73	71	144	100,0	129	117	246	100,0	202	188	390	100,0

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE

Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE
		F	M	TOTALE	F	M	TOTALE	CATO1
20050918	DOM	1	1	2	2	4	6	8
20050921	MER	2		2	7	1	8	10
20050925	DOM	2		4	4	6	10	14
20050928	MER			1		1	1	2
20051002	DOM	3	1	4	4	5	9	13
20051005	MER	1	2	3	2	1	3	6
20051009	DOM	9	6	15	5	5	10	25
20051012	MER	6	2	8	2	1	3	11
20051016	DOM		4	4	5	5	10	14
20051019	MER		1	1		1	1	2
20051023	DOM		2	2	4	3	7	9
20051026	MER	1	3	4	4	1	5	9
20051030	DOM	2	3	5	10	5	15	20
20051102	MER	3	4	7	7	3	10	17
20051106	DOM	5	2	7	5	6	11	18
20051109	MER	2	5	7	4	7	11	18
20051113	DOM	2		2	6	7	13	15
20051116	MER	4		4	3	2	5	9
20051120	DOM	2	5	7	8	7	15	22
20051123	MER	4	3	7	2	2	4	11
20051127	DOM	2	6	8	7	9	16	24
20051130	MER		2	2	6	6	12	14
20051204	DOM	7	7	14	10	10	20	34
20051207	MER	4	4	8	13	7	20	28
20051211	DOM		2	2	4	5	9	11
20051214	MER	7	3	10	3	5	8	18
20051218	DOM	4		4	2	2	4	8
Totale complessivo		73	71	144	129	117	246	390


Legenda: F=femmine; M=maschi



## DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI


Comune	N. capi
ANGROGNA	8
BIBIANA	12
BOBBIO PELLICE	11
BRICHERASIO	5
CANTALUPA	16
FROSSASCO	3
INVERSO PINASCA	10
LUSERNA SAN GIOVANNI	15
LUSERNETTA	21
PEROSA ARGENTINA	13
PERRERO	41
PINASCA	25
PINEROLO	4
POMARETTO	7
PORTE	7
PRALI	2
PRAMOLLO	21
PRAROSTINO	1
RORA'	15
ROURE	70
S. GERMANO CHISONE	3
S. PIETRO VAL LEMINA	12
TORRE PELLICE	16
VILLAR PELLICE	41
VILLAR PEROSA	11
<b>Totale complessivo</b>	<b>390</b>

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'




L'età è espressa in mesi.

## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE



**RISULTATI  
CACCIA ALLE SPECIE DELLA  
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2005/2006

SPECIE	SETTORE	CAPI PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE (solo maschi)	VAL PELLICE	20	2 ottobre 2005 30 novembre 2005	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	40		
PERNICE BIANCA	VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	20		
LEPRE VARIABILE	VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	10		
COTURNICE	VAL PELLICE	18	2 ottobre 2005 30 ottobre 2005	
	VAL CHISONE E GERMANASCA	18		

Il Comitato di gestione del CA, in base alla verifica dei capi abbattuti al termine della giornata del 23 ottobre 2005, su indicazione del Coordinatore faunistico regionale, deve immediatamente procedere alla chiusura dell'attività venatoria alle specie di cui sopra, nel caso in cui il numero di capi presentati sia inferiore o uguale al 50% del piano autorizzato.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

## RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
<b>FAGIANO DI MONTE</b>	20	13	65%	40	30	75%	<b>60</b>	<b>43</b>	72%
<b>PERNICE BIANCA</b>							<b>20</b>	<b>5</b>	25%
<b>COTURNICE</b>	18	21	117%	18	17	94%	<b>36</b>	<b>38</b>	106%
<b>LEPRE VARIABILE</b>							<b>10</b>	<b>0</b>	0%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

## TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	specie	Sesso	AD	JUV	Totale
Valli Chisone e Germanasca	LEPRE VARIABILE	F			
		M			
		TOT	0	0	0
	FAGIANO DI MONTE	M	15	15	30
	PERNICE BIANCA	F	2	1	3
		M	2		2
		TOT	4	1	5
	COTURNICE	F	1		1
		M	3		3
		IND		13	13
TOT		4	13	17	
Val Pellice	FAGIANO DI MONTE	M	6	7	13
	COTURNICE	F	3	2	5
		M	3		3
		IND		13	13
TOT	6	15	21		
Totale CATO1	LEPRE VARIABILE	F			
		M			
		TOT	0	0	0
	FAGIANO DI MONTE	M	21	22	43
	PERNICE BIANCA	F	2	1	3
		M	2		2
		TOT	4	1	5
	COTURNICE	F	4	2	6
		M	6		6
		IND		26	26
TOT		10	28	38	

Legenda:

M = maschio

F = femmina

IND = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno

CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMPLETAMENTO DEL PIANO

Specie	Distretto	Data completamento piano
Pernice bianca	Tutto il CA *	23-ott
Lepre variabile	Tutto il CA *	23-ott
Coturnice	Tutto il CA	23-ott


Note: \* chiusura per disposizioni regionali.

DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE


Comune	Fagiano di M.	Pernice B.	Coturnice	Lapre V.	Totale
ANGROGNA	5		6		11
BOBBIO PELLICE	4		10		14
PEROSA ARGENTINA		1	1		2
PERRERO	4		1		5
PINASCA			2		2
PRAGELATO	4	2	2		8
PRALI	18	2	3		23
PRAMOLLO	2				2
ROURE	2		8		10
TORRE PELLICE			2		2
VILLAR PELLICE	4		3		7
<b>Totale complessivo</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>86</b>

## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA


### Prelievo Fagiano di Monte




### Prelievo Pernice bianca



### Prelievo Coturnice







### Prelievo Lepre variabile









TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA: DISTRETTO VAL PELLICE



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA: DISTRETTO VALLI CHISONE E GERMANASCA





CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			PERNICE BIANCA			LEPRE VARIABILE			Totale CA
		VC	VP	Totale	VC	VP	Totale	VC	VP	Totale	VC	VP	Totale	
20051002	DOM	7		7	6		6	4		4				17
20051005	MER	6		6	3		3							9
20051009	DOM	2	2	4	4	5	9							13
20051012	MER	2		2	2	3	5	1		1				8
20051016	DOM	2	1	3	1	4	5							8
20051019	MER	2	2	4		1	1							5
20051023	DOM	6	2	8	1	8	9							17
20051026	MER	1	1	2										2
20051030	DOM		1	1										1
20051102	MER	1		1										1
20051106	DOM													
20051109	MER		1	1										1
20051113	DOM		1	1										1
20051116	MER													
20051120	DOM	1	2	3										3
20051123	MER													
20051127	DOM													
20051130	MER													
Totale complessivo		30	13	43	17	21	38	5	0	5	0	0	0	86


VP = Distretto Val Pellice

VC = Distretto Val Chisone e Germanasca


 = caccia chiusa per completamento del piano  
 = caccia chiusa per disposizioni regionali

TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA


Fagiano di Monte




Pernice bianca




Coturnice




Lepre variabile




# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI FAGIANO DI MONTE



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI PERNICE BIANCA



# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI COTURNICE



**RISULTATI  
CACCIA ALLA VOLPE**



## PIANO DI PRELIEVO E CALENDARIO 2005/2006

DISTRETTO	PIANO COMPLESSIVO (NUMERO CAPI)	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	<b>200</b>	18 settembre 2005 18 dicembre 2005  8 gennaio 2006 29 gennaio 2006	MERCOLEDI' DOMENICA

A gennaio 2006 la caccia alla Volpe è praticabile solamente in squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 10 cacciatori. E' consentito l'uso del cane, con un massimo di 4 cani per comitiva.

La composizione delle squadre, il giorno ed il luogo di caccia devono essere comunicati per iscritto imbucando un foglio con i dati sopra indicati nelle cassette utilizzabili per i tagliandi per la caccia di selezione, prima di iniziare la battuta di caccia. Utilizzare una delle cassette della valle dove si effettua la battuta. Il luogo di caccia comunicato non potrà essere successivamente variato.

Durante queste battute è vietato l'uso ed il porto di munizione intera.

## RISULTATI PRELIEVO VOLPE

Valle	classe	F	M	IND	TOT	
Valli Chisone, Germanasca e Pinerolese	AD		9	21	30	
	JUV		7	7	14	
	IND					
	TOT		16	28	44	
Val Pellice	AD		8	14	1	23
	JUV		7	6		13
	IND		3			3
	TOT		18	20	1	39
Totale CATO1	AD		17	35	1	53
	JUV		14	13		27
	IND		3			3
	TOT		34	48	1	83


Legenda:

F= femmina; M = maschio


JUV = giovane dell'anno; AD = adulto di 1 o più anni

IND = animale di sesso e/o età indeterminata

## COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DELLA VOLPE



## TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI VOLPE



## CASI DI ROGNA

Anno	N. casi	Capi visitati	%
2001	17	101	16,8
2002	8	79	10,1
2003	2	101	2,0
2004	5	100	5,0
2005	5	78	6,4

CALENDARIO PRELIEVO VOLPE


Data	Giorno	VAL CHISONE, GERM. E PIN.				VAL PELLICE				TOTALE CATO1	
		F	M	IND	TOT	F	M	IND	TOT		
20050918	DOM		2	1		3	1	1		2	5
20050921	MER										0
20050925	DOM		1	1		2		1		1	3
20050928	MER										0
20051002	DOM		1			1	2			2	3
20051005	MER			1		1	1			1	2
20051009	DOM		1			1		1		1	2
20051012	MER			1		1					1
20051016	DOM			1		1		2		2	3
20051019	MER			1		1					1
20051023	DOM			1		1	2			2	3
20051026	MER		2	2		4					4
20051030	DOM			1		1					1
20051102	MER						1			1	1
20051106	DOM		1	3		4		2		2	6
20051109	MER		1	1		2	2			2	4
20051113	DOM			1		1		1		1	2
20051116	MER		1	1		2					2
20051120	DOM		1			1		2		2	3
20051123	MER						1			1	1
20051127	DOM			1		1		2		2	3
20051130	MER			1		1					1
20051204	DOM		1			1		1		1	2
20051207	MER			1		1	1	1		2	3
20051211	DOM							1		1	1
20051214	MER		4	2		6		1		1	7
20051218	DOM			2		2	2		1	3	5
20060108	DOM			1		1	3			3	4
20060111	MER			1		1					1
20060115	DOM			2		2	1	1		2	4
20060118	MER							1		1	1
20060122	DOM			1		1	1	1		2	3
20060125	MER							1		1	1
20060129	DOM										0
Totale			16	28		44	18	20	1	39	83

M = maschio; F = femmina

## DISTRIBUZIONE PRELIEVI DI VOLPE NEI COMUNI

COMUNE	N. VOLPI
ANGROGNA	16
BIBIANA	3
BOBBIO PELLICE	1
CANTALUPA	2
FROSSASCO	5
INVERSO PINASCA	1
LUSERNA S. GIOVANNI	2
LUSERNETTA	4
PEROSA ARGENTINA	4
PERRERO	5
PINASCA	8
POMARETTO	3
PORTE	1
PRAMOLLO	1
PRAROSTINO	4
ROLETTO	4
RORA'	1
ROURE	1
S. GERMANO	3
S. PIETRO VAL LEMINA	2
TORRE PELLICE	2
VILLAR PELLICE	10
Totale complessivo	83

# LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI VOLPE



# CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2005/2006

Numero giornate per tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	MUFLONE	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA	VOLPE
<b>Meteo</b>							
nuvoloso	4	5	5	4	8	6	9
pioggia/neve	1	1	1	1	3	2	4
sereno	12	10	21	12	12	7	16
variabile	1	2	2	1	4	3	4
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>33</b>

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia (su pendici esposte a S):

