



**COMPRESORIO ALPINO TO 1
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA**

Stagione venatoria 2016/2017

**RISULTATI CENSIMENTI
FAUNISTICI UNGULATI**



**A cura di
GIOVO MARCO
Responsabile Tecnico CATO1**

Bricherasio, 14 ottobre 2016

METODICHE DI CENSIMENTO UTILIZZATE

I censimenti sono stati realizzati utilizzando le metodiche previste dalle Linee Guida per la gestione dei Bovidi e dei Cervidi selvatici nella Regione Piemonte approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e si sono svolte avvalendosi di tecnici faunistici qualificati.

Nello specifico sono di seguito descritte le metodiche utilizzate.

Censimenti per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

E' la metodica più utilizzata e consiste in un conteggio esaustivo su ampi territori volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto di indagine.

Questo tipo di censimento è utilizzato per specie ad elevata contattabilità quali Camoscio, Stambecco e Muflone, ma viene applicato, sebbene con sottostime maggiori, anche a specie con abitudini più forestali quali Cervo e Capriolo.

La metodica prevede:

1. l'individuazione dell'areale stabilmente occupato dalla specie;
2. la suddivisione dell'areale individuato in settori. Ogni settore rappresenta un'unità territoriale distinta censibile in un giornata. Per limitare la possibilità di doppi conteggi i confini dei settori corrispondono ad ostacoli naturali e i diversi settori sono censiti di norma in giorni consecutivi;
3. la suddivisione di ogni settore in zone di osservazione, unità territoriali censibili da una squadra di rilevatori in una giornata di censimento. I confini delle diverse zone sono anch'essi rappresentati da ostacoli naturali o artificiali e l'estensione delle stesse varia a seconda della morfologia del territorio e della densità di copertura. Ogni zona di osservazione può essere censita da una squadra mobile di operatori che muovendosi nell'area contano tutti gli animali che osservano o da una squadra fissa che, posta da una posizione dominante, copre visivamente l'intera zona.

Questo tipo di censimento viene realizzato nel periodo dell'anno in cui è massima la contattabilità degli animali direttamente a vista, compatibilmente con le scadenze imposte dalla normativa vigente per la presentazione dei Piani di prelievo numerici agli Ungulati (15 giugno per Muflone, Cervo e Capriolo; 5 luglio per il Camoscio).

Per il Muflone, il Cervo ed il Capriolo censimenti per osservazione diretta sono eseguiti in aprile, (dopo i parti per il Muflone, prima delle nascite per i Cervidi) quando il precoce ricaccio vegetativo dei prati di fondovalle e dei pascoli prospicienti gli alpeggi, inducono gli animali a concentrarsi in queste aree, più favorevoli dal punto di vista alimentare. Questo è infatti il periodo dell'anno in cui l'areale di distribuzione di queste specie è più ridotto e quindi è minore la superficie oggetto di censimento ed il conseguente fabbisogno di operatori. La visibilità all'interno del bosco di latifoglie e larice è inoltre favorita dall'assenza di foglia.

Per il Camoscio conteggi diretti sono eseguiti all'inizio di giugno subito dopo i parti; in questo periodo la montagna è quasi interamente accessibile e si possono già contare i nuovi nati; alle quote più basse è però già presente la foglia e molti animali stazionano in bosco.

Per lo Stambecco, specie non cacciabile, il CA esegue dal 1998 censimenti in luglio dopo i parti sull'areale estivo occupato dalla specie.

Il momento della giornata più favorevole per la realizzazione di questi censimenti è il mattino, nelle prime ore dopo l'alba; conteggi per osservazione diretta dei Cervidi possono essere anche eseguiti la sera, dal tramonto sino a buio.

Censimenti al bramito per osservazione diretta da percorsi e da punti fissi

Le Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ruminanti approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011, precedenti a quelle attualmente in vigore approvate nel 2012, prevedevano l'obbligo di organizzare, con cadenza triennale, operazioni di censimento durante il periodo di bramito, da svolgersi in tutti gli istituti interessati dalla presenza della specie. Lo scopo di questo monitoraggio è quello di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata. Tale disposto non è più contenuto nelle Linee guida in vigore, approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, che prescrivono di valutare la distribuzione in periodo venatorio sulla base dell'analisi critica di presenza e consistenza delle popolazioni nei mesi autunnali (desumibili anche da censimenti al bramito) e dell'analisi della distribuzione spaziale delle serie storiche degli abbattimenti.

Conteggi notturni con faro

Questa metodica di censimento viene utilizzata per il conteggio di Cervidi in primavera (aprile) al primo verde alle quote più basse dove il grado di antropizzazione condiziona fortemente il pascolo fuori dal bosco durante le ore di luce.

In questo periodo i Cervidi sono fortemente attratti dal precoce ricaccio dei prati di fondovalle, ma la vicinanza alle strade ed alle abitazioni ne limita l'attività alle sole ore centrali della notte, e raramente questi animali sono osservabili la sera o il mattino con un tradizionale censimento a vista. La metodica prevede la realizzazione in autovettura a bassa velocità di un itinerario nelle ore centrali della notte (da 2-3 ore dopo il sopraggiungere della totale oscurità, per circa 3 ore) e l'illuminazione delle aree a prato e pascolo ai bordi del percorso con l'ausilio di lampade alogene di adeguata potenza (almeno 500 W) collegate all'automezzo.

Gli animali sono individuabili per il riflesso dell'occhio alla luce del faro e possono essere meglio identificati mediante binocolo.

Questo metodo di censimento non è sicuramente esaustivo (non tutte le zone frequentate dagli animali possono essere raggiunte in automezzo e la superficie di territorio esplorabile in una notte non supera i 500-1.000 ha) ma consente spesso di osservare animali che sfuggono al censimento diretto ed è quindi un'ottima fonte di dati integrativi, se eseguito a distanza di pochi giorni dal censimento generale.

Analisi critica di osservazioni occasionali

Per una stima ancora più puntuale della specie Cervo, vengono raccolte nel periodo primaverile prossimo alla data del censimento diretto, tutte le osservazioni relative alla composizione ed alla presenza dei branchi sul territorio.

In questo modo è possibile talvolta identificare gruppi di animali sicuramente sfuggiti sia al censimento diretto che al conteggio notturno con il faro e ridurre così la sottostima di questi metodi di censimento.

Nella primavera del 2006 tale metodica è stata utilizzata anche per il Muflone in Val Pellice.

1. MUFLONE (*Ovis orientalis*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987 in Val Pellice e dal 1990 in Val Chisone.

1.1 DISTRETTO VAL PELLICE

METODICA APPLICATA

Viene effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile (censimento ufficiale al Muflone) alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza dal 1998 con il Capriolo;
2. dal 1998, un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio, allo scopo di monitorare i mufloni gravitanti al di fuori dell'Oasi di protezione "Barant".

Nel 2006, oltre ai due censimenti sopra esposti, è stato realizzato anche un monitoraggio intensivo fra la metà di aprile e la metà di maggio.

1.1.1 CONTEGGIO INIZIO-PRIMAVERILE

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita è quella occupata dalla specie nel periodo inizio primaverile nel territorio della Val Pellice (Comune di Bobbio Pellice).

Superficie censita prevista ha	3.062
Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha	1.702
Numero zone previste	28
Superficie censita coperta ha	1.599
Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha	802
Numero zone coperte	19
S.U.S. Distretto Muflone ha (dati OGUR)	7.126
% di S.U.S. censita	22,4

DATA

Calendario programmato:

Val Pellice
9/4

Calendario effettivamente realizzato:

Date	Zone coperte
9/4	19

PARTECIPANTI

Data	9/4
N. zone	19
Totale operatori	28
Tecnici faunistici CA	
Coordinatore regionale	
Soci CA	28
Agenti venatori prov.	
Guardie volontarie	

Agenti CFS	
Guardiaparco	
Laici	

ORARI DEL CENSIMENTO

Data	9/4
Località ritrovo	Bivio Rif. Barbara
Ora ritrovo	5,45
Inizio operazioni	Alba
Fine operazioni	9,00

METEO

Data	9/4
Cielo	Sereno
Precipitazioni	Fino a poco prima del ritrovo
Vento	Assente
Visibilità	Discreta
Quota neve vers. S m.s.l.m.	1.800
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.500
Meteo giorno precedente	Variabile

RISULTATI

N.	Zona	Totale	Agnelli 2016	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
1	Saret-Forest	0					
2	Romana - Colletto - Faugiau	0					
3	Carbonieri - Pautas	0					
4	Fragnun	0					
5	Crosette - Comba Lausa	0					
6	Vallone della Bruna	0					
7	Cumbal d'la Roussa - Fautet	0					
8	Pralapia - Bosso	0					
9	Giaven - Cialancie	0					
10	Selle - Ponset	0					
11	Barbara - Content	NE	4			5	9
12	Barant	NE					
13	Inverso di Bobbio	NE					
14	Malbec - Lauset	0					
15	Rostagni - Eiretta	2			2		
16	Saret - Eiretta - Forest	NE					
17	Cairus - Bariund	0					
18	Biava - Imeut	2			2		
19	Vallone di Eyssart	0					
20	Villanova- Randulire	0					
21	Chiot - Cernira - Maisons	NE					
22	Mirabucas	0					
23	Chiot-Pera Tajà	4				4	
24	Crosenna	3				3	
25	Mirabucas - Gias d'Urs	NE					
26	Pra Curnaliot	NE					
27	Pra Agriturismo	NE					
28	Pra Partia d'amunt	NE					
	TOTALE	29	4	0	4	12	9

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Agnelli 2016	Yearling Maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	29	4	0	4	12	9
TOTALE	29	4	0	4	12	9

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Agnelli 2016	Yearling maschi	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	Barant	802	22	4	--	4	5	9
	TOTALE	802	22	4	--	4	5	9

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Superficie censita ha	1.599
N. mufloni censiti	29
Densità (capi/100 ha)	1,8
Densità pre-parti (capi/100 ha)	1,6
Sex-ratio (FF/MM) *	3,0
Agnelli/100 femmine adulte**	13,8
Incremento 2016 (% agnelli)	31,0
% mufloni in Oasi	75,9

* comprendendo nel numero dei maschi anche gli yearling maschi

** in questo caso intese come femmine di 2 o più anni (dal totale delle femmine adulte censite è stato sottratto il numero delle presunte femmine yearling, inteso pari al numero di maschi yearling – alla nascita la sex-ratio è considerata paritaria)

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.	Densità pre-parto
1996	6/5	14	1.273	142	52	68	9	13	0	10,1
1997	27/4	16	1.919	144	41	63	7	32	1	5,8
1998	11/4	24	2.120	180	31	82	14	45	8	6,4
1999	10/4	24	2.204	280	66	135	19	48	12	10,5
2000	8/4-2/5	27	2.895	245	76	109	13	42	5	7,0
2001	14/4	28	3.014	244	52	125	18	49	--	6,5
2002	6-7/4	26	2.791	206	88	80	15	31	7	6,2
2003	5/4	27	2.944	122	43	54	6	4	15	4,1
2004	24/4	22	1.872	144	38	82	2	10	12	7,2
2005	9/4	22	1.885	81	32	37	2	10	--	3,8
2006	8/4	20	1.985	109	41	48	6	14	--	4,8
2007	14-15/4	20	1.779	110	37	46	4	20	--	5,1
2008	13/4	22	1.964	135	41	49	7	27	11	5,5
2009	25/4	20	1.671	108	25	45	8	19	11	6,4
2010	10/4	17	1.444	76	20	44	4	7	1	4,8
2011	9/4	17	1.381	74	27	31	7	3	6	5,3
2012	21/4	19	1.535	93	29	38	16	8	1	5,6
2013	13/4	20	1.520	85	20	44	6	10	5	4,9
2014	5/4	19	1.517	42	13	20	4	1	4	2,7
2015	11/4	17	1.360	35	12	17	4	1	1	2,5
2016	9/4	19	1.599	29	4	12	--	4	9	1,6

Note: dati di consistenza 2006 ricavati dal monitoraggio intensivo; la densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (agnelli).

Di cui osservati nell'Oasi del Barant:

Anno	Superficie censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Yearlings maschi	Agnelli	Indet.
1999	1.430	266	81	127	--	46	12
2000	1.653	219	73	91	11	40	4
2001	1.677	210	44	107	16	43	--
2002	1.622	182	72	58	14	31	7
2003	1.622	75	27	41	1	4	2
2004	1.097	125	32	73	1	7	12
2005	1.214	61	19	30	2	10	--
2006	1.097	93	35	40	6	12	--
2007	977	100	36	39	4	18	3
2008	1.009	113	31	43	7	26	6
2009	874	82	19	38	8	15	2
2010	842	48	14	27	2	4	1
2011	778	51	21	18	5	1	6
2012	778	78	23	31	15	8	1
2013	866	61	10	33	5	8	5
2014	874	24	9	10	1	..	4
2015	719	20	10	6	3	--	1
2016	802	22	4	5	--	4	9

Note: dati di consistenza 2006 ricavati dal monitoraggio intensivo

1.1.2 CONTEGGIO TARDO-PRIMAVERILE

Durante il censimento del Camoscio nel distretto Val Pellice (11-12 giugno 2016), sono state registrate le seguenti osservazioni di mufloni:

N.	Zona	Totale	Agnelli 2016	Yearling Maschi	Maschi	Femmine	Indet.
10	Fagnun – Garin	NE					
11	Bruna – Cumbal d'le Nivie	NE					
12	Roussa – Fautet	0					
13	Col Barant	9	2		2	5	
14	Biava - inverso Barant	0					
15	Barbara - Punta Pleng	16	4	1	2	9	
16	Cianai di Coi	0					
17	Arbancie – Manzol – Armoine	0					
18	Pian Sineive – Vittona - Colle vecchio	7	1		3	3	
19	Agugliassa – Comba Meutira	2		2			
20	Rif. Granero – Lago Nero	NE					
21	Cumbalas - Genebrera	0					
22	Punta Pleng	0					
23	Col Porsel – Pra Agriturismo	10		1			9
24	Colle della Croce	2				2	
25	Barant vers. Pra	0					
26	Bars di Arè	0					
30	Crosenna – Content - Resiassa	3	1		1	1	
31	Villanova – Prà	0					
32	Vallone della Pissa *	0					
33	Colletta delle Faure	0					
34	Burfarant - Bariund	NE					
34b	Eyssartet-Bariund	0					
	Totale	49	8	4	8	20	9

Note: la numerazione delle zone è quella del censimento del Camoscio distretto Val Pellice

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Agnelli 2016	Yearling maschi	Maschi ad.	Femmine ad.	Indet.
Val Pellice	49	8	4	8	20	9
TOTALE	49	8	4	8	20	9

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Totale	Agnelli 2016	Yearling maschi	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	Barant	37	6	4	4	14	9
	TOTALE	37	6	4	4	14	9

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	103	21	13	6	63
1999	93	28	40	25	--
2000	120	44	41	25	10
2001	99	35	35	22	7
2002	157	57	66	29	5
2003	94	46	30	16	2
2004	127	40	37	12	38
2005	73	43	19	4	7
2006	83	34	36	13	--
2007	110	40	47	21	2
2008	77	33	30	11	3
2009	78	29	35	14	--
2010	62	21	25	12	4
2011	109	17	61	22	--
2012	95	47	40	8	--
2013	92	25	42	23	2
2014	48	23	12	4	9
2015	51	18	17	12	4
2016	49	12	20	8	9

di cui in oasi di protezione (Barant):

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1998	69	17	7	2	43
1999	82	25	35	22	--
2000	109	38	39	22	10
2001	87	32	30	18	7
2002	142	55	57	25	5
2003	79	39	23	15	2
2004	122	39	35	10	38
2005	66	42	16	1	7
2006	70	30	31	9	--
2007	86	35	34	15	2
2008	61	31	19	8	3
2009	52	20	22	10	-
2010	51	16	20	11	4
2011	65	12	37	10	--

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
2012	88	41	39	8	--
2013	70	22	31	15	2
2014	20	10	5	0	5
2015	51	18	17	12	4
2016	37	8	14	6	9

1.2 RESTO DEL CA

Per il resto del CA ove è presente la specie (Val Chisone) dal 1997 al 1999 è stato effettuato un doppio censimento, con:

1. un primo conteggio inizio-primaverile alla ripresa vegetativa e dopo i parti, mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con Capriolo e Cervo (ed in contemporanea o a pochi giorni di distanza dal censimento del Muflone dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian");
2. un secondo conteggio tardo-primaverile sempre mediante osservazione diretta all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili, in concomitanza con il Camoscio;

L'area censita è quella occupata dalla specie nei periodi in esame (metà aprile, fine maggio-inizio giugno) nel territorio della Val Chisone non compreso entro i confini della sopracitata dell'Azienda Faunistico-venatoria "Albergian" e del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè (Comuni di Pragelato e Roure).

Dal 2000 viene individuato per la specie solamente più un distretto di caccia in Val Pellice e viene quindi sospesa, vista l'esiguità di animali presenti, la caccia all'ovino in Val Chisone (decisione già peraltro adottata nella stagione 1999/2000).

Nel 2016, durante i conteggi al Camoscio, al Cervo e Capriolo, non si sono raccolte osservazioni inizio-primaverili (aprile) di Muflone in Val Chisone. A Pragelato durante il censimento al canto della Pernice bianca del 28 maggio non sono stati osservati animali, nè durante il censimento del Camoscio del 18 giugno. In Val Germanasca durante il conteggio del Camoscio del giorno successivo non sono stati avvistati mufloni ma durante i censimenti estivi con i cani dei galliformi e nelle prime giornate di caccia di selezione sono stati avvistati fino ad una ventina di animali in zona Lago verde//Gran Guglia.

Riassunto osservazioni inizio-primaverili:

Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
--	--	--	--	--

Riassunto osservazioni tardo-primaverili:

Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
--	--	--	--	--

Confronto con gli anni precedenti - censimento inizio-primaverile:

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1996	N.E.	--	--	--	--	--
1997	19-20/4	22	22	--	--	--
1998	18-19/4	4	4	--	--	--
1999	Aprile	10	8	1	1	--
2000	Feb-Apr	6	6	--	--	--
2001	Mar-Apr	9	3	--	--	6
2002	Mar-Apr	--	--	--	--	--

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
2003	Mar-Apr	--	--	--	--	--
2004	Mar-Apr	--	--	--	--	--
2005	Aprile	--	--	--	--	--
2006	Aprile	--	--	--	--	--
2007	Aprile	--	--	--	--	--
2008	Aprile	--	--	--	--	--
2009	Aprile	--	--	--	--	--
2010	Aprile	--	--	--	--	--
2011	Aprile	--	--	--	--	--
2012	Aprile	--	--	--	--	--
2013	Aprile	--	--	--	--	--
2014	Aprile	--	--	--	--	--
2015	Aprile	--	--	--	--	--
2016	Aprile	--	--	--	--	--

Confronto con gli anni precedenti - censimento tardo-primaverile:

Anno	Data	Totale	Maschi	Femmine	Agnelli	Indet.
1996	16/6	65	20	--	--	45
1997	7/6	45	23	11	9	2
1998	6/6	8	3	3	2	--
1999	5-15/6	13	7	3	--	3
2000	17-24/6	53	2	5	2	44
2001	17-22/6	--	--	--	--	--
2002	22-23/6	14	--	--	--	14
2003	21/6	14	7	--	--	7
2004	19/6	17	9	--	--	8
2005	Giugno	--	--	--	--	--
2006	Giugno	--	--	--	--	--
2007	Giugno	--	--	--	--	--
2008	Giugno	18	2	--	--	16
2009	Giugno	--	--	--	--	--
2010	Giugno	--	--	--	--	--
2011	Giugno	--	--	--	--	--
2012	Giugno	18	7	9	1	--
2013	Giugno	--	--	--	--	--
2014	Giugno	10	2	6	2	--
2015	Giugno	8	1	6	1	--
2016	Giugno	--	--	--	--	--

COMMENTO

Il risultato del censimento inizio-primaverile del 2016 ha rivelato un nuovo minimo storico di animali osservati per la colonia di Muflone della Val Pellice.

E il dato è pure integrato con osservazioni di animali raccolte nei giorni successivi al censimento.

Ancora una volta, fortunatamente, le osservazioni raccolte durante il censimento del Camoscio sono leggermente più incoraggianti e confermerebbero una certa stabilità numerica della colonia, almeno negli ultimi tre anni.


Viene confermato quindi quanto già emerso negli ultimi anni, ovvero che si osservano più mufloni durante il censimento del Camoscio che durante il censimento specifico ad aprile, in controtendenza con quanto mostrato in precedenza.

Questo indica una fortissima sottostima del censimento di aprile, quando gli animali sono concentrati a quote basse in aree fortemente boscate, ma anche il conteggio "estivo" è certamente

poco preciso, soprattutto per alcune aree esterne all'Oasi del Barant, dove gli animali gravitano spesso al limite di zone boscate o non monitorate con il censimento del Camoscio; deve pertanto presumersi che la colonia, senz'altro ridottasi numericamente nel corso degli anni, abbia certamente una consistenza maggiore di quella stimata.

La pressione venatoria non incide comunque assolutamente sulla dinamica di popolazione della specie, vista l'esiguità del numero di capi abbattuti.

Risultati dei censimenti del Muflone dal 1996 al 2016



Note: dato aprile 2006 capi censiti Val Pellice derivante dal monitoraggio intensivo

2. CERVO (*Cervus elaphus*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1989 in Val Chisone (Pragelato, Roure, Perosa Argentina), dal 1995 in Val Germanasca (Massello, Salza di Pinerolo, Prali, Perrero) e dal 2005 anche in Bassa Val Chisone (S. Germano, Pramollo, Prarostino, Inverso Pinasca e Pinasca).

METODICHE APPLICATE

Dal 1999 sono applicate, per il censimento del Cervo, due metodiche:

- un conteggio primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in quest'occasione viene effettuato anche il censimento del Capriolo nelle Valli Chisone e Germanasca);
- osservazioni notturne con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone e in Val Germanasca allo scopo di integrare i dati ricavati con la precedente metodica in un ambiente boscato e antropizzato difficile da censire a vista.

Vengono altresì vagliate le osservazioni di gruppi di Cervi relative ai giorni immediatamente antecedenti e seguenti i suddetti censimenti allo scopo di eventualmente integrare i dati raccolti.

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita nel 2016 comprende per intero quella occupata dal Cervo nell'ambito del CATO1 nel periodo in esame e interessa il territorio dei Comuni di Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Perrero, Salza di Pinerolo, Prali, Pramollo, San Germano e Inverso Pinasca.

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone e Val Germanasca			
Settore	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Val Germanasca	Bassa Val Chisone 2	TOTALE
Superficie censita prevista ha	3.661	4.968*	4.627*	3.018*	16.274*
Superficie censita prevista in Oasi/ZRC ha	0	0	0	0	0
Numero zone previste	17	19+3	36+4	13+3	85+10
Superficie censita coperta ha	3.661	4.809+159	3.594+149	1.421+1.292	15.083
Superficie censita coperta in Oasi/ZRC ha	0	0	0	0	0
Numero zone coperte	17	19+3	26+4	10+3	72+10
S.U.S. Cervo ha (dati OGUR)	4.841	5.911	13.922	5.512	30.186
% di S.U.S. censita	75,6	84,0	26,9	47,4	50,0

Note: * = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro. Il numero di zone indicato dopo il "+" è riferito alle zone censite con il faro.

2.1 CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

DATE

Calendario programmato:

Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Val Germanasca	Bassa Val Chisone 2
16/4	16/4	17/4	17/4

Calendario effettivamente realizzato (solo censimenti diurni):

Date	Numero Zone				TOTALE
	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca	
16/4	17	19			36
24/4			10	26	36
TOTALE	17	19	10	26	72

METEO (solo censimento diurno e solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone 1	Bassa Val Chisone 2	Val Germanasca
Data	16/4	16/4	24/4	24/4
Cielo	Nuvoloso	Nuvoloso	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Moderato	Debole	Moderato	Moderato
Visibilità	Appena sufficiente	Pessima	Buona	Buona
Quota neve vers. S m.s.l.m.	2.000	2.000	2.200	2.200
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.700	1.700	1.800	1.800
Meteo giorno precedente	Variabile	Variabile	Pioggia	Pioggia

PARTECIPANTI (solo censimento diurno)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone1	Bassa Val Chisone2	Val Germanasca	Totale
Data	16/4	16/4	24/4	24/4	
N. zone	17	19	10	26	72
Totale operatori	34	43	14	46	137
Tecnici faunistici CA	1	1	1	1	4
Coordinatore reg.					
Soci CA	33	42	13	44	132
Agenti venatori prov.					
Guardie volontarie					
Agenti CFS					
Guardaparco					
Laici				1	1

ORARIO DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Pragelato	Bassa Val Chisone1	Bassa Val Chisone2	Val Germanasca
Data	16/4	16/4	24/4	24/4
Località ritrovo	Pragelato	Perosa A.	S.Germano	Perrero
Ora ritrovo	6,00	5,30	5,30	5,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	8,30	8,30	8,30	8,30

RISULTATI

Distretto Pragelato:

N.	Zona	Totale	Piccoli 15	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Faussimagna-Confini AFVA	9		1	7		1	
2	Buffavento-Soucheres basses	10			7			3
3	Sotto Grand Puy	3	1		1	1		
4	Gran Puy-Lauson	0						
5	Gran Puy-Rocce	6			6			
6	Rif-Allevè	0						
7	Allevè-Villardamont	63	5		3			55
8	Villardamont-Moucrons	21	1		19	1		
9	Giarrasson-Blegier	25	6	2	7	10		
10	Bruns-Bourget	2			1	1		
11	Pitre-Confini CATO2	25	2		20	3		
12	Clot la Soma-Joussaud	14		1	6			7
13	Laval - Cumbal d'la Vulp	6		3			3	
14	Burel	0						

N.	Zona	Totale	Piccoli 15	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
15	Seytes-Confini PNVT	7			7			
16	Dx or. Val Chisone monte	3						3
17	Dx or. Val Chisone valle	1				1		
	TOTALE	195	15	7	84	17	4	68

Settore Bassa Val Chisone 1:

N.	Zona	Totale	Piccoli 15	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Bacino - Confini AFVA	14						14
2	Aigliero	3	1			2		
3	Gleisolle - Faetto - Balma	27	2		5	2		18
4	Madonna della Neve	3					3	
5	Colle della Roussa-Bocciarda	0						
6	Bocciarda - Pelvo	8		3	3	2		
7	Castel del Bosco - Vignal	0						
8	Fondovalle Roure	1				1		
9	Meano - Perosa	0						
10	Vallone di Bocciarda	0						
11	Vallone delle Miniere	6				2		4
12	Pra Fayet - Rocca Nalais	0						
13	Clea	2				2		
14	Bourcet: Cappella - Chasteiran	0						
15	Bourcet: Colet - Serre	20						20
16	Bourcet: Chaulieres	0						
17	Bourcet: Serrodel Comba del Tomo	2					2	
18	Garnier Orti	0						
19	Garnier Monte Morel	1			1			
	TOTALE	87	3	3	9	11	5	56

Settore Bassa Val Chisone 2:

N.	Zona	Totale	Piccoli 15	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
26	Leiretta - Sappè	13	5	2		6		
27	Pianet - Lazzarà	4						4
27b	Ruata - Pianet	0						
28	Buffa - Pralumier - Ribetti	0						
28b	Col Furan	0						
28c	Grange - Pralumier	3	1			2		
29	Clotti - Maison - Dormiglioni	NE						
30	Faetto - Feugiorno	0						
31	Pomeano - Buviera	0						
31b	Oasi Sappè *	0						
32	Pralarossa - Pragiassaud	0						
33	Combaviola - Costa rauta	NE						
34	Perlà - Roca Tumbà	NE						
	TOTALE	20	6	2	0	8	0	4

Settore Val Germanasca:

N.	Zona	Totale	Piccoli 15	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
1	Rocca Galmunt	0						
2	Cugno-Miande	0						
3	Orgere	0						
4	Giordano-Pomieri	0						
5	Bout du Col - Selle e Turè	0						
6	Indritti - Nido dell'Orso	6		1		5		
7	Maiera - Praiet	0						

N.	Zona	Totale	Piccoli 15	Daguets	Maschi	Femmine	Indet. Ad.	Indet.
8	Rodoretto-Crò Allieri	6			2	4		
9	Crò d'la Rama - Rimas	7	1		4	1	1	
10	Balma - Berg. della Balma	NE						
11	Crosetto-Aguglia-Gavalupo	0						
12	Gianna-Gardiola-sotto Fontane	0						
13	Rivoira-Meison-Fontane	8			8			
14	Indritto di Salza *	0						
15	Inverso di Salza - Col. Fontane *	0						
16	Vallone di Salza *	0						
17	Bessè	0						
18	Maniglia	NE						
19	Vallone-Buccetto-Clot des Ors	0						
20	Ciamunie-Praprumie	0						
21	Traverse-Parant	6			2		4	
22	S. Martino - Granero	NE						
23	Muret - Clapier	9	2		1		6	
24	Pomayfre	NE						
24b	Inverso Pomayfre	NE						
25	Airassa - Balbencia	0						
26	Chiotti - Villasecca	0						
27	Bovile	0						
28	Inverso di Perrero	NE						
29	Albarea - Olivieri - Colletto	0						
30	Cassas - Grangette - Pomarat	NE						
31	Crò - Linsard - Faetto - Poet	0						
32	Ricliaretto	9		2	4	3		
33	Enfouns - Clot - Gilli - Fort Luis	NE						
34	Faure-Cerisieri-Torre	2						2
35	Ponte Raut	NE						
	TOTALE	53	3	3	21	13	11	2

2.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO

2.2.1 Settore Bassa Val Chisone 1

Settore Bassa Val Chisone 1

Come dal 1999, è stato realizzato un censimento notturno con l'ausilio del faro in bassa Val Chisone, allo scopo di integrare i dati ottenuti con il censimento a vista.

L'itinerario percorso (il medesimo degli anni precedenti) ha interessato sia territori coperti dal censimento sopra citato, ma anche zone non osservate situate alla destra orografica del torrente Chisone all'altezza di Villaretto, Balma, Castel del Bosco, Selvaggio, Passoir e Perosa Argentina borgate alte.

Data: 13 aprile 2016

Meteo: variabile, un po' di vento

Orario: dalle 21,30 alle 24,00

Comuni interessati: Roure e Perosa Argentina.

Partecipanti: 7 (2 Tecnici faunistici dipendenti del CA, 1 laici e 4 soci del CA).

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
87	13	18	1	8	47

Note: * classe I M/F nati nel 2015; ** classe II M nati nel 2014

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
1999	41	10				31
2000	40	4	2	1	1	32
2001	27	3	2	2		20
2002	63	3	18	2	8	32
2003	50	1	6	1	4	38
2004	106	9	33	2	13	49
2005	94	18	3	5		68
2006	98	7	29	4	15	43
2007	104	9	17	4	11	63
2008	58	4	17		3	34
2009	74	8	20	4	9	33
2010	68	12	10	3	3	40
2011	33	1	12	3	3	14
2012	90	7	11	8	8	56
2013	101	6	23	5	10	57
2014	72	2	34	2	8	26
2015	105	15	36	5	14	35
2016	87	13	18	1	8	47

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **23 animali (4 maschi adulti, 1 daguet, 2 piccoli e 16 indeterminati)**.

2.2.2 Settore Bassa Val Chisone 2

Per il territorio colonizzato dagli animali immessi a scopo di ripopolamento nel febbraio 2002 nel Comune di Pramollo, viene organizzato dal 2005 un censimento notturno con il faro, che interessa alcune aree frequentate in periodo primaverile allo scopo di integrare le osservazioni raccolte durante il censimento al capriolo per osservazione diretta.

Data: 6 aprile 2016.

Meteo: poco nuvoloso.

Orario: dalle 21,30 alle 24,00.

Comuni interessati: San Germano, Prarostino.

Partecipanti: 9 (2 tecnici faunistici dipendente del CA, 3 laico e 4 socio del CA)

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
28	2	5	0	0	21

Note: * classe I M/F nati nel 2015; ** classe II M nati nel 2014

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2005	11	--	3	--	1	7

2006	15	3	7	1	4	--
2007	17	7	7	--	2	--
2008	40	7	11	1	4	17
2009	34	6	7	2	3	16
2010	37	9	9	2	3	14
2011	29	--	19	3	5	2
2012	23	4	9	--	1	9
2013	64	4	15	5	9	31
2014	22	2	2	2	--	16
2015	33	7	3	7	1	15
2016	28	2	5	--	--	21

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **8 animali (5 femmina adulta e 3 indeterminati)**.

2.2.3 Settore Val Germanasca

Allo scopo di integrare le poche osservazioni del censimento diurno per osservazione diretta, dal 2014 si è adottata la tecnica del censimento notturno anche in questo settore.

Data: 20 aprile 2016.

Meteo: poco nuvoloso.

Orario: dalle 21,30 alle 24,00.

Comuni interessati: Pomaretto, Perrero.

Partecipanti: 10 (2 tecnici faunistici dipendente del CA, 5 laici e 3 soci del CA)

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Daguets**	Piccoli *	Indet.
10	6	--	1	--	3

Note: * classe I M/F nati nel 2015; ** classe II M nati nel 2014

Confronto con i censimenti notturni con il faro realizzati negli anni precedenti:

Anno	Totale	Maschi	Femmine	Daguets	Piccoli	Indet.
2014	31	3	5	3	4	16
2015	15	10	4	1	--	--
2016	10	6	--	1	--	3

Confrontando la localizzazione degli animali e la composizione dei branchi, **nessun animale** può essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno.

2.3 OSSERVAZIONI VARIE

Per il settore Val Germanasca sono state raccolte alcune segnalazioni relative ad osservazioni di animali nei giorni immediatamente antecedenti il censimento a vista, in particolar modo relative alla vigilia.

Queste riguardano **13 animali (4 maschi, 2 daguet, 3 femmine e 4 indeterminati)** sicuramente sfuggiti durante le operazioni di censimenti diurno e notturno.

2.4 CENSIMENTO AL BRAMITO

Le ultime Linee Guida per la Gestione degli Ungulati ruminanti approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 non prevedono più l'obbligo di organizzare, con cadenza triennale, operazioni di

censimento durante il periodo di bramito, da svolgersi in tutti gli istituti interessati dalla presenza della specie. Le precedenti Linee Guida approvate con D.G.R. n. 76-2075 del 17.5.2011, riprendendo quelle del 2007, prevedevano quest'obbligo; lo scopo di questo monitoraggio è quello di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata.

Nel settembre 2007 la Regione Piemonte invitava gli istituti interessati dalla presenza del Cervo ad organizzare nel periodo del bramito un censimento per osservazione diretta. Considerate le difficoltà organizzative che impedivano di realizzare un censimento siffatto su vasta scala, visto il ridotto numero di operatori e le poche giornate a disposizione per effetto della già concomitante presenza dell'attività venatoria, si è organizzato un conteggio su area campione, anche allo scopo di saggiare la metodica.

Per il CATO1 l'area prescelta è stata il distretto di Prigelato, con particolare riferimento alla sua porzione in destra orografica, dove maggiori erano le possibilità di osservare animali, più una zona in sinistra orografica dove era stata accertata la presenza di animali alcuni giorni prima del censimento.

Il censimento è stato organizzato in forma sperimentale nel 2007 quindi ripetuto nel 2008, in forma più organica. Nella stessa giornata è stato organizzato un censimento analogo nel Parco Naturale della Val Tronca, nell'Azienda faunistico-venatoria Valloncrò e in una porzione dell'Azienda faunistico-venatoria Albergian.

Nel 2011 il censimento è stato ripetuto essendo trascorso il triennio previsto dalle Linee guida regionali. Purtroppo il forte vento ha certamente influenzato i risultati dei censimenti, penalizzando sia l'osservazione che il contatto acustico con gli animali.

Risultati

Anno	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi	Femmine	Indet.Ad.	Indet.
2007	75	14	3	13	34	11	--
2008	79	20	0	9	28	--	22
2011	19	6	1	2	10	--	--

RIEPILOGO

Distretto/Settore	Totale	Piccoli**	Daguets*	Maschi	Femmine	Indet.
Prigelato	195	15	7	84	17	72
Bassa Val Chisone 1	110	5	4	11	13	77
Val Germanasca	53	3	3	21	13	13
Bassa Val Chisone 2	28	6	2	2	13	5
TOTALI	386	29	16	118	56	167

Note: * classe II M nati nel 2014; ** classe I M/F nati nel 2015; conteggi Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimento notturno; conteggio Val Germanasca comprensivo anche di integrazioni occasionali.

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Distretto	Prigelato	Val Chisone1	V. Germanasca	Val Chisone2	Tot. CATO1
Superficie censita ha	3.661	4.967	3.743	2.712	15.083
N. cervi censiti	195	110	53	28	386
Densità (capi/100 ha)	5,3	2,2	1,4	1,0	2,6
% di indeterminati	36,9	70,0	24,5	17,9	43,3

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguets	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Pragelato	5/5	15	3.679	204	30	9	27	72	66	5,5
	Bassa Val Chisone	5/5	7	1.761	25	3	1	3	12	6	1,4
	Val Germanasca	15/5	9	1.874	13		1		6	6	0,7
	TOTALI		31	7.314	242	33	11	30	90	78	3,3
1997	Pragelato	19-20/4	16	3.679	177	34	19	15	85	24	4,8
	Bassa Val Chisone	19-20/4	9	2.025	39	3	4	7	23	2	1,9
	Val Germanasca	19-20/4	11	2.176	49	5	2	12	19	11	2,3
	TOTALI		36	7.880	265	42	25	34	127	37	3,4
1998	Pragelato	18/4	14	3.679	112	17	6	6	47	36	3,0
	Bassa Val Chisone	18-19/4	16	2.857	43	2	1	4	20	16	1,5
	Val Germanasca	19/4	21	2.695	59	13	1	5	26	14	2,2
	TOTALI		51	9.231	214	32	8	15	93	66	2,3
1999	Pragelato	17/4	15	3.679	140	33	4	6	65	32	3,8
	Bassa Val Chisone	17-18-19/4	19	3.437	76	9	3	12	27	25	2,2
	Val Germanasca	17-18/4	28	3.898	68	2	3	5	27	31	1,7
	TOTALI		62	11.104	284	44	10	23	119	88	2,6
2000	Pragelato	16/4	16	3.723	192	19	9	12	55	97	5,2
	Bassa Val Chisone	13-16/4	18	4.705	63	5	1	7	23	27	1,3
	Val Germanasca	16/4	26	3.974	44	4	2	6	20	12	1,1
	TOTALI		60	11.835	299	28	12	25	98	136	2,5
2001	Pragelato	7/4	17	3.661	154	18	8	15	41	72	4,2
	Bassa Val Chisone	8/4	18	4.872	97	20	2	7	55	13	2,0
	Val Germanasca	8-9/4	30	4.052	54	5	5	6	11	27	1,3
	TOTALI		65	12.585	305	43	15	28	107	112	2,4
2002	Pragelato	30/4	17	3.661	182	26	12	23	55	66	5,0
	Bassa Val Chisone	14-18-20/4	18	4.907	79	10	2	13	29	25	1,6
	Val Germanasca	21/4	24	3.033	24	2	0	6	5	11	0,8
	TOTALI		59	11.601	285	38	14	42	89	102	2,5
2003	Pragelato	18/4	17	3.661	126	14	5	15	38	54	3,4
	Bassa Val Chisone	12-15/4	17	4.699	64	5	1	1	18	39	1,4
	Val Germanasca	13/4	24	3.033	35	4	1	5	15	10	1,2
	TOTALI		59	11.393	225	23	7	21	71	103	2,0
2004	Pragelato	7/5	17	3.661	203	29	13	27	71	63	5,5
	Bassa Val Chisone	17-20-24/4	19	4.968	110	14	3	9	34	50	2,2
	Val Germanasca	18-27/4	23	2.673	23	2	0	2	8	11	0,9
	TOTALI		59	11.302	336	45	16	38	113	113	3,0
2005	Pragelato	7/5	17	3.661	193	27	7	20	62	77	5,3
	Bassa Val Chisone	23-30/4; 4/5	19	4.809	100	3	5	20	14	58	2,1
	Val Germanasca	30/4	19	2.437	14	0	2	3	6	3	0,6
	TOTALI		55	10.907	307	30	14	43	82	138	2,8
2006	Pragelato	22/5	17	3.661	184	71	23	22	17	51	5,0
	Bassa Val Chisone	19-22-23/4	15	4.070	105	34	7	16	4	44	2,6
	Val Germanasca	23/4	21	2.760	38	14	6	1	8	9	1,4
	TOTALI		53	10.491	327	119	36	39	29	104	3,1
2007	Pragelato	21/4	17	3.661	281	41	10	38	72	120	7,7
	Bassa Val Chisone	18-21/4	15	4.640	112	12	5	10	23	62	2,4
	Val Germanasca	21/4	21	2.890	26	0	2	6	10	8	0,9
	TOTALI		57	11.191	419	53	17	54	105	190	3,7
2008	Pragelato	24/4	17	3.661	183	35	5	20	69	54	5,0
	Bassa Val Chisone	16-20/4	15	4.640	87	13	2	5	30	37	1,9
	Val Germanasca	20/4	21	2.890	41			2	3	36	1,4
	TOTALI		57	11.191	311	48	7	27	102	127	2,8

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Superficie censita ha	Totale	Piccoli	Daguetts	Maschi adulti	Femmine adulte	Indet.	Densità Capi/100 ha
2009	Pragelato	18/4	16	3.362	97	15	5	29	32	16	2,9
	Bassa Val Chisone 1	18-22/4	17	4.421	124	12	4	10	28	70	2,8
	Val Germanasca	3/5	20	2.780	31	3		16	8	4	1,1
	Bassa Val Chisone 2	6-9/4		1.337	46	3	2	11	8	22	3,4
	TOTALI		53	11.900	298	33	11	66	76	112	2,5
2010	Pragelato	17/4	15	3.289	55	10	4	17	23	1	1,7
	Bassa Val Chisone 1	17-18-21/4	17	4.421	113	11	7	11	39	45	2,6
	Val Germanasca	18/4	29	4.046	23	0	1	15	6	1	0,6
	Bassa Val Chisone 2	6-8-18/4		2.100	49	7	3	12	13	14	2,3
	TOTALI		61	13.856	240	28	15	55	81	61	1,7
2011	Pragelato	16/4	17	3.661	148	44	26	12	2	64	4,0
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	19	4.968	70	21	4	4	3	38	1,4
	Val Germanasca	17/4	29	3.882	14	2	11	0	0	1	0,4
	Bassa Val Chisone 2	5-7-16-17/4	13	2.297	31	19	2	5	3	2	1,3
	TOTALI		78	14.808	263	86	43	21	8	105	1,9
2012	Pragelato	21/4	16	3.407	175	18	7	27	69	54	5,1
	Bassa Val Chisone 1	17-21/4	21	4.968	130	10	9	7	22	82	2,6
	Val Germanasca	22/4	30	3.991	42	1	1	19	9	12	1,1
	Bassa Val Chisone 2	5-11-22/4	17	3.018	36	1		4	9	22	1,1
	TOTALI		84	15.384	383	30	17	57	109	170	2,5
2013	Pragelato	24/4	15	3.411	154	12	3	41	44	54	4,5
	Bassa Val Chisone 1	15-24/4	10	3.453	127	11	7	10	38	61	3,7
	Val Germanasca	5/5	31	4.060	41	2	1	20	12	6	1,0
	Bassa Val Chisone 2	3-8-10/4	6	2.592	64	9	5	4	15	31	2,5
	TOTALI		62	13.516	386	34	16	75	109	152	2,9
2014	Pragelato	12/4	15	3.334	209	32	6	44	73	54	6,2
	Bassa Val Chisone 1	10-12/4	22	4.968	104	13	3	6	45	37	2,1
	Val Germanasca	13-16/4	34	4.212	56	5	3	12	13	23	1,3
	Bassa Val Chisone 2	3-9-13-18/4	15	2.780	33	1	3	2	4	23	1,2
	TOTALI		86	15.294	402	34	16	75	109	152	2,6
2015	Pragelato	18/4	16	3.362	126	18	2	38	54	14	3,7
	Bassa Val Chisone 1	15-18/4	22	4.968	129	15	7	16	48	43	2,6
	Val Germanasca	16-26-30/4	35	4.212	48	4	3	18	11	12	1,1
	Bassa Val Chisone 2	8-9-18-24/4	14	2.592	36	4	7	7	9	9	1,4
	TOTALI		87	15.134	339	41	19	79	122	78	2,2
2016	Pragelato	16/4	17	3.661	195	15	7	84	17	72	5,3
	Bassa Val Chisone 1	13-16/4	22	4.967	110	5	4	11	13	77	2,2
	Val Germanasca	20-24/4	30	3.743	53	3	3	21	13	13	1,4
	Bassa Val Chisone 2	6-24/4	13	2.712	28	6	2	2	13	5	1,0
	TOTALI		82	15.083	386	29	16	118	56	167	2,6

Note: i risultati 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 distretti Bassa Val Chisone 1 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i risultati 1999, 2000 e 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2015 e 2016 distretto Val Germanasca comprensivi di integrazioni per osservazioni occasionali e quelli del 2014 e del 2015 sono comprensivi di integrazioni per censimento notturno; i dati 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 del distretto Bassa Val Chisone 2 derivano dall'analisi critica di censimenti notturni e di osservazioni condotte durante il censimento al capriolo.

COMMENTO

La primavera 2016 è stata caratterizzata da minor innevamento a quote medie e basse e pertanto da un più precoce ricaccio erbaceo. Come in altre occasioni come questa, si sono pertanto osservati maggiori concentrazioni di animali nei distretti di alta valle (Pragelato) e minori presenze nelle zone di bassa valle.

In queste ultime, inoltre, il ricaccio avanzato, anche nel bosco, ha certamente sfavorito l'osservazione di animali nelle aree aperte, anche durante i monitoraggi notturni con il faro. Pertanto per le aree della Val Germanasca e del settore Bassa Val Chisone 2 il dato è certamente da ritenersi fortemente sottostimato.


Complessivamente l'esito del censimento è positivo e nonostante la flessione di animali conteggiati nel settore Bassa Val Chisone 2 (per i motivi sopra esposti), denota per l'intera Val Chisone una sostanziale stabilità del popolamento di questo cervide.

Le condizioni meteo non proprio ottimali registrate durante le operazioni di censimento del distretto Prigelato e del Settore Bassa Val Chisone 1, che hanno pesantemente condizionato l'osservazione dei caprioli, non hanno invece apparentemente influenzato quella dei cervi, pur eseguita in contemporanea.

Continua la segnalazione, per il secondo anno consecutivo, di un rilevante numero di avvistamenti di cervi in Val Pellice nei giorni/settimane precedenti e successivi il conteggio, nonostante nessuna avvistamento sia stato registrato durante il censimento.

Non meno di una decina di esemplari diversi sono stati osservati fra Bibiana e Lusernetta, e in dx orografica al confine fra Villar Pellice e Bobbio Pellice.

Risultati dei censimenti del Cervo dal 1996 al 2016



3. CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)

Censimenti diretti della specie sono eseguiti annualmente dal 1988 nell'area di Pragelato, dal 1992 in alcune zone della bassa Val Chisone e dal 1998 in Val Germanasca ed in Val Pellice, dove fra il 1994 ed il 1998 sono stati effettuati diversi conteggi in battuta su zona-campione.

METODICHE APPLICATE

Censimento primaverile su ampi territori alla ripresa vegetativa a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili (in concomitanza con il censimento del Cervo in Val Chisone ed in Val Germanasca e con il Muflone in Val Pellice).

I dati della bassa Val Chisone e della Val Germanasca, e della Val Pellice nel 2015, sono integrati con quelli ricavati dalle osservazioni notturne con il faro per il Cervo (cfr. par. 3.2).

AREA OGGETTO DI INDAGINE

Il censimento a vista del Capriolo del 2016 ha interessato la maggior parte delle aree prative e pascolive del CA, comprese entro il territorio di 22 Comuni (Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, San Pietro, Pinerolo, Pramollo, San Germano, Prarostino, Perrero, Pomaretto, Prali, Salza, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Rorà, Lusernetta, Luserna S.G., Bibiana).

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Superficie censita prevista ha	9.184	3.661	10.497 *	4.609	27.951
Superficie in Oasi/ZRC prevista ha	1.740	0	480	95	2.315
Numero zone previste	73	17	39	35	163
Superficie censita coperta ha	6.101	3.661	8.221+1.958	3.594+149	23.684
Superficie coperta in Oasi/ZRC ha	924	0	405	11	1.340
Numero zone coperte	53	17	39+7	31+4	140+11
S.U.S. Capriolo ha (dati OGUR)	22.732	4.177	19.911	12.680	59.439
% della S.U.S. censita	26,8	87,6	51,1	29,5	39,8

Note: * = comprensivo delle aree coperte con il censimento integrativo con il faro (cfr. par. 2.2); ** = 4 zone coperte con il censimento notturno. Il numero di zone indicato dopo il "+" è riferito alle zone censite con il faro.

3.1 CENSIMENTO DIRETTO A VISTA

DATE

Calendario programmato:

Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
9-10/4	16/4	16-17/4	17/4

Calendario effettivamente realizzato (solo censimento diurno):

Date	Numero zone coperte				TOTALE
	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	
9/4	33				33
10/4	20				20
16/4		17	25		42
24/4			14	26	40
TOTALE	53	17	39	26	135

PARTECIPANTI (solo censimento diurno, solo zone valide)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Data	9/4	10/4	16/4	16/4	24/4	24/4	
N. zone	33	20	17	25	14	26	135
Totale operatori	53	43	34	54	25	46	255
Tecnici faunistici CA	2	2	1	1	1	1	8
Coordinatore regionale							
Soci CA	51	41	33	52	24	44	245
Agenti venatori prov.							
Guardie volontarie							
Agenti CFS							
Guardaparco							
Laici				1		1	2

ORARI DEL CENSIMENTO (solo riferiti alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
Data	9-10/4	17/4	17/4	24/4	24/4
Località ritrovo	Villar P. Torre P.	Pragelato	Perosa A.	S. Germano	Perrero Loc.Sabbiona
Ora ritrovo	5,45	6,00	5,30	5,30	5,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

METEO (solo censimento diurno e solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Pellice	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Bassa Val Chisone	Val Germanasca
Data	9/4	10/4	16/4	16/4	24/4	24/4
Cielo	Nuvoloso	Sereno	Nuvoloso	Nuvoloso	Sereno	Sereno
Precipitazioni	Pioggia fino a poco prima	Assente	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Vento	Debole	Debole	Moderato	Debole	Moderato	Moderato
Visibilità	Discreta	Buona	Appena sufficiente	Pessima	Buona	Buona
Quota neve vers. S m.	1.800	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
Quota neve vers. N m.	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
Meteo giorno precedente	Pioggia	Nuvoloso	Variabile	Variabile	Pioggia	Pioggia

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Saret-Forest	0			
2	Romana - Colletto - Faugiau	0			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
3	Carbonieri - Pautas	1			1
4	Fragnun	5	1	4	
5	Crosette - Comba Lausa	1			1
6	Vallone della Bruna	0			
7	Cumbal d'la Roussa - Fautet	0			
8	Pralapia - Bosso	3		2	1
9	Giaven - Cialancie	0			
10	Selle - Ponset	0			
10b	Ponset-Gianna	NE			
11	Barbara - Content	NE			
12	Barant	NE			
13	Inverso di Bobbio	2			2
14	Malbec - Campi - Bariund	4	1	3	
15	Rostagni - Eiretta	1	1		
16	Saret - Eiretta	NE			
17	Cairus - Bariund	6	2	4	
18	Biava - Imeut	5	2	3	
19	Vallone di Eyssart	7	4	3	
20	Villanova- Randulire	7	4	3	
21	Chiot - Cernira - Maisons	NE			
22	Mirabucas	1			1
23	Chiot-Pera Tajà	1	1		
24	Crosenna	0			
25	Mirabucas - Gias d'Urs	NE			
26	Pra Curnalio	NE			
27	Pra Agriturismo	NE			
28	Pra Partia d'amunt	NE			
29	Prapic - Giausarant	1			1
30	Cruel - Armaglie	8	1	6	1
31	Serre Cruel - Albarea - Sarsenà	4		1	3
32	Serre Sarsenà - Rocca Ciabert	5	1	4	
33	Podio - Posette - Vigne	NE			
34	Bessè - Pra la Comba	7	1	5	1
35	Garnier - Mause - Ciampas	NE			
36	Bodeina - Cucuruc - Uccuire	NE			
36b	Fondovalle Bobbio - Villar	40	10	27	3
37	Pertusel *	9	3	3	3
37b	Gardetta - Falconera *	0			
38	Gardetta - Carofrate *	0			
39	Boscas	NE			
40	Peyron - Forestet - Mamauro inf.*	7	4	3	
41	Mamauro di mezzo e sup. - Rami*	5	2	3	
42	Sapichiot*	1	1		
43	Comba Liussa dx or.*	11	2		9
43b	Comba Liussa sx or. *	8	3	3	2
44	Chiotas - Codissard - Mondon	3		1	2
45	Podio - Marsili - Sura	6	2	4	
46	Inverso di Torre Pellice *	6	6		
47	Pellice - Chabriols *	2	1		1
48	Ruà - Sea di Torre *	4	1	3	
48b	Nora - Rossenghi - Novarea	NE			
49	Serre - Oddino - Marchetti *	5	3	1	1
49b	Pramula - SerreMalan - SerreLalie	NE			
50	Buonanotte - Arvura - Maria *	9	4	4	1
51	Costa di Rognosa *	12	4	8	
52	Vaccera - Albarea - Bagnau*	10	5	5	
52b	Mont Servin - Criulira	NE			

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
53	Barfè*	10	5	4	1
54	Cialaroccia - Sapè - Imbergeria	NE			
55	Ciampas - Riaglio - Arcia *	3	1	1	1
56	Tournas - Anchioccia *	3	1	2	
57	Ceresarea - Giasset	NE			
58	Ivert - Ronzei - Fornaci	9	1	5	3
59	Rummer - Peyret - Ciot	5	2	1	2
60	Pian Frollero - La Palà	NE			
60b	Cornour - Aia delle Balme	NE			
61	Bordella	2		2	
62	Villanot - Giavazze - Sea *	11	4	5	2
63	Rorà - Verneis *	3	1		2
64	Pian Porcile	4			4
65	Vista - Forest	4	1	3	
	TOTALE	261	86	126	49

Note: * = zone censite il 10/4; le altre zone sono state censite l'9/4

Distretto Pragelato:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Faussimagna-Confini AFVA	0			
2	Buffavento-Soucheres basses	3			3
3	Sotto Grand Puy	6	1	1	4
4	Gran Puy-Lauson	4	2	1	1
5	Gran Puy-Rocce	1			1
6	Rif-Allevè	4	3	1	
7	Allevè-Villardamont	0			
8	Villardamont-Moucrons	0			
9	Giarrasson-Blegier	0			
10	Bruns-Bourget	5			5
11	Pitre-Confini CATO2	5	2	2	1
12	Clot la Soma-Joussaud	0			
13	Laval - Cumbal d'la Vulp	0			
14	Burel	0			
15	Seytes-Confini PNVT	0			
16	Dx or. Val Chisone monte	0			
17	Dx or. Val Chisone valle	0			
	TOTALE	28	8	5	15

Distretto Bassa Val Chisone:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Bacino - Confini AFVA	0			
2	Aigliero	5		4	1
2b	Fondovalle Villaretto	1	1		
3	Gleisolle - Faetto - Balma	4	2	2	
4	Madonna della Neve	1			1
5	Colle della Roussa-Bocciarda	0			
6	Bocciarda - Pelvo	3	1	2	
7	Castel del Bosco - Vignal	2		2	
8	Fondovalle Roure	6	1	5	
9	Meano - Perosa	12	3	3	6
10	Vallone di Bocciarda	2	1	1	
11	Vallone delle Miniere	4	2		2
12	Pra Fayet - Rocca Nalais	1			1
13	Clea	2		2	
13b	Greisoniere-Roca furà	2	1	1	

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
14	Bourcet:Cappella-Chasteiran	1			1
15	Bourcet: Colet - Serre	7	2	3	2
16	Bourcet: Chaulieres	3	1	2	
17	Bourcet:Serrodel-C.delTorno	0			
18	Garnier Orti	2	1	1	
19	Garnier Monte Morel	1			1
20	Pralamar - Cialmette	5	1	2	2
20b	Rocceria - Cuccetto	4	1		3
20c	Tagliaretto - Grandubbione	2	1		1
21	Grandubbione - Aquila	1	1		
22	Gradubbione-C.le del Besso *	3	2	1	
23	Carla - Col Ceresera *	5	2	3	
24	Crò - Comba la Pera *	2	1	1	
25	Dairin - Ciardonnet*	3	1	2	
26	Leiretta - Sappè *	2		1	1
27	Pianet - Lazzarà *	0			
27b	Ruata - Pianet *	9	2	7	
28	Buffa - Pralumier - Ribetti *	3	2	1	
28b	Col Furan *	7		1	6
28c	Grange-Pralumier *	4	3	1	
29	Clotti - Maison - Dormigliosi	NE			
30	Faetto - Feugiorno *	2		2	
31	Pomeano - Buviera *	3	1	2	
31b	Oasi Sappè *	1		1	
32	Pralarossa - Pragiassaud *	2	1	1	
33	Combaviola - Costarauta	NE			
34	Perlà - Rocca Tumbà	NE			
	TOTALE	117	35	54	28

Note: * = zona censita il 24/4, le altre zone sono censite il 16/4

Distretto Val Germanasca:

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1	Rocca Galmunt *	2	1	1	
2	Cugno-Miande *	0			
3	Orgere	0			
4	Giordano-Pomieri	0			
5	Bout du Col - Selle e Turè	7	1	4	2
6	Indritti - Nido dell'Orso	9	5	4	
7	Maiera - Praiet	2	1		1
8	Rodoretto-Crò Allieri *	10	5	3	2
9	Crò d'la Rama - Rimas *	8	3	5	
10	Balma - Berg. della Balma	NE			
11	Crosetto-Aguglia-Gavalupo	3	2	1	
12	Gianna-Gardiola-sotto Fontane	0			
13	Rivoira-Meison-Fontane *	1	1		
14	Indritto di Salza **	9		4	5
15	Inverso di Salza - Col. Fontane **	NE			
16	Vallone di Salza **	3	1	2	
17	Bessè	4	2	2	
18	Maniglia	NE			
19	Vallone-Buccetto-Clot des Ors	4			4
20	Ciamunie-Praprumie	9	3	5	1
21	Traverse-Parant	6	1	1	4
22	S. Martino - Granero	NE			
23	Muret - Clapier *	10	3	2	5

N.	Zona	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
24	Pomayfrè	NE			
24b	Inverso Pomayfrè	NE			
25	Airassa - Balbencia	2	2		
26	Chiotti - Villasecca	1			1
27	Bovile	2	1		1
28	Inverso di Perrero	NE			
29	Albarea - Olivieri – Colletto	8	3	5	
30	Cassas - Grangette - Pomarat	NE			
31	Crò - Linsard - Faetto - Poet	3			3
32	Ricliaretto	4	3	1	
33	Enfouns - Clot - Fort Luis	NE			
34	Faure-Cerisieri-Torre	10	1	4	5
35	Ponte Raut	NE			
	TOTALE	117	39	44	34

3.2 CENSIMENTO NOTTURNO CON L'AUSILIO DEL FARO

3.2.1 Distretto Bassa Val Chisone e Pinerolese

Come ormai dal 1999, in occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Bassa Val Chisone 1 del 13 aprile 2016 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Roure e Perosa Argentina oggetto del censimento della specie. Sono stati osservati **52 animali (14 maschi, 23 femmine e 12 indeterminati)**.

Risultati

Totale	Maschi	Femmine	Indet.
52	14	23	12

Confronto con gli anni precedenti:

	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
1999	36	12	6	18
2000	78	23	30	25
2001	85	16	19	50
2002	106	19	17	70
2003	74	13	30	31
2004	147	24	26	97
2005	67	9	18	40
2006	112	25	19	68
2007	53	8	8	37
2008	43	14	19	10
2009	86	26	44	16
2010	51	24	22	5
2011	57	16	16	25
2012	92	39	32	21
2013	179	64	68	47
2014	86	27	30	29
2015	75	21	24	30
2016	52	14	23	12

Durante il censimento notturno con il faro per il Cervo nel settore Bassa Val Chisone 2 in data 6 aprile sono stati invece osservati **105 animali (27 maschi, 29 femmine e 49 indeterminati)**, localizzati nel territorio dei Comuni di Prarostino, San Germano, Pramollo, Inverso Pinasca, Pinasca e Villar Perosa.

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **99 animali (31 maschi adulti, 40 femmine adulte e 28 indeterminati)**.

3.2.2 Distretto Val Germanasca

In occasione del censimento notturno al Cervo nel settore Val Germanasca del 20 aprile 2016 è stato effettuato anche il conteggio dei Caprioli osservati. L'area interessa una parte dei Comuni di Pomaretto e Perrero oggetto del censimento della specie.

Sono stati osservati **84 animali (33 maschi, 29 femmine e 22 indeterminati)**.

Confrontando la localizzazione degli animali, possono essere aggiunti ai capi censiti con il conteggio diurno **54 animali (24 maschi adulti, 16 femmine adulte e 14 indeterminati)**.

3.2.3 Distretto Val Pellice

Nessun censimento notturno è stato organizzato quest'anno per il distretto Val Pellice.

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	261	86	126	49
Pragelato	28	8	5	15
Bassa Val Chisone	216	66	94	56
Val Germanasca	171	63	60	48
TOTALE	676	223	285	168

Note: dati distretti Bassa Val Chisone e Val Germanasca comprensivi delle integrazioni per censimenti notturni.

Animali conteggiati in Oasi di Protezione o ZRC:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Maschi	Femmine	Indet.
Pragelato	--	--	--			
Val Pellice	Barant	924	28	7	17	4
	TOTALE	924	28	7	17	4
Bassa Val Chisone	Grandubbione	220	--			
	Perlà -Chiabrera	24	--			
	Sappè	161	1		1	
	TOTALE	405	1	--	1	--
Val Germanasca	Perlà-Chabrera	--	--			
	Rodoretto Audaccia	12	--			
	TOTALE	12	--	--	--	--
TOTALI		1.341	29	7	18	4

Parametri rilevati sulla popolazione censita:

Distretto	Val Pellice	Pragelato	Bassa Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
Superficie censita ha	6.101	3.661	10.179	3.743	23.684
N. caprioli censiti	261	28	216	171	676
Densità (capi/100 ha)	4,3	0,8	2,1	4,6	2,9
Sex-ratio (FF/MM)	1,5	0,6	1,4	1,0	1,3
% indeterminati	22,0	53,6	25,9	28,1	24,9

Confronto con i censimenti precedenti:

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Val Pellice				n.e.					
	Pragelato	5/5	15	3.679	300	73	88	21	118	8,2
	Bassa Val Chisone	5/5	7	1.716	27	6	15		6	1,5
	Val Germanasca				n.e.					
	TOTALI		16	3.767	327	79	103	21	124	6,0
1997	Val Pellice	4/5		88	8	6	5		2	14,8
	Pragelato	19-20/4	16	3.679	295	67	80	25	123	8
	Bassa Val Chisone				n.e.					
	Val Germanasca				n.e.					
	TOTALI		16	3.767	308	73	85	25	125	8,2
1998	Val Pellice	11-26/4	24	2.352	65	22	35	1	7	2,8
	Pragelato	18/4	14	3.679	259	65	91	29	74	7
	Bassa Val Chisone	18-19/4	16	2.857	84	26	39	10	9	2,9
	Val Germanasca	19/4	21	2.695	157	29	39	11	78	5,8
	TOTALI		75	11.583	565	142	204	51	168	4,9
1999	Val Pellice	17-27-30/4; 5/5	38	4.554	146	38	54	5	49	3,2
	Pragelato	17/4	15	3.679	269	75	78	20	96	7,3
	Bassa Val Chisone	17-18-19/4	19	4.181	141	41	48	12	40	3,4
	Val Germanasca	17-18/4	28	3.898	229	65	79	22	63	5,9
	TOTALI		100	16.312	785	219	259	59	248	4,8
2000	Val Pellice	8-9/4; 2/5	60	7.686	303	80	92	22	109	3,9
	Pragelato	16/4	16	3.723	266	56	61	10	139	7,1
	Bassa Val Chisone	15-16-18/4	27	7.143	287	77	116	28	66	4
	Val Germanasca	16-17/4	36	5.280	348	94	130	47	77	6,6
	TOTALI		139	23.832	1.204	307	399	107	391	5,1
2001	Val Pellice	31/3; 1-14/4	63	8.184	369	78	118	42	131	4,5
	Pragelato	11/4	17	3.661	386	118	120	24	124	10,5
	Bassa Val Chisone	24/3; 7-8/4	28	7.326	287	68	82	21	116	3,9
	Val Germanasca	8-9/4	40	5.523	378	90	125	41	122	6,8
	TOTALI		148	24.694	1.420	354	445	128	493	5,7
2002	Val Pellice	6-7/4	63	8.067	375	92	148	72	63	4,6
	Pragelato	30/4	17	3.661	325	68	133	24	100	8,9
	Bassa Val Chisone	14-18-20/4	31	7.665	349	85	125	32	107	4,5
	Val Germanasca	21/4	34	4.504	334	78	95	30	131	7,4
	TOTALI		145	23.897	1.383	323	501	158	401	5,8
2003	Val Pellice	5-6/4	65	8.275	425	124	170		131	5,1
	Pragelato	18/4	17	3.661	265	78	129		58	7,2
	Bassa Val Chisone	12-15/4	31	6.998	299	82	132		85	4,3
	Val Germanasca	13/4	34	4.288	329	98	130		101	7,7
	TOTALI		147	23.222	1.318	382	561		375	5,7
2004	Val Pellice	3-24/4	54	6.378	361	104	148		109	5,7
	Pragelato	7/5	17	3.661	237	52	83		102	6,5
	Bassa Val Chisone	17-18-20-24/4	38	8.167	347	74	113		160	4,2
	Val Germanasca	18-27/4	33	4.245	328	80	101		147	7,7
	TOTALI		142	22.451	1.273	310	445		518	5,7
2005	Val Pellice	9-10-30/4	51	5.953	369	131	160		78	6,2
	Pragelato	7/5	17	3.661	209	67	96		46	5,7
	Bassa Val Chisone	23-30/4; 4/5	32	6.968	294	76	109		109	4,2
	Val Germanasca	30/4	28	3.882	267	85	103		79	6,9
	TOTALI		128	20.464	1.139	359	468		312	5,6

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
2006	Val Pellice	8-9/4	57	6.705	448	118	210		120	6,7
	Pragelato	22/5	17	3.661	277	92	138		47	7,6
	Bassa Val Chisone	19-22-23/4	30	6.599	315	98	111		106	4,8
	Val Germanasca	23/4	30	4.205	308	87	129		92	7,3
	TOTALI		134	21.170	1.348	395	588		365	6,4
2007	Val Pellice	14-15/4	63	7.503	614	199	227		188	8,2
	Pragelato	21/5	17	3.661	256	67	105		84	7,0
	Bassa Val Chisone	18-21-22/4	40	8.359	297	76	110		111	3,6
	Val Germanasca	21-22/4	32	4.352	359	89	161		109	8,2
	TOTALI		152	23.875	1.526	431	603		492	6,4
2008	Val Pellice	12-13/4	66	8.000	758	228	347		183	9,5
	Pragelato	24/4	17	3.661	318	110	140		68	8,7
	Bassa Val Chisone	16-20/4	36	7.711	259	82	124		53	3,4
	Val Germanasca	20/4	32	4.424	366	102	149		115	8,3
	TOTALI		151	23.796	1.701	522	760		419	7,1
2009	Val Pellice	24-25/4	55	6.666	462	159	213		90	6,9
	Pragelato	5/5	16	3.362	145	52	78		15	4,3
	Bassa Val Chisone	18-22-25/4	37	7.602	324	99	160		65	4,3
	Val Germanasca	18-25/4; 3/5	28	3.872	246	64	100		82	6,4
	TOTALI		136	21.502	1.177	374	551		252	5,5
2010	Val Pellice	10-11/4	54	6.667	464	140	209		115	6,9
	Pragelato	27/4	16	3.362	134	50	65		19	4,0
	Bassa Val Chisone	6-8-17-18-21/4	38	9.412	344	101	157		86	3,7
	Val Germanasca	18/4	29	4.046	277	84	86		107	6,8
	TOTALI		137	23.487	1.219	375	517		327	5,2
2011	Val Pellice	9-10/4	56	6.710	507	182	225		100	7,6
	Pragelato	16/4	17	3.661	107	24	52		31	2,9
	Bassa Val Chisone	6-7-13-16-17/4	42	8.527	335	116	133		86	3,9
	Val Germanasca	17/4	29	3.882	218	60	106		52	5,6
	TOTALI		144	22.780	1.167	382	516		269	5,1
2012	Val Pellice	21-22/4	56	6.805	596	190	261		145	8,8
	Pragelato	21/4	16	3.407	107	28	57		22	3,1
	Bassa Val Chisone	5-11-17-21-22/4	46	10.497	354	95	137		137	3,4
	Val Germanasca	22/4	30	3.882	256	60	116		80	6,6
	TOTALI		148	24.591	1.313	373	516		369	5,3
2013	Val Pellice	13-14/4	57	6.783	572	175	236		161	8,4
	Pragelato	24/4	15	3.411	123	32	58		33	3,6
	Bassa Val Chisone	3-8-10-15-24-25/4	31	5.860	461	154	197		110	5,9
	Val Germanasca	5/5	31	4.060	316	88	139		89	7,8
	TOTALI		134	20.114	1.472	449	630		393	6,7
2014	Val Pellice	5-6/4	55	6.577	433	132	198		103	6,6
	Pragelato	12/4	15	3.334	53	14	29		10	1,6
	Bassa Val Chisone	2-9-10-12-13-18/4	47	10.258	347	110	145		92	3,4
	Val Germanasca	13-16/4	34	4.212	233	73	92		68	5,5
	TOTALI		151	24.381	1.066	329	464		273	4,4
2015	Val Pellice	1-11-12/4	53	7.000	355	104	173		78	5,1
	Pragelato	18/4	16	3.362	48	12	19		17	1,4
	Bassa Val Chisone	8-9-15-18-24/4	46	10.060	356	88	154		114	3,5
	Val Germanasca	16-26-30/4; 7/5	35	4.392	178	58	81		39	4,1
	TOTALI		150	24.814	937	262	427		248	3,8

Anno	Distretto	Data	N. Squadre	Sup. censita ha	Totale	Maschi adulti	Femmine adulte	Piccoli	Indet.	Densità Capi/100 ha
2016	Val Pellice	9-10/4	53	6.101	261	86	126		49	4,3
	Pragelato	16/4	17	3.661	28	8	5		15	0,8
	Bassa Val Chisone	6-13-16-24/4	45	10.179	216	66	94		56	2,1
	Val Germanasca	20-24/4	30	3.743	171	63	60		48	4,6
	TOTALI		145	23.684	676	223	285		168	2,9

Note: i dati del 1997 del Distretto Val Pellice sono riferiti ad un censimento in battuta su area campione; i dati del 1998 del Distretto Val Pellice sono integrati con un censimento in battuta su area campione; i dati del 1999 dei Distretti Val Pellice e Bassa Val Chisone sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 del Distretto Bassa Val Chisone sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; i dati 2014, 2015 e 2016 del Distretto Val Germanasca sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni; ; i dati 2015 del Distretto Val Pellice sono comprensivi di integrazioni per censimenti notturni.

COMMENTO

I conteggi 2016 del Capriolo dei distretti Pragelato, Bassa Val Chisone e Val Pellice sono stati condizionati da condizioni meteorologiche negative. Nebbia, scarsa visibilità, pioggia fino a poche ore prima dell'inizio delle operazioni hanno compromesso più o meno direttamente l'osservazione degli animali su gran parte delle aree di osservazione. Solo gli animali osservati con il censimenti notturni per la Bassa Val Chisone hanno permesso di limitare ulteriormente la flessione rispetto al 2015, comunque anche gli esiti di questi monitoraggi evidenziano un calo di animali osservati rispetto alla primavera scorsa.

Solo il dato della Val Germanasca è stato raccolto in condizioni ottimali, pur con un ritardo di una settimana rispetto alla data prefissata, quando il conteggio era stato rinviato per maltempo.


Occorre però precisare che il dato del 2015 di quest'ultimo distretto era stato quello più fortemente condizionato in senso negativo dalle condizioni ambientali: anche allora rinviato per maltempo, quindi eseguito con un già forte sviluppo della foglia e con visibilità limitata in molte zone per fitta nebbia.

Complessivamente sono stati conteggiati su tutto il territorio del CATO1 ben 261 caprioli in meno rispetto al 2015, con una flessione del 28%. Le diminuzioni maggiori sono state registrate in Val Pellice (-26%), in Bassa Val Chisone (-39%) e a Pragelato (-42%) e questi ultimi due distretti sono quelli maggiormente penalizzati dalle cattive condizioni ambientali durante le operazioni di conteggio.


Considerato il trend degli ultimi anni è ormai è innegabile, evidente e generalizzata la diminuzione del numero di esemplari di questa specie sull'area di censimento. Rispetto alla primavera 2008, anno in cui si osservò il maggior numero di animali, la flessione è stata del -60% sull'intera superficie censita.

Si deve comunque considerare che la presenza stabile e diffusa del Lupo non solo incide negativamente per effetto della predazione diretta sugli animali, ma contribuisce anche a causare modificazioni comportamentali che possono incidere sulla distribuzione, sulla contattabilità e sull'osservazione degli animali. Insomma, la flessione reale di questi ultimi anni della popolazione di Capriolo nelle Valli Pellice, Chisone e Germanasca potrebbe essere inferiore a quanto si registra con i censimenti, la cui sottostima potrebbe essere aumentata proprio in funzione dei fattori sopra indicati.

Risultati dei censimenti del Capriolo dal 1998 al 2016



Confronto fra superficie esplorata e numero di animali censiti dal 1996 al 2016



4. CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)

Censimenti della specie sono eseguiti annualmente dal 1987.

METODICA APPLICATA

Censimento tardo-primaverile dopo i parti mediante conteggio diretto a vista all'alba da postazioni fisse o alla cerca con squadre mobili. Dal 2000 viene adottata per la prima volta una variante a questa metodica tradizionale sopra descritta con la realizzazione di un censimento per la parte bassa dei distretti Val Chisone e Val Germanasca (Comuni di Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Pramollo, Inverso Pinasca, Pomaretto) a fine marzo, prima dei parti e prima del ricaccio della foglia.

AREA OGGETTO DI INDAGINE

L'area censita complessivamente coincide quasi per intero con quella occupata dalla specie nell'ambito dei distretti di caccia al Camoscio del CATO1 nel periodo in esame, oltre ad alcune aree esterne ai distretti ed interessa il territorio dei seguenti Comuni: Pragelato, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, Pramollo, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pomaretto, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Angrogna, Rorà, Frossasco, Cantalupa, San Pietro Val Lemina e Pinerolo.

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE CATO1
Superficie censita prevista ha	11.600	7.522	9.275	28.397
Superficie in Oasi/ZRC prevista ha	3.024	691	159	3.874
Numero zone previste	55	43	49	147
Superficie censita coperta ha	10.752	6.822	8.529	26.103
Superficie coperta in Oasi/ZRC ha	2.572	624	109	3.305
Numero zone coperte	49	38	40	129
S.U.S. Camoscio ha (dato OGUR)	14.096	11.257	11.884	37.237
% di S.U.S. censita	76,3	60,6	71,8	70,1

DATE

Calendario programmato:

Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	Zone fuori distretti
11/6	16/4	17/4	17/4
12/6	17/4	19/6	11/6
	18/6		

Calendario effettivamente realizzato:

Date	Numero zone coperte				TOTALE
	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	Zone fuori distretti	
16/4		14	1		15
24/4		15	2	1	18
11/6	33			1	34
12/6	16				16
18/6		9			9
19/6			35		35
24/6			2		2
TOTALE	49	38	40	2	129

DATE

Date	Numero zone coperte			
	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE
16/4		14	1	15
24/4		15	2	17
11/6	33			33
12/6	16			16
18/6		9		9
19/6			35	35
24/6			2	2
TOTALE	49	38	40	127

PARTECIPANTI

Distretto	Val Chisone Val Germanasca (basse)	Val Chisone Val Germanasca (basse)	Val Pellice	Val Pellice	Val Chisone (Pragelato)	Val Germanasca (alta)	Val Germanasca (alta)	Zone fuori distretti	TOTALE
Data	16/4	24/4	11/6	12/6	18/6	19/6	24/6	11/4-24/6	
Zone di osservazione	14	15	33	16	9	35	2	2	129
Totale operatori	28	31	68	32	18	76	3	4	260
Tecnici faunistici CA			2	2	1	2			7
Soci CA	27	30	65	29	15	72	3	4	245
Agenti venatori prov.									
Agenti CFS									
Guardiaparco									
Laici	1	1	1	1	2	2			8

ORARI DI CENSIMENTO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Chisone	Val Chisone Val Germanasca	Val Pellice	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca
Data	16/4	24/4	11/6	12/6	18/6	19/6
Località ritrovo	Perosa A.	S. Germano Penero Sabbione	Bivio Rif. Barbara	Bivio Rif. Barbara Torre Pellice	Pragelato	Penero Sabbione
Ora ritrovo	5,30	5,30	4,30	4,30	5,00	4,30
Inizio operazioni	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba	Alba
Fine operazioni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

METEO (solo riferito alle giornate principali)

Distretto	Val Chisone	Val Chisone Val Germanasca	Val Pellice	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca
Data	16/4	24/4	11/6	12/6	18/6	19/6
Cielo	Nuvoloso	Sereno	Sereno	Sereno	Sereno	Coperto
Precipitazioni	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Deboli fino alle 6,00

Vento	Debole	Moderato	Debole	Debole	Debole	Moderato
Visibilità	Pessima	Buona	Ottima	Buona	Ottima	Discreta
Quota neve vers. S m.s.l.m.	2.000	2.200	3.000	3.000	3.000	2.200
Quota neve vers. N m.s.l.m.	1.700	1.800	2.400	2.400	2.600	2.200
Meteo giorno precedente	Variabile	Pioggia	Variabile	Sereno	Sereno	Sereno

RISULTATI

Distretto Val Pellice:

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 16	Yearling	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Plà – Malanà	1					1	
2	Chiot la Sella – Piantasse	3	3					
3	Ciabraressa – Frioland	10		1	5	1	2	1
4	Garbasse	4						4
5	Camisa	3						3
6	Grange della Gianna	1				1		
7	Sea Bessa – Fiunira	24			7	4	7	6
8	Causinas – Colle della Gianna	2				2		
9	Rocche bianche – Rocche nere	0						
10	Fragnun – Garin	NE						
11	Bruna – Cumbal d'le Nivie	NE						
12	Roussa – Fautet	14			2	1	3	8
13	Col Barant	15			4	3	5	3
14	Biava - inverso Barant	12		3		2	3	4
15	Barbara - Punta Pleng	41		11	8	7	15	
16	Cianai di Coi	45	7	12	4	6	12	4
17	Arbancie – Manzol – Armoine	21		6	1	4	8	2
18	P-Sineive–Vittona-C.le vecchio	19		3	3	8	5	
19	Agugliassa – Comba Meutira	4				2	2	
20	Rif. Granero – Lago Nero	NE						
21	Cumbalas - Genebrera	28		10		7	11	
22	Punta Pleng	13		2		3	2	6
23	Col Porsel – Pra Agriturismo	3				1		2
24	Colle della Croce	6		1	1	1	1	2
25	Barant vers. Pra	17	2	5	4	1	5	
26	Bars di Arè	41		16	3	3	16	3
27	Barricate – Colle dell'Urina	21		8			12	1
28	Gias d'l'Urs – Gorgia	14				4		10
29	Crosennetta – Spessa	68		18	10	7	23	10
30	Crosenna – Content - Resiassa	8				3	2	3
30b	Bucie - Mait Bucie	NE						
31	Villanova – Prà	9	6			2	1	
32	Vallone della Pissa	19			2	2	4	11
33	Colletta delle Faure	20		2	2	4	9	3
34	Burfarant - Bariund *	NE						
34b	Eyssartet-Bariund	20		7	3	2	8	
35	Vallone Giulian – Rousset	81		25	6	6	39	5
36	Pisset - Guglia*	21	1	5		5	6	4
37	Costa Sandrone - Pisset*	12		2		3	2	5
38	Fondovalle Barma d'Aut	12		4	1	2	4	1
38b	Rocca Ciabert	2				2		
39	Caugis - Gias Subiasco *	49		14	6	14	15	
40	Pisset - Cornour*	48	17	9	1	3	15	3
41	Turle - Vergia*	38		12	6	1	10	9

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 16	Yearling	Maschi	Femmine	Indet.Ad
41b	Fautet - Turle *	7		1	1	2	1	2
42	Pertusel - Rospard*	9		4		1	4	
43	Gard - Vantacul*	90	14	15	24	13	24	
44	Gardetta – Falconera *	9	5	1		1	1	1
45	Castelluzzo – Costa chiosa *	7			1	1		5
46	Villanot - Cialaroccia *	5	2			2	1	
47	Sella - Piatta di Biasi	NE						
48	Infernet – Gran Truc*	8				1		7
49	Lausas – Infernet*	13		1		1	3	8
50	Giasset – Sparvira*	32		8	2	6	12	4
51	Sella Vecchia - Roux *	20		5	4	5	5	1
	TOTALE	969	57	211	111	150	299	141

Note: * zone censite il 12/6; tutte le altre sono state censite il 11/6

Distretto Val Chisone (censimento bassa valle):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 16	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Aigliero - Gran Saret *	8			2		3	3
2	Comba Rouen *	0						
3	Malvicino *	0						
4	Clea - Malvicino *	3				1		2
5	Bourcet – Cappella *	8			1	1		6
6	Greisoniere - Rocca pertusà *	1				1		
7	Bourcet - Serre *	1						1
8	Bourcet – Chaulieres *	29			3	3	9	14
9	Serrondet - Comba del Torno*	0						
10	Falconera Monte Morel *	0						
11	Garnier orti *	1				1		
12	C.le della Roussa – Bocciarda*	2				1	1	
13	Ciambellier – Pelvo	32			3	10	14	5
13b	Vivian - Giavella	NE						
14	Briere - Vallone di Bocciarda	21			5	7	9	
15	Vallone delle Miniere	29	2		2	6	5	14
16	Pra Fayet – Rocca Nalais	23			2	8	4	9
17	Pralamar - Cuccetto – Merla	22			5	3	11	3
18	Aquila - Alpe di Giana	25	16		3	3	3	
19	Muretto – Besso	6	4			1	1	
20	Ceresera – Cristetto	7			3	1	3	
21	Crò - Comba la pera	3			1	1	1	
22	Tagliaretto - Grandubbione	7	2		1	2	2	
23	M. Cuccetto	2				1	1	
24	Pralarossa - M. Castelletto	0						
25	Cialmetta - Miandette	2				1		1
26	Oasi Sappè *	17				3	5	9
27	Rocca Renier	NE						
28	Leiretta - Costa Lazzarà	0						
29	Lazzarà – Pralumier	10			2	3	2	3
30	Combaviola - Costarauta	NE						
31	Perlà - Rocca Tumbà*	NE						
32	Col Furan	4				1		3
	TOTALI	263	24	0	33	59	74	73

Note: * = zone censite il 16/4, le altre sono censite il 24/4.

Distretto Val Chisone (censimento alta valle del 18.6.2016):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 16.	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
33	Banchetta	36	1	12	7	2	13	1
34	Burel	NE						
35	Seytes – Morefredo	0						

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 16.	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
36	Vallone di Mendia	1						1
37	Vallone del Gran Mioul	3			2	1		
38	Pra d'Amont	29		7	4	4	7	7
39	Vallone di Soucheres basses	4				2		2
40	Col Basset - Pitre de l'Aigle	0						
41	Rocce – Faussimagna	8	1			4	1	2
42	Costa Piana - Genevris	2	2					
	TOTALI	83	4	19	13	13	21	13

Distretto Val Germanasca (censimento alta valle del 19.6.2016):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 16	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Costa Frappier	21		5		3	5	8
2	Pian Littorio - Lago Verde	NE						
3	Pian Littorio - Gran Guglia	7		1		2	2	2
4	Fondovalle Bout du Col	7		2		1	2	2
5	Bout du Col	23		5		2	5	11
6	Vallone della Longia	6	1	1			2	2
7	Vergia	88		19		8	19	42
8	Monte Selletta	11		2	1	1	2	5
9	Rocca Galmount	6						6
10	Vallone delle Miniere	5			1	1	1	2
11	Vallone Giulian	7				3	2	2
12	Vallone dei 13 Laghi	14	2	2		1	6	3
13	Rocca Bianca – Lago d'Envie	10			1	2	2	5
14	Maiera – Praiet	0						
15	Lausa Bruna	18		4	2	4	4	4
16	Crosetto – Malzas	2			1	1		
17	Gavalupo – Aguglia	3		1			1	1
18	Pra dl'Urs – Cavallo Bianco	7			2	1	2	2
19	Vergia – Cavallo Bianco	8		1	2	2	2	1
20	Barifreddo – Pignerol	11			2	3	2	4
21	Rimas – Trusciera - Fetulà	17			3	3	2	9
22	Misiera – Laparè	NE						
23	Castello – Violetti	19		3	1	3	4	8
24	Alpe di Salza – Fournet *	42		8	6	9	12	7
25	Servecchio – Fontane	10		3	2	1	4	
26	Rivoira – Meisons	7		2	2	1	2	
27	Pomeifrè	8		2			2	4
28	Pelvo – Ortiarè – Plan	11				3	1	7
29	Bric Rosso – Fea Nera	10		3		2	4	1
30	Ruetas – Beth *	7		1		4	1	1
31	Martoretto – Bric dei Denti	48		9	4	12	18	5
32	Balmetta – Culmina	37		8	3	6	8	12
33	Muret	28		9	5	1	10	3
34	Quins	NE						
35	Bessè	NE						
36	Rocca Bianca (Faetto)	17		3	2	3	3	6
37	Bauciusa	21		3	2	8	8	
38	A. della Balma – R.ca Bianca	38	7	7	6	5	13	
39	Cialancia – Punta Bruta	NE						
40	Cialaretto - Voutour	NE						
41	Gran Truc - Lauson	5	1			4		
42	Vallone d'Envie	0						
43	Colle della Buffa - Muret	4	2			1		1
44	Costanera	NE						
	TOTALE	583	13	104	48	101	151	166

Note: * = zone censite il 24/6.

Distretto Val Germanasca (censimento bassa valle):

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 16	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
45	Vallone di Riclaretto **	3	3					
46	Ponte Raut	NE						
47	Faure - Tre Valli **	5			2	1	2	
48	Enfous - Cabote	NE						
49	Cave Brandoneugna *	13			4		9	
	TOTALE	21	3	0	6	1	11	0

Note: * = zona censita il 16/4. ** = zone censite il 24/4

Altre zone censite esterne ai distretti di caccia al Camoscio:

N.	Zona	Totale	Indet.	Piccoli 16	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad
1	Sperina - Freidour *	11		2		4	5	
2	Sbarua - Tre Denti	NE						
3	Cantualupa - Tre Denti	NE						
4	Col Marione - M. Brunello	NE						
5	Cornour - La Palà	NE						
6	Valanza-Cavallo **	0						
7	Monte Benedetto	NE						
	TOTALI	11	0	2	0	4	5	0

Note: * = zona censita il 24/4; ** = zona censita il 11/6

RIEPILOGO

Distretto	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad.
Val Pellice	969	57	211	111	150	299	141
Bassa Val Chisone	263	24	0	33	59	74	73
Alta Val Chisone	83	4	19	13	13	21	13
Bassa Val Germanasca	21	3	0	6	1	11	0
Alta Val Germanasca	583	13	104	48	101	151	166
Zone fuori distretti	11	0	2	0	4	5	0
TOTALI	1.930	101	336	211	328	561	393

RIASSUNTO (solo distretti di caccia)

Distretto	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.Ad.
Val Pellice	969	57	211	111	150	299	141
Val Chisone	346	28	19	46	72	95	86
Val Germanasca	604	16	104	54	102	162	166
TOTALI	1.919	101	334	211	324	556	393

RIEPILOGO (classi degli indeterminati accorpate)

Distretto	Totale	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet.
Val Pellice	969	211	111	150	299	198
Val Chisone	346	19	46	72	95	114
Val Germanasca	604	104	54	102	162	182
TOTALI	1.919	334	211	324	556	494

di cui contati in Oasi di Protezione o Zona di Ripopolamento e cattura:

Distretto	Oasi/ZRC	Sup. censita ha	Totale	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi	Femmine	Indet. Ad.
Val Pellice	Barant	2.039	185	38	39	23	30	55	29
	Subiasco	544	71	21	12	5	14	19	4
	TOTALE	2.572	256	59	51	28	44	74	33
Val Chisone	Grandubbione	219	14	14	0	0	0	0	0
	Perlà Chiabrera	143	14	6	0	2	4	2	6
	Sappè	329	17	9	0	0	3	5	9
	TOTALE	691	45	29	0	2	7	7	15
Val Germanasca	Rodoretto Audaccia	107	0	0	0	0	0	0	0
	Perlà Chiabrera	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	107	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		3.370	301	88	51	30	51	81	48

Parametri rilevati sulla popolazione censita

Distretto	Val Pellice	Val Chisone	Val Germanasca	TOTALE CATO1
Superficie censita ha	10.752	6.822	8.529	26.103
N. camosci censiti	969	346	604	1.919
Densità (capi/100 ha)	9,0	**	7,1	**
Densità pre-parti (capi/100 ha)	7,0	4,8	5,9	6,1
Sex-ratio (FF/MM)	2,0	1,3	1,6	1,7
Incremento 2016 (% capretti)**	21,7	**	17,2	**
Capretti/100 femmine**	70,6	**	64,2	**
% indeterminati	20,4	32,9	30,1	25,7

** dati non calcolabile per la Val Chisone essendo questo distretto censito in parte prima dei parti

Confronto con gli anni precedenti:

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adulti	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
1996	Val Pellice	8/6	30	7.906	704	103	105	100	120	159	117	7,6
	Val Chisone	15/6	20	4.659	387	50	67	60	57	81	72	6,9
	Val Germanasca	15/6	20	7.657	1.071	497	111	91	94	119	159	12,5
	TOTALI		70	20.222	2.162	650	283	251	271	359	348	9,1
1997	Val Pellice	7-8/6	44	10.623	1.188	18	241	124	237	324	244	8,9
	Val Chisone	31/5; 7-8/6	24	5.024	430	32	66	68	91	92	81	7,2
	Val Germanasca	7-8/6	29	9.437	1.139	180	167	146	181	244	221	10,3
	TOTALI		97	25.084	2.757	230	474	338	509	660	546	9,1
1998	Val Pellice	30-31/5	46	10.997	1.187	116	217	168	223	310	153	8,8
	Val Chisone	6-7/6; 13-14/6	28	5.364	431	18	97	49	69	118	80	6,2
	Val Germanasca	7/6-14/6	34	10.312	1.491	68	313	163	256	374	317	11,4
	TOTALI		108	26.673	3.109	202	627	380	548	802	550	9,3
1999	Val Pellice	29-30/5	50	12.018	1.321	98	208	144	269	339	263	9,3
	Val Chisone	5-6/6; 13/6	27	5.364	360	34	59	58	68	80	61	5,6
	Val Germanasca	6-13/6	37	10.608	1.492	139	287	172	230	360	304	11,3
	TOTALI		114	28.000	3.173	271	554	374	567	779	628	9,4
2000	Val Pellice	3-4-15/6	51	11.458	1.362	116	278	121	242	342	263	9,5
	Val Chisone	25-26/3; 17/6	35	6.632	524	83	19	84	130	110	98	7,6
	Val Germanasca	25-26/3; 18-24-25/6	44	11.386	1.644	199	368	120	222	423	312	11,3
	TOTALI		130	29.476	3.530	398	665	325	594	875	673	9,7

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adulti	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
2001	Val Pellice	14-19/6	51	11.600	1.296	134	286	108	199	338	231	8,7
	Val Chisone	24/3; 22/6	40	7.153	485	47	4	102	110	120	102	6,7
	Val Germanasca	24/3; 17/6	41	9.982	1.288	228	191	141	248	270	210	11
	TOTALI		132	28.735	3.069	409	481	351	557	728	543	9
2002	Val Pellice	15-16/6	49	11.184	1.116	97	248	99	178	307	187	7,8
	Val Chisone	23/3; 22/6	40	7.081	465	71	10	85	101	99	99	6,4
	Val Germanasca	23/3; 23-27-29/6	49	10.166	1.304	98	278	115	217	379	217	10,0
	TOTALI		138	28.431	2.885	266	536	299	496	785	503	8,3
2003	Val Pellice	14-15/6	48	11.303	1.079	78	229	92	188	308	184	7,5
	Val Chisone	29/3; 21/6	37	6.534	452	84	1	84	99	94	90	6,9
	Val Germanasca	29/3; 23-27/6	46	10.082	1.362	217	327	86	173	371	188	10,3
	TOTALI		131	27.919	2.893	379	557	262	460	773	462	8,3
2004	Val Pellice	12-13-18/6	51	11.438	864	41	209	71	112	259	172	5,7
	Val Chisone	18-24/4; 19/6	40	6.844	413	84	6	53	79	77	114	5,9
	Val Germanasca	18/4; 20-21-24/6	45	9.656	999	74	225	74	136	269	221	7,9
	TOTALI		136	27.938	2.276	199	440	198	327	605	507	6,6
2005	Val Pellice	18-19-20/6	46	10.278	954	45	235	88	135	299	152	7,0
	Val Chisone	23-30/4; 4/5; 25/6	34	6.454	433	45	47	65	88	109	79	6,0
	Val Germanasca	30/4-26/6	44	8.728	923	76	204	87	140	257	159	8,2
	TOTALI		124	25.460	2.310	166	486	240	363	665	390	7,2
2006	Val Pellice	17-18/6	48	10.367	973	92	215	74	152	304	136	7,3
	Val Chisone	22-23/4; 24/6	32	6.015	347	26	0	66	89	100	66	5,8
	Val Germanasca	23/4-25/6	43	8.629	866	68	192	90	107	226	183	7,8
	TOTALI		123	25.041	2.186	186	407	230	348	630	385	7,1
2007	Val Pellice	16-17/6	51	11.153	1.122	37	295	138	166	375	111	7,4
	Val Chisone	21-22/4; 23/6	40	6.840	392	30	10	81	102	109	60	5,6
	Val Germanasca	21-22/4; 24/6	47	9.246	801	41	162	76	137	209	176	6,9
	TOTALI		138	27.239	2.315	108	467	295	405	693	347	6,8
2008	Val Pellice	28-29/6; 5/7	52	11.183	826	42	177	93	122	240	152	5,8
	Val Chisone	20/4; 21-22-29/6	35	6.396	487	12	104	63	73	164	71	6,0
	Val Germanasca	20/4; 22/6; 1/7	45	8.876	747	21	152	90	137	208	139	6,7
	TOTALI		132	26.455	2.060	75	433	246	332	612	362	6,2
2009	Val Pellice	13-14/6	49	10.203	936	24	226	89	131	302	164	7,0
	Val Chisone	18-25/4; 20-21/6	40	7.134	415	9	59	73	74	124	76	5,0
	Val Germanasca	18-25/4; 3/5; 21/6	39	7.758	538	22	104	48	98	136	130	5,6
	TOTALI		128	25.095	1.889	55	389	210	303	562	370	6,0
2010	Val Pellice	12-13/6	49	10.225	1.086	34	285	124	147	324	172	7,8
	Val Chisone	17-18/4; 19-22/6	37	6.789	485	17	70	73	87	133	105	6,1
	Val Germanasca	18/4; 27/6	40	8.404	674	28	126	66	125	173	156	6,5
	TOTALI		131	25.418	2.245	79	481	263	359	630	433	6,9
2011	Val Pellice	11-12/6	48	11.155	1.066	36	255	102	179	321	173	7,3
	Val Chisone	16-17/4; 18/6	39	6.789	380	29	1	56	88	104	102	5,6
	Val Germanasca	17/4; 19/6	45	9.080	738	17	149	79	121	205	167	6,4
	TOTALI		132	27.024	2.184	82	405	237	388	630	442	6,6
2012	Val Pellice	16-17/6	51	11.035	1.000	55	233	95	156	301	160	7,0
	Val Chisone	21-22/4; 23/6	41	7.148	384	39	4	70	89	109	73	5,3
	Val Germanasca	22/4; 24/6	45	9.054	637	11	127	55	120	189	135	5,6
	TOTALI		138	27.237	2.021	105	364	220	365	599	368	6,0
2013	Val Pellice	15-16/6	51	10.760	1.142	31	287	112	180	387	145	7,9
	Val Chisone	24-25/4; 5/5; 22/6	36	6.811	367	17	47	59	68	93	83	4,7
	Val Germanasca	5/5; 23/6	44	8.889	789	88	161	55	132	218	135	7,0
	TOTALI		131	26.460	2.298	136	495	226	380	698	363	6,8

Anno	Distretto	Data	N. squadre	Sup. censita ha	TOTALE	Indet.	Capretti	Yearlings	Maschi adulti	Femmine adulte	Adulti indet.	Densità Capi/100 ha
2014	Val Pellice	14-22/6	46	10.075	985	37	239	114	159	336	100	7,4
	Val Chisone	12-13/4; 14-21/6	38	7.069	344	15	51	46	65	122	45	4,1
	Val Germanasca	13/4; 22/6	46	9.205	709	11	139	56	108	193	202	6,2
	TOTALI		130	26.349	2.038	63	429	216	332	651	347	6,1
2015	Val Pellice	20-21/6	44	9.969	928	19	210	121	159	295	124	7,2
	Val Chisone	18-24/4; 20/6	36	6.574	398	43	7	75	88	85	100	5,9
	Val Germanasca	26/4; 21/6	41	8.641	645	78	114	72	107	176	98	6,1
	TOTALI		121	25.184	1.971	140	331	268	354	556	322	6,5
2016	Val Pellice	11-12/6	49	10.752	969	57	211	111	150	299	141	7,0
	Val Chisone	16-24/4; 18/6	38	6.822	346	28	19	46	72	95	86	4,8
	Val Germanasca	16-24/4-19-24/6	40	8.529	604	16	104	54	102	162	166	5,9
	TOTALI		127	26.103	1.919	101	334	211	324	556	393	6,1

Note: il censimento degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007, 2015 e 2016 in Val Chisone è stato realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Pragelato); il censimento degli anni 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in Val Chisone è realizzato in parte in aprile (Comuni di Roure, Inv. Pinasca, Pramollo) in parte a giugno (Persosa Arg., Pragelato, Pinasca); il censimento degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 in Val Germanasca è realizzato in parte a marzo/aprile (Comuni di Pomaretto e Vallone di Ricalaretto). La densità è espressa al netto degli individui di classe 0 (capretti).

COMMENTO

I risultati del censimento 2016 del Camoscio sono emblematici di come le condizioni meteo e ambientali al momento del conteggio facciano la differenza su tutti gli altri fattori.

Dove le condizioni sono infatti state ottimali è stato registrato persino un leggero incremento del numero di animali censiti rispetto al 2015, viceversa è stato osservato un lieve decremento.


In Val Pellice, infatti, condizioni meteo ottimali hanno favorito un ottimo conteggio, con un risultato migliore rispetto al 2015 (+4,4%), mentre in Val Germanasca, all'opposto, un cielo coperto, con deboli precipitazioni fino alle 6,00 e neve fresca caduta nella notte fino a 2200 m, hanno sfavorito l'osservazione degli animali e penalizzato il risultato del censimento (-6,4%).

Per la bassa Val Chisone il censimento realizzato come da programma il 16 aprile è stato negativamente influenzato da nebbia persistente e scarsissima visibilità oltre una certa quota. Pertanto l'area a più elevata densità (massiccio Bocciarda-Aquila) è stata nuovamente censita dopo otto giorni in condizioni decisamente più ottimali. Anche il contributo dell'alta valle (Pragelato), censita il 18 giugno, è stato superiore a quello degli anni passati. Ciò nonostante, l'impossibilità di ripetere il conteggio sulle tutte le aree della bassa valle, ha complessivamente penalizzato il risultato finale (-12%).


Il sempre più ridotto numero di operatori idonei (per capacità fisiche e per conoscenza del territorio) disponibili per questi censimenti influenzerà in futuro sempre più pesantemente i risultati dei conteggi a questa specie. Eventuali ripetizioni anche parziali di censimenti realizzati in condizioni sub-ottimali sono infatti sempre più difficili da realizzare.

Un'ultima annotazione: nessun animale affetto da sintomi di cheratocongiuntivite è stato osservato durante i censimenti. L'infezione aveva colpito nell'autunno scorso le alte valli Pellice e Germanasca e nell'inverno anche la Val Chisone, con una virulenza inferiore agli anni 2004/2005 nei primi due settori.


Risultati dei censimenti al Camoscio dal 1996 al 2016



Superficie censita e densità complessiva osservata dal 1996 al 2016




Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2006 al 2016 per macrozona – Val Pellice




Legenda: A=Confine CACN1 (Frioland-Rocche nere); B=Confine Francia (Col vei - Crosennetta); C=Crosenna - Bancet - Bariund; D=Giulian -Pisset-Subiasco; E=Rospard-Vandalino; F=Angrogna; G=Oasi Barant e aree limitrofe.

Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2006 al 2016 per macrozona – Val Chisone



Legenda: A=Confini PNOR; B=Malvicino-Clea-Bourcet; C=Garnier; D=Bocciarda; E=Grandubbione; F=Pramollo-Sappè; G=Inverso Pinasca; H=Pragelato. Tutte le consistenze sono al netto degli individui di classe 0.

Analisi delle variazioni nel numero di animali censiti dal 2006 al 2016 per macrozona – Val Germanasca




Legenda: A=Frappier-Longia-Vergia-Galmount; B=Guglia-Miniere-Giulian-Rocca Bianca; C=Rodoretto; D=Salza
E=Fontane-Pomaifrè; F=Massello; G=Faetto-Crosetto; H=Muret.

CENSIMENTO UNGULATI 2016

CARTOGRAFIA

Censimento primaverile Muflone 2016 - Area di censimento prevista




- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- ^ Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie
- Zone di osservazione muflone

0 2 4 6 8 Kilometers




Censimento estiva Muflone 2016 - Area di censimento prevista




- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie
- Zone di osservazione muflone




Censimento Capriolo 2016 - Area di censimento prevista



Censimento Cervo 2016 - Area di censimento prevista



Censimento Camoscio 2016 - Area di censimento prevista



Censimento primaverile Muflone 2016 – Area di censimento e localizzazione animali osservati




-  Istituti provinciali
-  Confini CATO1
-  Paesi principali
-  Corsi d'acqua principali
-  Parchi regionali
-  Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers




Censimento estivo Muflone 2016 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- ∟ Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers


Censimento Capriolo 2016 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



- Istituti provinciali
- Confini CATO1
- Paesi principali
- ∟ Corsi d'acqua principali
- Parchi regionali
- Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers

Censimento Cervo 2016 – Area di censimento e localizzazione animali osservati




-  Istituti provinciali
-  Confini CATO1
-  Paesi principali
-  Corsi d'acqua principali
-  Parchi regionali
-  Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers



Censimento Camoscio 2016 – Area di censimento e localizzazione animali osservati



-  Istituti provinciali
-  Confini CATO1
-  Paesi principali
-  Corsi d'acqua principali
-  Parchi regionali
-  Aziende faunistico-venatorie

0 2 4 6 8 Kilometers



Censimento Camoscio 2016 - Densità osservate

