

**Comprensorio Alpino TO1
Valli Pellice, Chisone e Germanasca**

Stagione venatoria 2020/2021

**RISULTATI E STATISTICHE
PRELIEVI
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
CINGHIALE
TIPICA FAUNA ALPINA**

**A cura di
Marco Giovo,
Responsabile tecnico CATO1**

Bricherasio, 10 febbraio 2021

**RISULTATI
CACCIA DI SELEZIONE
AGLI UNGULATI RUMINANTI**

DISTRETTI DI CACCIA NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

SPECIE	DISTRETTO	SETTORI	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	UNICO	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
MUFLONE	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
		BASSA VAL CHISONE 2	Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Prarostino
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	UNICO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	UNICO	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: PIANI DI ABBATTIMENTO E CALENDARI
(DD.G.R. n. 16-1755 del 28.7.2020 e n. 19-1841 del 7.8.2020)

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	CLASSE	NUMERO CAPI	TOTALE CAPI DISTRETTO	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
CAPRIOLO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	17 (5) 17 20	54	Maschi ad. 3 settembre 2020 14 novembre 2020	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	0 0 0	0		
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	12 (4) 12 14	38	Femmine ad. e Giovani 17 settembre 2020 14 dicembre 2020	
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Giovani dell'anno	13 (4) 13 26	42		
CERVO	PRAGELATO	UNICO	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	3 5 12 2 12	34	15 ottobre 2020 21 dicembre 2020	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	4 5 13 2 13	37		
		VAL GERMANASCA	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	2 3 8 2 8	23		
		BASSA VAL CHISONE 2	Maschi adulti Maschi subadulti Femmine adulte Daguet Giovani dell'anno	1 2 5 1 4	13		
CAMOSCIO	VAL PELLICE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	22 23 28 2	75	Femmine ad. Yearling e Capretti 17 settembre 2020 21 dicembre 2020	LUNEDI' GIOVEDI' SABATO
	VAL CHISONE	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	13 13 16 1	43		
	VAL GERMANASCA	UNICO	Maschi adulti Femmine adulte Yearling Capretti dell'anno	21 22 27 2	72	Maschi ad. 1 ottobre 2020 5 dicembre 2020	

Note: nel piano dei Cervi maschi adulti è non è più previsto un tetto massimo di cervi maschi adulti coronati; nel piano dei caprioli è indicato la quota di caprioli di sottoclasse I (1 anno).

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni

2.3.1 Entro il mese di giugno 2020 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 10.7.2020 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2020/2021 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, muflone maschio adulto, muflone yearling maschio, capriolo maschio adulto, cervo daguet, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo giovane, muflone femmina adulta o muflone agnello, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 90% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesto di dare la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti degli Ungulati, di cui uno della specie che verrà richiesta per il prelievo. A costoro viene riconosciuto un punteggio sia in sede di assegnazione del distretto che in sede di assegnazione della classe richiesta, come previsto ai punti successivi. I punti si maturano con l'offerta di disponibilità, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a partecipare ai censimenti indicati. In caso di chiamata e di mancata conferma della disponibilità offerta, anche solo ad uno dei due censimenti, verranno persi tutti i punti. E' però ammesso, in questo caso, offrire una disponibilità alternativa.

2.3.3 In caso di richieste per una specie in un distretto in numero superiore a 1,3 volte il totale dei capi in piano, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4a. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Agli esclusi da un distretto verrà assegnato, a scelta, un altro distretto oppure un capo di un'altra specie. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale o con assegno postale vidimato al netto delle spese di emissione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza passano in coda alle altre.

2.3.4 L'assegnazione dei capi maschi adulti viene fatta a chi ne fa richiesta, secondo le disponibilità di ogni distretto. In caso di un numero di richieste superiore al numero di capi assegnabili per un distretto, si procede secondo l'ordine di cui alla tabella 4b. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Per tutte le altre classi non accorpate (camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, cervo daguet, muflone yearling maschio), l'assegnazione si effettuerà secondo l'ordine di cui alla tabella 4c. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

A chi non ottiene il capo richiesto sarà comunque assegnato un capo della stessa specie nel distretto assegnato inizialmente, in base alla disponibilità residua dopo le assegnazioni delle altre classi. Nell'assegnazione della classe

in sostituzione del maschio adulto si terrà conto del punteggio di priorità acquisito. Ai primi esclusi verrà assegnata una femmina adulta (se disponibile), quindi uno yearling (se disponibile), quindi un giovane.

L'assegnazione dei capi secondo i criteri sopra indicati verrà effettuata d'ufficio non appena i piani di prelievo saranno approvati dalla Giunta regionale.

Per le classi accorpate (capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane), in caso di richieste superiori al numero di autorizzazioni disponibili per un distretto, si procederà sempre seguendo i criteri di priorità di cui alla tabella 4b; agli esclusi verrà assegnata un altro capo della stessa specie sempre nel medesimo distretto.

In caso di assegnazione di un capo diverso da quello richiesto, eventuali variazioni potranno essere valutate tenendo conto delle disponibilità residue dopo tutte le assegnazioni. In questo caso saranno regolate, a debito o a credito, le differenze di quota fra l'anticipo versato e la quota del nuovo capo assegnato.

Per i soci ammessi con ulteriore ammissione o nuova ammissione o ammissione stagionale (ma non già soci del CATO1 nella stagione precedente), in sede di calcolo dei punteggi per le priorità, non si terrà conto del cacciato nella stagione precedente in altri CA.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2020/2021, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un muflone giovane (agnello), un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;
- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, uno yearling maschio di muflone o di cervo o di capriolo, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2020/2021 il Comitato di Gestione ha previsto un carniere stagionale individuale fino a cinque capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 90% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;
- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 90% o di completamente del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, cervo daguet, muflone maschio adulto, muflone yearling, capriolo maschio adulto, cervo maschio adulto e subadulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota della classe. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 90% o per completamento del piano per entrambe le classi accorpate, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota versata. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sest'ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario o in contanti.

I sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 90% sono realizzati d'ufficio e le comunicazioni relative a questi provvedimenti sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito internet e mediante affissione di manifesto presso le bacheche del CA del solo distretto di caccia relativo alla specie interessata dal provvedimento. In questo manifesto sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. I soci sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge. Gli organi di vigilanza sono aggiornati direttamente e tempestivamente dell'evolversi del prelievo e delle assegnazioni individuali.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto 2-5 anni non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Non è previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 90% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso. L'abbattimento di una femmina di camoscio con il latte per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo o cervo con il latte fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti o adulti con trofeo nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Anche per la stagione venatoria 2020/2021 è prevista la suddivisione della classe dei caprioli maschi adulti in due sottoclassi: maschi di sottoclasse I (1 anno), maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre). Le sottoclassi non vengono assegnate e l'assegnazione e la dicitura sulla cartolina autorizzativa restano invariate. L'assegnatario di un Capriolo maschio adulto può prelevare inizialmente qualunque capo di questa classe. Al raggiungimento, in un distretto, della quota di capi maschi di sottoclasse II-III (2 anni e oltre), si procederà alla chiusura del prelievo per la sottoclasse interessata (e alla comunicazione con i soliti metodi). Resterà quindi libero il prelievo per la restante sottoclasse I, per la quale non è invece prevista la chiusura in caso di sfioramento del piano. L'eventuale abbattimento di un capo di sottoclasse diversa da quella ancora prelevabile non costituisce "tiro non conforme", non è soggetto a sanzione amministrativa, comporta però la non assegnazione di ulteriori capi di qualunque specie per la stagione in corso.

Tabella 4a – Ordine di assegnazione del distretto

Criterio di priorità	Punti
Residenza in uno dei Comuni componenti il distretto o il settore	20
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al distretto o al settore	10
Residenza fuori Regione Piemonte	5
Non aver ottenuto il distretto o il settore richiesto per la stessa specie nello stesso distretto nella stagione 2019/2020	20
Aver dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2020	20
Essere ammesso al CATO1 in forma esclusiva	5

Tabella 4b – Ordine di assegnazione del maschio

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2019/2020	20
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2019/2020	5
richiesto maschio in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuto stagione 2018/2019	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2019/2020	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2020	10
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2019/2020	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2019/2020	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2019/2020	-10

Tabella 4c – Ordine di assegnazione del altre classi

Criterio di priorità	Punti
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2019/2020	20
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2019/2020	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2020	10
abbattimento come primo capo di un giovane o uno yearling o un fusone di capriolo nella stagione 2019/2020	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2019/2020	1
abbattimento di un capo non conforme nella stagione 2019/2020	-10

ASSEGNAZIONI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

Specie	Distretto	Piano	Tetto stabilito	Assegnati all'apertura	Assegnati successivamente	Totale assegnati
Camoscio	Val Pellice	75	98	79	14	93
	Val Chisone	43	56	42	8	50
	Val Germanasca	72	94	89	4	93
	TOTALE	190	248	210	26	236
Capriolo	Val Pellice	54	70	29	19	48
	Bassa val Chisone	38	49	45	4	49
	Val Germanasca	42	55	19	10	29
	TOTALE	134	174	93	33	126
Cervo	Pragelato	34	44	32	9	41
	Bassa val Chisone1	37	48	37	4	41
	Bassa val Chisone2	13	17	16	0	16
	Val Germanasca	23	30	25	5	30
	TOTALE	107	139	110	18	128

DISTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEGLI ABBATTIMENTI NEL TEMPO

Specie	Distretto	1° autoriz.		2° autoriz.		3° autoriz.		4° autoriz.	
		Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb	Aut	Abb
Camoscio	Val Pellice	79	33	12	6	2	1		
	Val Chisone	42	17	7	1	1	1		
	Val Germanasca	89	43	4	2				
Capriolo	Val Pellice	29	15	15	4	3	1	1	1
	Bassa Val Chisone	45	15	4	1				
	Val Germanasca	19	9	9	3	1			
Cervo	Pragelato	32	16	5	1	2		2	1
	Bassa Val Chisone1	37	25	3	2	1	1		
	Bassa Val Chisone2	16	11						
	Val Germanasca	25	13	5	2				
Totale complessivo		413	197	64	22	10	4	3	2

Aut = autorizzazioni rilasciate; Abb = capi abbattuti

Capi sequestrati dalla vigilanza o rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti e conteggiati nei piani di abbattimento: -.

I capi assegnati in sostituzione di altri capi (per chiusura anticipata del prelievo in quel distretto per quella specie) e capi ceduti da un cacciatore ad un altro sono stati qui considerati come ulteriori capi.

CACCIA DI SELEZIONE: RISULTATI DEI PRELIEVI

CAMOSCIO FA/BIN/GIO: 14.9-14.12 MA: 1.10-14.12	Val Pellice			Val Germanasca			Val Chisone			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	22	19	86%	21	20	95%	13	12	92%	56	51	91%
FEMMINE AD.	23	11	48%	22	10	45%	13	3	23%	58	24	41%
YEARLING	28	10 (6;4)	36%	27	14 (7;7)	52%	16	3 (2;1)	19%	71	27 (15;12)	38%
CAPRETTI	2		0%	2	1 (1;0)	50%	1	1 (0;1)	100%	5	2 (1;1)	40%
Totale	75	40	53%	72	45	63%	43	19	44%	190	104	55%
Di cui tiri non conf.		1			1			0			2	
Di cui sanitari		3			0			1			4	

CAPRIOLO MA: 3.9-14.11 FA/GIO: 17.9-14.12	Val Pellice			Pragelato			Bassa Val Chisone e Pin.			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	17	9	53%	0			12	8	67%	13	7	54%	42	24	57%
FEMMINE AD.	17	7	41%	0			12	8	67%	13	4	31%	42	19	45%
GIOVANI	20	5 (5;0)	25%	0			14		0%	16	1 (1;0)	6%	50	6 (6;0)	12%
Totale	54	21	39%	0			38	16	42%	42	16	38%	134	49	37%
Di cui tiri non conf.		0						0			0			0	
Di cui sanitari		1						0			0			1	

CERVO 15.10-21.12 2.1-30.1	Pragelato			Bassa Val Chisone 1			Bassa Val Chisone 2			Val Germanasca			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
MASCHI AD.	3	3	100%	4	5	125%	1	1	100%	2	3	150%	10	12	120%
MASCHI SUBAD.	5	6	120%	5	2	40%	2	1	50%	3	1	33%	15	10	67%
FEMMINE AD.	12	7	58%	13	14	108%	5	5	100%	8	7	88%	38	33	87%
DAGUET	2		0%	2		0%	1		0%	2	2	100%	7	2	29%
GIOVANI	12	2 (1;1)	17%	13	7 (4;3)	54%	4	4 (1;3)	100%	8	2 (1;1)	25%	37	15 (7;8)	41%
Totale	34	18	53%	37	28	76%	13	11	85%	23	15	65%	107	72	67%
Di cui tiri non conf.		0			1			0			0			1	
Di cui sanitari		0			1			0			1			2	

Legenda:

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI CON EVIDENZIAMENTO DEI CAPI SANITARI PER OGNI CLASSE

CAMOSCIO	Val Pellice				Val Germanasca				Val Chisone				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	22	16	3	73%	21	20		95%	13	11	1	85%	56	47	4	84%
FEMMINE AD.	23	11		48%	22	10		45%	13	3		23%	58	24		41%
YEARLING	28	10		36%	27	14		52%	16	3		19%	71	27		38%
CAPRETTI	2			0%	2	1		50%	1	1		100%	5	2		40%
Totale	75	40		53%	72	45		63%	43	19		44%	190	104		55%

CAPRIOLO	Val Pellice				Pragelato				Bassa Val Chisone e Pin.				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	17	8	1	47%	0				12	8		67%	13	7		54%	42	23	1	55%
FEMMINE AD.	17	7		41%	0				12	8		67%	13	4		31%	42	19		45%
GIOVANI	20	5		25%	0				14			0%	16	1		6%	50	6		12%
Totale	54	21		39%	0				38	16		42%	42	12		29%	134	49		37%

CERVO	Pragelato				Bassa Val Chisone 1				Bassa Val Chisone 2				Val Germanasca				Totale CA TO 1			
	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%	PRE	REA	SAN	%
MASCHI AD.	3	3		100%	4	4	1	100%	1	1		100%	2	2	1	100%	10	10	2	100%
MASCHI SUBAD.	5	6		120%	5	2		40%	2	1		50%	3	1		33%	15	10		67%
FEMMINE AD.	12	7		58%	13	14		108%	5	5		100%	8	7		88%	38	33		87%
DAGUET	2			0%	2			0%	1			0%	2	2		100%	7	2		29%
GIOVANI	12	2		17%	13	7		54%	4	4		100%	8	2		25%	37	15		41%
Totale	34	18		53%	37	28		76%	13	11		85%	23	15		65%	107	72		67%

Legenda:

Le percentuali di abbattimento sono calcolate come segue: (REA+SAN)/PRE

PRE= Piano previsto

REA=Piano realizzato

SAN=Capi sanitari

CACCIA DI SELEZIONE: REALIZZAZIONE DEI PIANI RISPETTO AL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

CAMOSCIO	Val Pellice					Val Germanasca					Val Chisone					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	22	28	19	68%	86%	21	27	20	74%	95%	13	17	12	71%	92%	56	72	51	71%	91%
FEMMINE AD.	23	30	11	37%	48%	22	29	10	34%	45%	13	16	3	19%	23%	58	75	24	32%	41%
YEARLING	28	33	10	30%	36%	27	35	14	40%	52%	16	16	3	19%	19%	71	84	27	32%	38%
CAPRETTI	2	2	0	0%	0%	2	2	1	50%	50%	1	1	1	100%	100%	5	5	2	40%	40%
Totale	75	93	40	43%	53%	72	93	45	48%	63%	43	50	19	38%	44%	190	236	104	44%	55%

CAPRIOLO	Val Pellice					Pragelato					Resto Chisone					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	17	15	9	60%	53%	0					12	15	8	53%	67%	13	11	7	64%	54%	42	41	24	59%	57%
FEMMINE AD.	17		7	21%	41%	0					12		8	24%	67%	13		4	22%	31%	42		19	22%	45%
GIOVANI	20		5		25%	0					14	34			0%	16		1		6%	50		6		12%
Totale	54	48	21	44%	39%	0					38	49	16	33%	42%	42	29	12	41%	29%	134	126	49	39%	37%

CERVO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Germanasca					Totale CA TO 1				
	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE	PRE	ASS	REA	REA /ASS	REA /PRE
MASCHI AD.	3		3	90%	100%	4	8	5	88%	125%	1	3	1	67%	100%	2	8	3	50%	150%	10	29	12	76%	120%
MASCHI SUBAD.	5		6		120%	5		2		40%	2		1		50%	3		1		33%	15		10		67%
DAGUET	2	1		0%	0%	2	2		0%	0%	1	1		0%	0%	2	3	2	67%	100%	7	7	2	29%	29%
FEMMINE AD.	12		7	30%	58%	13	31	14	68%	108%	5	12	5	75%	100%	8	19	7	47%	88%	38	92	33	52%	87%
GIOVANI	12		2		17%	13		7		54%	4		4		100%	8		2		25%	37		15		41%
Totale	34	41	18	44%	53%	37	41	28	68%	76%	13	16	11	69%	85%	23	30	15	50%	65%	107	128	72	56%	67%





PRE= Piano previsto
 REA= Piano realizzato
 ASS= capi assegnati

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CHIUSURE ANTICIPATE O RAGGIUNGIMENTI DELLA SOGLIA DEL 90%






Specie	Classe	Distretto/Settore	Data raggiungimento soglia 90%	Data completamento piano
CERVO	MA adulto	VAL GERMANASCA		17/10/2020
CERVO	MA adulto	PRAGELATO		31/10/2020
CERVO	MA adulto	BASSA VAL CHISONE 2		31/10/2020
CAMOSCIO	CAP	VAL CHISONE		02/11/2020
CERVO	FA	BASSA VAL CHISONE 1	30/11/2020	11/01/2021
CAMOSCIO	MA	VAL GERMANASCA	12/12/2020	
CERVO	MA adulto	BASSA VAL CHISONE 1		07/01/2021
CERVO	FA	VAL GERMANASCA	07/01/2021	
CERVO	FA	BASSA VAL CHISONE 2		09/01/2021
CERVO	MA subadulto	PRAGELATO		09/01/2021
CERVO	DAG	VAL GERMANASCA		11/01/2021
CERVO	FA	VAL GERMANASCA		11/01/2021
CERVO	GIO	BASSA VAL CHISONE 2		18/01/2021

MA=maschio adulto; FA=femmina adulta; CAP=capretto; BIN=yearling; DAG=daguet; GIO=giovane; AGN=agnello; FUS=yearling maschio






CAMOSCIO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAPRIOLO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CERVO: DIFFERENZE FRA PIANO PREVISTO E PIANO REALIZZATO



CAMOSCIO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2016/17	Val Pellice	76%	1,00	0,8	39,8%	23,4%	7,5	8,3
	Val Chisone	80%	1,02	1,1	38,1%	28,6%	5,5	6,8
	Val Germanasca	83%	1,00	0,8	40,0%	25,0%	5,7	10,6
	Totale	79%	1,02	0,9	39,5%	25,2%	6,5	8,9
2017/18	Val Pellice	85%	1,03	0,8	40,0%	21,8%	6,0	8,0
	Val Chisone	78%	1,00	1,2	40,0%	29,0%	7,0	6,5
	Val Germanasca	66%	1,03	0,6	40,0%	23,3%	5,7	8,9
	Totale	76%	1,02	0,9	40,0%	24,0%	6,1	7,9
2018/19	Val Pellice	74%	1,00	0,8	40,0%	27,1%	7,0	9,1
	Val Chisone	53%	1,00	0,6	40,0%	18,9%	6,4	7,3
	Val Germanasca	69%	1,00	1,0	40,0%	35,4%	5,3	8,4
	Totale	68%	1,00	0,8	40,0%	29,2%	6,4	8,5
2019/20	Val Pellice	72%	1,03	0,7	40,0%	27,7%	6,6	8,0
	Val Chisone	69%	1,02	0,8	37,9%	22,6%	4,9	9,2
	Val Germanasca	66%	1,00	0,8	40,0%	21,4%	6,9	6,7
	Totale	69%	1,02	0,8	39,5%	24,1%	6,4	7,8
2020/21	Val Pellice	53%	1,03	0,6	40,0%	25,0%	6,9	9,3
	Val Chisone	44%	1,00	0,4	39,5%	21,1%	5,1	4,0
	Val Germanasca	63%	1,03	0,6	40,3%	30,0%	5,4	8,2
	Totale	55%	1,02	0,6	40,0%	27,9%	5,9	8,2

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per le classi degli agnelli; per giovani si intendono agnelli, yearling maschi e yearling femmine, previste in numero pari agli yearling maschi nei piani.

CERVO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2016/17	Pragelato	42%	1,06	0,2	30,6%	0,0%	5,7	7,3
	Bassa Val Chisone 1	67%	1,14	1,9	33,3%	40,0%	6	4,0
	Bassa Val Chisone 2	70%	1,22	0,4	30,0%	14,3%	2,5	6,0
	Val Germanasca	36%	1,00	N.D.	28,6%	0,0%	4,5	
	Totale	52%	1,09	0,7	31,1%	19,1%	5,1	4,9
2017/18	Pragelato	30%	1,00	0,2	30,0%	8,3%	6,2	11,0
	Bassa Val Chisone 1	71%	1,00	1,4	33,3%	23,5%	5,5	5,5
	Bassa Val Chisone 2	88%	1,00	1,3	25,0%	28,6%		4,7
	Val Germanasca	22%	0,89	1,0	27,8%	0,0%	5,5	5,0
	Totale	44%	0,98	0,9	30,0%	17,5%	5,9	6,0
2018/19	Pragelato	47%	0,94	0,4	30,0%	7,1%	5,0	5,8
	Bassa Val Chisone 1	69%	1,05	1,6	30,9%	31,0%	5,1	7,6
	Bassa Val Chisone 2	77%	1,16	4,0	30,7%	30,0%	5,2	2,0
	Val Germanasca	53%	0,87	0,6	26,7%	12,5%	2,5	5,8
	Totale	61%	1,00	1,4	30,0%	22,9%	4,9	6,1
2019/20	Pragelato	71%	1,12	0,8	31,4%	16,7%	4,5	4,3
	Bassa Val Chisone 1	72%	1,12	2,8	33,3%	25,9%	5,3	4,6
	Bassa Val Chisone 2	83%	1,18	1,5	25,0%	20,0%	3,7	4,4
	Val Germanasca	65%	1,00	0,9	30,0%	20,5%	4,3	3,3
	Totale	72%	1,10	0,8	31,1%	20,1%	4,4	4,2
2020/21	Pragelato	53%	1,12	0,8	35,3%	11,1%	5,5	5,5
	Bassa Val Chisone 1	76%	1,11	1,5	35,1%	25,0%	6,8	3,5
	Bassa Val Chisone 2	85%	1,16	2,7	30,8%	36,4%	6,5	4,0
	Val Germanasca	65%	1,09	1,1	34,8%	13,3%	6,0	4,0
	Totale	67%	1,12	1,3	34,5%	20,9%	6,1	4,1




Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0. Le femmine di 1 anno sono comprese nelle FA.

CAPRIOLO: CONFRONTO DEI RISULTATI DEL PRELIEVO CON GLI OBIETTIVI DEI PIANI

Stagione	Distretto	% realizzazione	Sex ratio piani (FF/MM)	Sex-ratio prelievo (FF/MM)	% giovani piani	% giovani prelievo	Età media MA anni	Età media FA anni
2016/17	Val Pellice	69%	1,00	1,0	40,0%	18,8%	2,7	2,9
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	63%	1,03	1,6	40,0%	17,1%	3,6	4,0
	Val Germanasca	68%	1,00	0,9	40,0%	17,6%	3,0	2,7
	Totale CATO1	66%	1,02	1,1	40,0%	17,9%	3,0	3,3
2017/18	Val Pellice	57%	1,00	1,0	40,0%	28,1%	3,2	2,7
	Pragelato						4,1	4,2
	Bassa Val Chisone	60%	1,00	1,2	40,3%	12,5%	2,9	3,4
	Val Germanasca	66%	1,00	1,7	39,6%	28,6%		
	Totale CATO1	60%	1,00	1,2	40,0%	23,5%	3,4	3,4
2018/19	Val Pellice	45%	1,00	0,9	39,8%	9,5%	2,8	3,6
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	34%	1,02	1,1	40,0%	20,7%	4,1	3,5
	Val Germanasca	56%	1,00	1,3	40,4%	12,5%	3,0	4,4
	Totale CATO1	44%	1,01	1,1	40,0%	13,6%	3,2	3,9
2019/20	Val Pellice	52%	1,03	0,8	40,0%	28,6%	3,7	3,5
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	54%	1,00	1,4	40,0%	14,8%	3,4	3,5
	Val Germanasca	36%	1,00	0,8	40,0%	27,8%	3,6	4,8
	Totale CATO1	48%	1,01	1,2	40,0%	23,8%	3,6	3,8
2020/21	Val Pellice	39%	1,00	0,5	37,0%	23,8%	3,7	3,4
	Pragelato							
	Bassa Val Chisone	42%	1,00	1,0	36,8%	0%	3,8	3,0
	Val Germanasca	29%	1,00	0,5	38,1%	8,3%	3,0	5,0
	Totale CATO1	37%	1,00	0,7	37,3%	12,2%	3,5	3,6

Note: per il calcolo della sex-ratio dei piani si è ipotizzato un rapporto sessi paritario per la classe dei giovani; per giovani si intendono i giovani classe 0.

PIRAMIDI DI ETA' DEI CAPI ABBATTUTI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI





Legenda: MM=maschi; FF=femmine

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAPRIOLO

DATA	GIORNO	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale
		MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	MA	FA	GIO	TOT	CATO1
03/09/2020	GIO	2			2	2			2	1			1	5
05/09/2020	SAB	1			1									1
07/09/2020	LUN	2			2									2
10/09/2020	GIO	1			1	2			2					3
12/09/2020	SAB									1			1	1
14/09/2020	LUN	1			1									1
17/09/2020	GIO		1	1	2	2			2	1	3		4	8
19/09/2020	SAB									1			1	1
21/09/2020	LUN					1			1					1
24/09/2020	GIO	1			1					1			1	2
26/09/2020	SAB						1		1					1
28/09/2020	LUN		1		1		1		1					2
01/10/2020	GIO													
03/10/2020	SAB													
05/10/2020	LUN													
08/10/2020	GIO						2		2					2
10/10/2020	SAB		1		1									1
12/10/2020	LUN													
15/10/2020	GIO									1			1	1
17/10/2020	SAB		1	1	2									2
19/10/2020	LUN									1			1	1
22/10/2020	GIO													
24/10/2020	SAB													
26/10/2020	LUN													
29/10/2020	GIO	1			1									1
31/10/2020	SAB		1	1	2	1			1		1		1	4
02/11/2020	LUN													
05/11/2020	GIO													
07/11/2020	SAB													
09/11/2020	LUN													
12/11/2020	GIO													
14/11/2020	SAB													
16/11/2020	LUN													
19/11/2020	GIO													
21/11/2020	SAB													
23/11/2020	LUN													
26/11/2020	GIO													
28/11/2020	SAB													
30/11/2020	LUN													
03/12/2020	GIO													2
05/12/2020	SAB													1
07/12/2020	LUN													1
10/12/2020	GIO													
12/12/2020	SAB						3		3					3
14/12/2020	LUN		2		2									2
Totale complessivo		9	7	5	21	8	8		16	7	4	1	12	49

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta

GIO = giovane
TOT = totale distretto

 = caccia interdetta per divieto agli spostamenti
 = caccia consentita solo nel proprio Comune

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato
 = raggiungimento soglia sottoclasse II-III
 = caccia chiusa

CALENDARIO ABBATTIMENTI CAMOSCIO

DATA	Giorno	Val Pellice				TOT	Val Chisone				TOT	Val Germanasca				TOT	Totale CATO1
		MA	FA	BIN	GIO		MA	FA	BIN	GIO		MA	FA	BIN	GIO		
17/09/2020	GIO													2	2	2	
19/09/2020	SAB																
21/09/2020	LUN																
24/09/2020	GIO				1	1		1		1						2	
26/09/2020	SAB		3			3							1		1	4	
28/09/2020	LUN																
01/10/2020	GIO	1				1	2			2	1	1	1		3	6	
03/10/2020	SAB							1		1	2	2	1		5	6	
05/10/2020	LUN										1		1		2	2	
08/10/2020	GIO										3	1	1		5	5	
10/10/2020	SAB	1	1	3		5	4			4	2				2	11	
12/10/2020	LUN		1			1										1	
15/10/2020	GIO						1			1		1			1	2	
17/10/2020	SAB	3		2		5							2		2	7	
19/10/2020	LUN										1		1		2	2	
22/10/2020	GIO										1	1	1		3	3	
24/10/2020	SAB	1	1			2	1		1	2	3		1		4	8	
26/10/2020	LUN																
29/10/2020	GIO	2				2	1			1	1				1	4	
31/10/2020	SAB	4	3	2		9	1	1		2	1				1	12	
02/11/2020	LUN	3				3			1	2						5	
05/11/2020	GIO	2	1	1		4	1	1		2	1		1		2	8	
07/11/2020	SAB																
09/11/2020	LUN																
12/11/2020	GIO																
14/11/2020	SAB																
16/11/2020	LUN																
19/11/2020	GIO																
21/11/2020	SAB																
23/11/2020	LUN																
26/11/2020	GIO																
28/11/2020	SAB																
30/11/2020	LUN																
03/12/2020	GIO	1				1						2			2	3	
05/12/2020	SAB										1				1	1	
07/12/2020	LUN											1			1	1	
10/12/2020	GIO												1		1	1	
12/12/2020	SAB										2	1	1		4	4	
14/12/2020	LUN	1	1	1		3	1			1			1		1	5	
Totale complessivo		19	11	10		40	12	3	3	1	19	20	10	14	1	45	104

MA = maschio adulto
FA = femmina adulta

BIN = yearling
GIO = giovane

 = superamento del 90% del piano
 = piano completato
 = caccia chiusa

 = caccia interdetta per divieto agli spostamenti
 = caccia consentita solo nel proprio Comune

Per recuperare in parte le giornate perse per il lock-down, la caccia al camoscio maschio è stata prolungata dal 6.12 al 14.12 e quella della altre specie dal 22.11 al 14.12

CALENDARIO ABBATTIMENTI CERVO





DATA	GIORNO	Pragelato					Bassa Val Chisone 1					Bassa Val Chisone 2					Val Gemanasca					Totale CATO1	
		GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT	GIO	DAG	FA	MS	MA	TOT				
15/10/2020	GIO			2	1																		3
17/10/2020	SAB	1		2		1		1		1													1
19/10/2020	LUN																2						2
22/10/2020	GIO																						
24/10/2020	SAB	1								2													1
26/10/2020	LUN											1											1
29/10/2020	GIO															1		1					1
31/10/2020	SAB					1		1		2			4										1
02/11/2020	LUN																						2
05/11/2020	GIO											1		1									2
07/11/2020	SAB																						
09/11/2020	LUN																						
12/11/2020	GIO																						
14/11/2020	SAB																						
16/11/2020	LUN																						
19/11/2020	GIO																						
21/11/2020	SAB																						
23/11/2020	LUN																						
26/11/2020	GIO																						
28/11/2020	SAB																						
30/11/2020	LUN																						1
03/12/2020	GIO																						2
05/12/2020	SAB																						
07/12/2020	LUN																						
10/12/2020	GIO																						
12/12/2020	SAB			1																			1
14/12/2020	LUN				1																		1
17/12/2020	GIO			1																			1
19/12/2020	SAB																						
21/12/2020	LUN																						
02/01/2021	SAB																						
04/01/2021	LUN																						1
07/01/2021	GIO																						1
09/01/2021	SAB																						2
11/01/2021	LUN																						2
14/01/2021	GIO			1																			1
16/01/2021	SAB																						1
18/01/2021	LUN																						1
21/01/2021	GIO																						1
23/01/2021	SAB																						2
25/01/2021	LUN																						1
28/01/2021	GIO																						1
30/01/2021	SAB																						1
Totale complessivo		2	7	6	3	18	7	14	2	5	28	4	5	1	1	11	2	2	7	1	3	15	72

MA = maschio adulto
 MS = maschio subadulto
 FA = femmina adulta
 DAG = daguet
 GIO = giovane
 TOT = totale distretto




 = superamento del 90% del piano
 = piano completato
 = caccia interdetta per divieto agli spostamenti
 = caccia consentita solo nel proprio Comune

Per recuperare in parte le giornate perse per il lock-down, la caccia al cervo è stata prolungata dal 2.1 al 30.1.2021





TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI







CAMOSCIO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAPRIOLO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CERVO: TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI NEGLI ANNI PER DISTRETTO



CAMOSCIO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Val Pellice			Val Chisone			Val Germanasca			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2016	Giovane	2	4,5	3,5				1	1,0	-	3	3,3	3,2
	Yearling	13	1,8	0,9	10	3,5	3,5	14	2,4	1,3	37	2,5	2,1
	Femmina adulta	21	3,0	2,1	12	4,6	4,0	23	4,0	2,9	56	3,8	2,9
	Maschio adulto	28	2,6	1,8	13	2,4	1,7	22	3,7	3,6	63	2,9	2,6
	Totale	64	2,7	1,8	35	3,5	3,2	60	3,5	2,9	159	3,1	2,6
2017	Giovane	1	1,0	-				1	7,0	-	2	4,0	4,2
	Yearling	11	2,3	2,1	9	2,6	1,5	9	5,1	3,8	29	3,2	2,8
	Femmina adulta	20	2,7	1,5	11	3,5	2,5	13	4,0	2,9	44	3,3	2,3
	Maschio adulto	23	2,7	1,8	11	3,6	2,0	20	2,5	1,5	54	2,8	1,8
	Totale	55	2,6	1,8	31	3,3	2,1	43	3,6	2,7	129	3,1	2,2
2018	Giovane							1	4,0	-	1	4,0	-
	Yearling	16	3,1	2,9	3	6,0	4,0	16	1,9	1,2	35	2,8	2,5
	Femmina adulta	15	2,6	1,5	4	3,5	1,0	18	3,2	2,4	37	3,0	2,0
	Maschio adulto	28	4,0	2,8	9	3,8	2,7	12	2,8	2,8	49	3,6	2,8
	Totale	59	3,4	2,6	16	4,1	2,7	47	2,7	2,2	122	3,2	2,5
2019	Giovane				1	1,0		1	6,0		2	3,5	3,5
	Yearling	15	3,4	2,6	6	2,2	1,2	11	2,1	1,2	32	2,7	2,1
	Femmina adulta	17	2,8	1,9	10	3,7	3,8	16	3,4	3,6	43	3,2	3,0
	Maschio adulto	22	2,5	1,8	14	2,6	2,9	28	3,0	2,6	64	2,7	2,4
	Totale	54	2,8	2,1	31	2,8	2,9	56	3,0	2,7	141	2,9	2,5
2020	Giovane				1	6,0	-	1	3,0	-1	2	4,5	2,1
	Yearling	10	2,6	1,8	3	2,3	0,6	14	3,0	1,9	27	2,8	1,7
	Femmina adulta	11	2,5	1,8	3	3,3	1,2	10	2,6	2,5	24	2,7	2,0
	Maschio adulto	19	2,4	1,5	12	2,8	1,7	20	2,6	2,2	51	2,5	1,8
	Totale	40	2,5	1,6	19	3,0	1,6	45	2,7	2,1	104	2,7	1,8

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CAPRIOLO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Val Pellice			Bassa Chisone			Val German.			Totale		
		n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2016	Giovane				9	4,9	4,6	7	5,3	4,2	6	1,3	0,8	22	4,0	4,0
	Femmina adulta				20	2,9	2,0	20	4,5	4,2	14	6,0	6,4	54	4,3	4,4
	Maschio adulto				19	2,8	1,3	14	3,6	2,1	14	3,8	3,3	47	3,3	2,3
	Totale				48	3,2	2,5	41	4,3	3,6	34	4,3	4,8	123	3,9	3,6
2017	Giovane				14	2,8	2,4	5	4,6	3,2	10	5,7	3,4	29	4,1	3,1
	Femmina adulta				18	3,1	3,2	18	3,7	2,8	15	3,6	2,4	51	3,5	2,8
	Maschio adulto				20	2,7	1,8	17	3,9	3,7	10	3,4	2,6	47	3,3	2,8
	Totale				52	2,8	2,5	40	3,9	3,2	35	4,1	2,9	127	3,5	2,9
2018	Giovane				4	7,5	6,1	6	6,0	4,0	4	4,5	2,4	14	6,0	4,2
	Femmina adulta				17	5,8	5,7	12	5,6	3,7	15	3,7	2,9	44	5,0	4,4
	Maschio adulto				21	3,0	2,2	11	3,2	2,1	13	5,2	4,6	45	3,7	3,2
	Totale				42	4,6	4,5	29	4,8	3,4	32	4,4	3,6	103	4,6	3,9
2019	Giovane				10	4,1	4,4	4	3,8	1,7	5	8,6	6,0	19	5,2	4,8
	Femmina adulta				11	5,5	5,2	15	4,7	4,1	6	4,3	4,1	32	4,9	4,4
	Maschio adulto				14	2,6	1,7	8	2,8	2,5	7	5,4	2,8	29	3,3	2,5
	Totale				10	4,1	4,4	4	3,8	1,7	5	8,6	6,0	19	5,2	4,8
2020	Giovane				5	4,0	2,8				1	2,0	-	6	3,7	2,7
	Femmina adulta				7	3,0	2,1	8	3,9	1,9	4	1,5	1,0	19	3,1	2,0
	Maschio adulto				9	3,3	2,2	8	3,0	2,3	7	5,4	2,9	24	3,8	2,6
	Totale				21	3,4	2,2	16	3,4	2,1	12	3,8	2,9	49	3,5	2,3

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

CERVO: GIORNATE DI CACCIA NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DI UN CAPO

Stagione	Classe	Pragelato			Bassa Chisone 1			Bassa Chisone 2			Val Germanasca			Totale		
		N	x	n	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds	n	x	ds
2016	Giovane				8	4,8	3,8	1	9,0	-				9	5,2	3,8
	Daguet							1	3,0	-	1	2,0	-	2	2,5	0,7
	Femmina adulta	3	3,7	4,6	11	5,6	5,1	3	2,0	1,0				17	4,6	4,6
	Maschio subad.	5	4,4	4,2				2	5,0	2,8	2	13,0	5,7	9	6,4	5,3
	Maschio adulto	7	5,3	4,0	1	3,0	-				2	3,0	2,8	10	4,6	3,6
	Totale	15	4,7	3,9	20	5,2	4,4	7	4,0	2,9	5	6,8	6,5	47	5,0	4,2
2017	Giovane	1	5,0	-				2	3,0	2,8				7	4,9	4,3
	Daguet				1	1,0	-	2	4,5	4,9				3	3,3	4,0
	Femmina adulta	2	4,5	2,1	8	2,9	2,0	3	1,7	1,2	2	4,0	4,2	15	3,0	2,2
	Maschio subad.	3	9,0	5,6	2	7,0	1,4				1	12,0	-	6	8,8	4,0
	Maschio adulto	6	4,5	3,1	2	7,0	2,8				1	2,0	-	9	4,8	3,0
	Totale	12	5,7	3,8	17	4,4	3,5	7	2,9	2,7	4	5,5	5,1	40	4,6	3,6
2018	Giovane	1	4,0	-	9	5,1	5,0	3	7,7	0,6	1	4,0	-	14	5,5	4,1
	Daguet	1	2,0	-				1	1,0	-	1	1,0	-	2	1,5	0,7
	Femmina adulta	4	3,5	2,4	15	5,5	4,0	6	4,5	5,4	2	1,5	0,7	27	4,7	4,0
	Maschio subad.	5	4,4	2,5	1	1,0	-	1	1,0	-	2	4,5	4,9	9	3,7	2,9
	Maschio adulto	3	6,0	3,0	4	3,5	1,9				2	8,5	10,6	9	5,4	4,7
	Totale	14	4,3	2,4	29	4,9	4,1	10	5,1	4,5	8	4,3	5,3	61	4,7	4,0
2019	Giovane	4	6,0	1,2	7	6,3	5,4	2	3,5	4,9	3	4,7	4,0	16	5,6	4,1
	Daguet	2	3,0	0,0	1	1,0		1	3,0		1	7,0		5	3,4	2,2
	Femmina adulta	11	3,3	2,2	15	3,3	2,6	5	2,8	1,8	7	3,3	2,6	38	3,2	2,3
	Maschio subad.	5	4,6	1,8	1	1,0		2	4,0	2,8	2	5,5	2,1	10	4,3	2,1
	Maschio adulto	3	3,3	2,5	2	2,0	1,4	1	6,0		2	1,0	0,0	8	2,8	2,2
	Totale	4	6,0	1,2	7	6,3	5,4	2	3,5	4,9	3	4,7	4,0	16	5,6	4,1
2020	Giovane	2	0,0	0,0	7	9,3	7,4	4	4,5	1,7	2	7,5	0,7	15	6,5	6,0
	Daguet										2	6,5	2,1	2	6,5	2,1
	Femmina adulta	7	3,0	2,6	14	3,4	3,2	5	3,4	2,1	7	3,6	2,7	33	3,4	2,7
	Maschio subad.	6	7,7	5,3	2	4,5	0,7	1	4,0	-	1	4,0	-	10	6,3	4,3
	Maschio adulto	3	2,0	1,0	5	4,0	4,1	1	6,0	-	3	1,3	0,6	12	3,0	2,9
	Totale	18	4,1	4,3	28	5,1	5,1	11	4,1	1,8	15	4,1	2,8	72	4,5	4,1

Note: n=dimensione del campione; x=media; ds=deviazione standard

ANALISI ABBATTIMENTI SANITARI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

NUMERO PRELIEVI SANITARI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
GIO				
BIN				
FA				
MA		4		4
Totale		4		4

TIPI DI ANOMALIE

CAMOSCIO

Cause	GIO	BIN	FA	MA	Totale
CONGIUNTIVITE/LES. OCUL.				1	1
FRATTURE/AMPUTAZIONI				2	2
LESIONE DIVERSE					
PESO				1	1
Totale complessivo				4	4

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA			1		1
Totale			1		1

CAPRIOLO

Cause	GIO	FA	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI			1	1
PALCO IN VELLUTO				
LESIONI DIVERSE				
PESO				
Totale complessivo			1	1

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
GIO					
DAG					
FA					
MS					
MA			1	1	2
Totale			1	1	2

CERVO

Cause	GIO	DAG	FA	MS	MA	Totale
FRATTURE/AMPUTAZIONI					1	1
LESIONE DIVERSE					1	1
PESO						
Totale complessivo					2	2

Legenda:

GIO = giovane

BIN = yearling

DAG = daguet

FA = femmina adulta

MS = maschio subadulto

MA = maschio adulto

PR = Prigelato

VC = Bassa Val Chisone e Pinerolese

VG = Val Germanasca

VC1 = Bassa Val Chisone 1

VC2 = Bassa Val Chisone 2

ANALISI ABBATTIMENTI NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

CAMOSCIO

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP			1	1
BIN				
FA	1			1
MA				
Totale complessivo	1		1	2

Tipi di errore

Classe	VP	VC	VG	Totale
CAP x BIN			1	1
BIN x FA				
FA x BIN	1			1
FA x MA				
MA x FA				
Totale complessivo	1		1	2

Legenda:

GIO = giovane
 BIN = yearling
 DAG = daguet
 FA = femmina adulta
 MA = maschio adulto
 MS = maschio subadulto
 AGN = giovane
 YRM = yearling maschio
 MACOR = maschio adulto coronato

PR = Prigelato
 VC = Val Chisone
 VG = Val Germanasca
 VP = Val Pellice
 VC1 = Bassa Val Chisone 1
 VC2 = Bassa Val Chisone 2

CAPRIOLO

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
GIO					
FA					
MA					
Totale complessivo					

Tipi di errore

Classe	PR	VP	VC	VG	Totale
MA x FA o GIO					
GIO x MA					
FA x GIO					
FA x MA					
MA x GIO					
Totale complessivo					

CERVO

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
DAG	1		1		2
FA					
MS					
MA					
Totale complessivo	1		1		2

Tipi di errore

Classe	PR	VC1	VC2	VG	Totale
FA x GIO		1			1
DAG x FA o GIO					
DAG x MA o MS					
MA x FA o GIO					
MA x MS					
MS x MA					
Totale complessivo		1			1

Cervi maschi subadulti coronati abbattuti: 2

Capi abbattuti illegalmente, non presentati ai centri di controllo e sequestrati dagli Organi di vigilanza (indicati come non conformi): -

Capi rinvenuti sul territorio abbandonati e palesemente abbattuti: -

ABBATTIMENTI SANITARI E NON CONFORMI NELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI

Camoscio

Stagione	Classe	Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2016	Capretti	2			2					1			1	2	1		3
	Yearling	13			13	10			10	14			14	37			37
	Femmine ad.	18	1	2	21	11	1		12	21		2	23	50	2	4	56
	Maschi adulti	24	2	2	28	13			13	21		1	22	58	2	3	63
	Totale	57	3	4	64	34	1		35	56	1	3	60	147	5	7	159
2017	Capretti	1			1					1			1	2			2
	Yearling	11			11	8		1	9	9			9	28		1	29
	Femmine ad.	21		2	23	11			11	19		1	20	51		3	54
	Maschi adulti	17		3	20	10		1	11	13			13	40		4	44
	Totale	50		5	55	29		2	31	42		1	43	121		8	129
2018	Capretti									1			1	1			1
	Yearling	16			16	3			3	16			16	35			35
	Femmine ad.	14		1	15	4			4	15	2	1	18	33	2	2	37
	Maschi adulti	24		4	28	9			9	13			13	46		4	50
	Totale	54		5	59	16			16	45	2	1	48	115	2	6	123
2019	Capretti					1			1	1			1	2			2
	Yearling	15			15	6			6	11			11	32			32
	Femmine ad.	16		1	17	10			10	15		1	16	41		2	43
	Maschi adulti	21		1	22	13		1	14	23	1	4	28	57	1	6	64
	Totale	52		2	54	30		1	31	50	1	5	56	132	1	8	141
2020	Capretti					1			1	1			1	2			2
	Yearling	10			10	3			3	13	1		14	26	1		27
	Femmine ad.	11	1		10	3			3	10			10	23	1		24
	Maschi adulti	16		3	19	11		1	11	20			20	47		4	51
	Totale	37	1	3	40	18		1	19	45	1		44	98	2	4	104

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi SAN=abbattimenti sanitari

Cervo

Stagione	Classe	Pragelato				Bassa V. Chisone 1				Bassa V. Chisone 2				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2016	Giovani					8			8	1			1					9			9
	Daguet										1		1	1			1	1	1		2
	Femmine ad.	3			3	11			11	3			3					17			17
	Maschi sub.	4	1		5					1	1		2	2			2	7	2		9
	Maschi adulti	5	1	1	7	1			1					2			2	8	1	1	10
	Totale	12	2	1	15	20			20	5	2		7	5			5	42	4	1	47
2017	Giovani	1			1	4			4	2			2					7			7
	Daguet					1			1	1	1		2					2	1		3
	Femmine ad.	2			2	8			8	3			3	2			2	15			15
	Maschi sub.	3			3	4			4					1			1	6			6
	Maschi adulti	6			6	2			2					1			1	9			9
	Totale	12			12	17			17	6	1		7	4			4	39	1		40
2018	Giovani	1			1	9			9	3			3	1			1	14			14
	Daguet	1			1									1			1	2			2
	Femmine ad.	4			4	15			15	5		1	6	2			2	26		1	27
	Maschi sub.	5			5	1			1	1			1	2			2	9			9
	Maschi adulti	3			3	4			4					2			2	9			9
	Totale	14			14	29			29	9		1	10	8			8	60		1	61
2019	Giovani	4			4	7			7	2			2	3			3	16			16
	Daguet	1	1		2	1			1		1		1	1			1	3	2		5
	Femmine ad.	11			11	14		1	15	5			5	7			7	37		1	38
	Maschi sub.	5			5	1			1	2			2	2			2	10			10
	Maschi adulti	3			3	2			2	1			1	2			2	8			8
	Totale	24	1		25	25		1	26	10	1		11	15			15	74	2	1	77
2020	Giovani	2			2	7			7	4			4	2			2	15			15
	Daguet													2			2	2			2
	Femmine ad.	7			7	13	1		14	5			5	7			7	32	1		33
	Maschi sub.	6			6	2			2	1			1	2		1	3	11		1	10
	Maschi adulti	3			3	4		1	5	1			1	1			1	11		1	12
	Totale	18			18	26	1	1	28	11			11	14		1	15	70	1	2	72

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

Capriolo


Stagione	Classe	Pragelato				Val Pellice				Val Chisone				Val Germanasca				Totale			
		CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT	CONF	ET	SAN	TOT
2016	Giovani					9			9	7			7	6			6	22	0	0	22
	Femmine ad.					20			20	19	1	20	20	14			14	53	0	1	54
	Maschi adulti					18		1	19	13		1	14	13	1		14	44	1	2	47
	Totale					47		1	48	39		2	41	33	1		34	119	1	3	123
2017	Giovani					12		3	15	5			5	10			10	27		3	30
	Femmine ad.					19			20	18			18	14	1		15	51	1		52
	Maschi adulti					20			20	16	1		17	10			10	46	1		47
	Totale					54			55	39	1		40	34	1		35	124	2	3	129
2018	Giovani					3		1	4	6			6	4			4	13		1	14
	Femmine ad.					17			17	12			12	14		1	15	43		1	44
	Maschi adulti					21			21	11			11	13			13	45			45
	Totale					41		1	42	29			29	31		1	32	103		2	103
2019	Giovani					10			10	4			4	4	1		5	18	1		19
	Femmine ad.					11			11	15			15	6			6	32			32
	Maschi adulti					14			14	7	1		8	7			7	28	1		29
	Totale					35			35	26	1		27	17	1		18	78	2		80
2020	Giovani					5			5					1			1	6			6
	Femmine ad.					7			7	8			8	4			4	19			19
	Maschi adulti					8	1		9	8			8	7			7	23	1		24
	Totale					20	1		21	16			16	12			12	48	1		49

Note: CONF=abbattimenti conformi; ET=abbattimenti non conformi; SAN=abbattimenti sanitari

DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UNGULATI NEI COMUNI

Comune	Camoscio	Capriolo	Cervo	Totale complessivo
Angrogna	8	1		9
Bibiana		2		2
Bobbio Pellice	23	4		27
Bricherasio		1		1
Lusernetta		1		1
Massello	2			2
Perosa Argentina	3	1	6	10
Perrero	5	10	13	28
Pinasca	5	5		10
Pomaretto	1	1		2
Porte		2		2
Pragelato	9		18	27
Prali	26	1	1	28
Pramollo		5	8	13
Roure	2		22	24
Salza di Pinerolo	11		1	12
San Germano Chisone		1	3	4
San Pietro Val Lemina		1		1
Torre Pellice	1	1		2
Villar Pellice	8	11		19
Villar Perosa		1		1
Totale complessivo	104	49	72	225


CAMOSCIO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



0 6 12 Kilometers


-  Corsi d'acqua principali
-  Paesi
-  Confini CATO1
-  Aree di caccia specifica
-  Oasi/ZRC
-  Aziende faunistico-venatorie
-  Parchi naturali

CAPRIOLO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



-  Corsi d'acqua principali
-  Paesi
-  Confini CATO1
-  Aree di caccia specifica
-  Oasi/ZRC
-  Aziende faunistico-venatorie
-  Parchi naturali

CERVO: LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI



0 6 12 Kilometers

-  Corsi d'acqua principali
-  Paesi
-  Confini CATO1
-  Aree di caccia specifica
-  Oasi/ZRC
-  Aziende faunistico-venatorie
-  Parchi naturali

RISULTATI
CACCIA AL CINGHIALE

CARNIERE E CALENDARIO CINGHIALE

AREA	CARNIERE	CALENDARIO	GIORNATE DI CACCIA
VALLI PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	Numero massimo di capi per cacciatore: 25	20 settembre 2020 20 dicembre 2020	LUNEDI' MERCOLEDI' DOMENICA

L'epidemia di Covid-19 ha imposto delle restrizioni agli spostamenti che l'hanno resa impraticabile a tutti dal 6 al 28 novembre 2020 ed esercitabile nel proprio Comune dal 29 novembre al 9 dicembre 2020.

Per recuperare le giornate perdute per tutti il Comitato di Gestione ha disposto il prolungamento della caccia dal 3 al 25 gennaio 2021 (nelle giornate del 3 e del 6 gennaio nuove restrizioni hanno reso la caccia nuovamente impraticabile per tutti).

AREE DI CACCIA AL CINGHIALE

AREA	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE

Area di caccia	M	F	Totale
Val Pellice	133	94	227
Val Chisone, Germ. e Pinerolese	176	157	333
Totale CATO1	309	251	560

RISULTATI PRELIEVI CINGHIALE PER VALLE

Valle	M	F	Totale
Val Pellice	133	94	227
Pinerolese pedemontano	31	29	60
Val Chisone	109	94	203
Val Germanasca	36	34	70
Totale complessivo	309	251	560

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETÀ'

La mancata presentazione dei capi presso i centri di controllo non ha consentito la determinazione dell'età dei capi abbattuti.

CALENDARIO ABBATTIMENTI CINGHIALE

Data	Giorno	VAL PELLICE			VAL CHISONE, GERM. E PIN.			TOTALE CATO1
		M	F	TOTALE	M	F	TOTALE	
20200920	DOM	3	3	6	10	9	19	25
20200921	LUN	2	1	3				3
20200923	MER	2	3	5	8	7	15	20
20200927	DOM	6	3	9	10	5	15	24
20200928	LUN							
20200930	MER	1	1	2	8	7	15	17
20201004	DOM	5	5	10	11	10	21	31
20201005	LUN							
20201007	MER	1		1	2	2	4	5
20201011	DOM	3	3	6	8	11	19	25
20201012	LUN	2		2	1		1	3
20201014	MER	3	1	4	3	3	6	10
20201018	DOM	7	3	10	7	7	14	24
20201019	LUN							
20201021	MER	5	2	7	5	2	7	14
20201025	DOM		4	4	6	5	11	15
20201026	LUN							
20201028	MER	2	1	3	5	5	10	13
20201101	DOM	4	4	8	2	4	6	14
20201102	LUN	1	1	2				2
20201104	MER	3	1	4	9	9	18	22
20201108	DOM							
20201109	LUN							
20201111	MER							
20201115	DOM							
20201116	LUN							
20201118	MER							
20201122	DOM							
20201123	LUN							
20201125	MER							
20201129	DOM	6	8	14	8	8	16	30
20201130	LUN				1		1	1
20201202	MER	1		1		1	1	2
20201206	DOM	7	4	11	9	10	19	30
20201207	LUN	3	3	6	1		1	7
20201209	MER	5	3	8	6	1	7	15
20201213	DOM	15	4	19	14	9	23	42
20201214	LUN	1		1		3	3	4
20201216	MER	5	5	10	8		8	18
20201220	DOM	8	6	14	9	10	19	33
20210103	DOM							
20210104	LUN	3	1	4				4
20210106	MER							
20210110	DOM	6	4	10	8	12	20	30
20210111	LUN		1	1				1
20210113	MER	5	2	7	3	3	6	13
20210117	DOM	4	8	12	8	10	18	30
20210118	LUN							
20210120	MER	6	4	10	5	3	8	18
20210124	DOM	7	5	12	1	1	2	14
20210125	LUN	1		1				1
Totale complessivo		133	94	227	176	157	333	560

Legenda:

F=femmine; M=maschi

= caccia interdetta per divieto assoluto agli spostamenti

= caccia consentita solo all'interno del proprio comune


DISTRIBUZIONE DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEI COMUNI

Comune	N. capi
ANGROGNA	25
BIBIANA	17
BOBBIO PELLICE	52
BRICHERASIO	3
CANTALUPA	12
FROSSASCO	5
INVERSO PINASCA	2
LUSERNA S. GIOVANNI	29
LUSERNETTA	8
PEROSA ARGENTINA	31
PERRERO	56
PINASCA	37
PINEROLO	2
POMARETTO	9
PORTE	17
PRAGELATO	3
PRALI	4
PRAMOLLO	26
PRAROSTINO	6
ROLETTO	24
RORA'	7
ROURE	53
S. GERMANO CHISONE	17
S. PIETRO VAL LEMINA	8
S. SECONDO DI PINEROLO	3
SALZA DI PINEROLO	1
TORRE PELLICE	15
VILLAR PELLICE	71
VILLAR PEROSA	17
Totale complessivo	560

COMPOSIZIONE DEL CARNIERE DEL CINGHIALE PER CLASSI DI ETA'


La mancata presentazione dei capi presso i centri di controllo non ha consentito la determinazione dell'età dei capi abbattuti.

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE NEGLI ANNI



■ Val Pellice
 ■ Valli Chisone e Germanasca
 ■ Totale CATO1
 — Lineare (Totale CATO1)

LOCALIZZAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE



**RISULTATI
CACCIA ALLE SPECIE DELLA
TIPICA FAUNA ALPINA**

TIPICA FAUNA ALPINA: PIANO DI ABBATTIMENTO E CALENDARIO 2020/2021
(DD.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e n. 18-2044 del 2.10.2020)

SPECIE	SETTORE	CAP PRELEVABILI	PERIODO	GIORNATE DI CACCIA
FAGIANO DI MONTE	VAL PELLICE	10	4 ottobre 2020 29 novembre 2020	MERCOLEDI' DOMENICA
	VAL CHISONE E GERMANASCA	22		
COTURNICE	VAL PELLICE	6		
	VAL CHISONE E GERMANASCA	5		
PERNICE BIANCA	VAL PELLICE, CHISONE E GERMANASCA	10		

E' vietata la caccia alla Coturnice nel Comune di Pragelato.

E' vietata la caccia alla Coturnice nel SIC Pra-Barant, in quanto non sono stati effettuati censimenti specifici per queste specie in queste aree.

SETTORI DI CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA

DISTRETTO	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

RISULTATI PRELIEVI TIPICA FAUNA ALPINA

	Val Pellice			Val Chisone e G.			Totale CA TO 1		
	PRE	REA	%	PRE	REA	%	PRE	REA	%
FAGIANO DI MONTE	10	3	30%	22	8	36%	32	11	34%
COTURNICE	6	8	133%	5	5		11	13	118%
PERNICE BIANCA							10	9	90%

Note: PRE=piano previsto; REA=piano realizzato; %=perc. di realizzazione

TIPICA FAUNA ALPINA: COMPOSIZIONE DEL CARNIERE REALIZZATO

DISTRETTO	SPECIE	SESSO	ADULTO	GIOVANE	Totale	
VAL PELLICE	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO		3	3	
	COTURNICE	MASCHIO	1		1	
		FEMMINA	4	1	5	
		INDETERMINATO		2	2	
COTURNICE Totale			5	3	8	
VALLI CHISONE E	FAGIANO DI MONTE	MASCHIO	6	2	8	
	COTURNICE	MASCHIO	1		1	
		FEMMINA	3		3	
		INDETERMINATO		1	1	
	COTURNICE Totale			4	1	5
	PERNICE BIANCA	FEMMINA	4	1	5	
MASCHIO		3	1	4		
PERNICE BIANCA Totale			7	2	9	

Legenda:

M = maschio

F = femmina

IND = animale di sesso e/o età indeterminati

ADU = adulto

JUV = giovane dell'anno


CHIUSURE ANTICATE ALLA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA PER
COMPLETAMENTO DEL PIANO

Specie	Distretto	Data completamento piano
Coturnice	Tutto il CA	18/10/2020
Pernice bianca	Tutto il CA	1/11/2020





DISTRIBUZIONE DEL CARNIERE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA PER COMUNE

Comune	Fagiano di M.	Coturnice	Pernice bianca	Totale
Angrogna		4		4
Bobbio Pellice	2	2		4
Massello		1		1
Perrero	3	1		4
Pinasca		1		1
Pragelato	2		1	3
Prali	2	1	8	11
Pramollo	1			1
Roure		1		1
Torre Pellice		1		1
Villar Pellice	1	1		2
Totale complessivo	11	13	9	33

TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA



TRENDS DEGLI ABBATTIMENTI DI FAGIANO DI MONTE E COTURNICE: DISTRETTO VAL PELLICE E DISTRETTO VAL GERMANASCA



CALENDARIO ABBATTIMENTI DELLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA




DATA	Giorno	FAGIANO DI MONTE			COTURNICE			PERNICE BIANCA	Totale CA
		VP	VC	Totale	VP	VC	Totale		
04/10/2020	DOM	1		1	3		3	7	
07/10/2020	MER	1	1	2		1	1	4	
11/10/2020	DOM		2	2		2	3	7	
14/10/2020	MER				2			2	
18/10/2020	DOM	1	1	2	3	2	5	7	
21/10/2020	MER								
25/10/2020	DOM		2	2				2	
28/10/2020	MER		1	1				1	
01/11/2020	DOM		1	1			2	3	
04/11/2020	MER								
08/11/2020	DOM								
11/11/2020	MER								
15/11/2020	DOM								
18/11/2020	MER								
22/11/2020	DOM								
25/11/2020	MER								
29/11/2020	DOM								
Totale complessivo		3	8	11	8	5	13	9	33

VP = Distretto Val Pellice

VC = Distretto Val Chisone e Germanasca

-  = caccia chiusa per completamento del piano
-  = caccia interdetta a tutti per restrizioni Covid-19
-  = caccia consentita solo nel proprio Comune

TRENDS DEL RAPPORTO GIOVANI /ADULTI NEI CARNIERI DELLA TIPICA FAUNA ALPINA




CONDIZIONI METEOROLOGICHE DELLA STAGIONE 2020/2021

Numero giornate e tipo di condizioni meteo osservate per ogni specie:

	CAMOSCIO	CAPRIOLO	CERVO	CINGHIALE	TIPICA FAUNA ALPINA
Meteo					
Sereno	16	22	17	22	6
Variabile	6	6	6	8	3
Nuvoloso	5	5	6	7	2
Pioggia/Neve	2	2	4	4	
TOTALE	29	35	33	41	11

Quota neve rilevata per ogni giornata di caccia, su pendici esposte a S:



Non sono stati considerati i giorni di lock-down per il Covid-19 in cui il Piemonte era zona rossa e non era consentito a nessuno alcun spostamento per poter esercitare l'attività venatoria (6-28 novembre 2020).